

රෝග පතුරුවන මදුරු උවදුර තුරන් කිරීම

මදුරුවන්නේ මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට විශාල තර්ජනයක් වී ඇත්තේ ඔවුන් වසංගත තත්ත්වයේ දරුණු රෝග පැතිරවීමට දයක වන නිසාය. ඩෙංගු, මැලේරියා, බරවා සහ ජපන් නිකර්පර් ප්‍රදහය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මදුරුවන් මගින් ඇති කරනු ලබන ප්‍රධාන රෝගයන් වේ. මෙම රෝග මගින් ජනතාවට සමාජීය හා ආර්ථික වශයෙන් ඇතිකර ඇති තත්වය ඉතා බරපතලය. මෙම රෝග සියල්ලෙහිම වාගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් ලෙස උණ ඇතිවීම දැකිය හැකිය. මදුරුවන්ට ඔවුන් බිහිවූ ස්ථානයේ සිට සැලකිය හැකි දුරක් පියඹා යා හැකි විමෙන් සෑම පුද්ගලයෙකුම මෙම රෝගයන්ට අනාරක්ෂිත වී ඇති අතර සියළු ජාතියටම මදුරු උවදුර ගෙනදී ඇත්තේ භයානක තත්වයකි. මැලේරියාව වැළඳීමෙන් ලෝකයේ දශලක්ෂ එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මිය යන අතර වසර 1998 දී ශ්‍රී ලංකාවේදී 115 ක් පමණ උතුරු හා ඊසාන දිග පලාත්වලින් මියගිය බවට වාර්තා විය. බරවා රෝගය, ගම්බද හා නාගරික බරවා යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බරවා වර්ග දෙකකි. මෙම රෝගයට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති අතර රෝගය ක්‍රි.ව. 339 දීද හිටු බවට සාක්ෂි ඇත. දැනට ලෝකයේ ජනගහනයෙන් දශලක්ෂ 120 ක් පමණ රෝගයෙන් පෙළෙන අතර එයින් දශලක්ෂ 76 ක් රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන් බවට ගණන් බලා ඇත. ජපන් නිකර්පර් ප්‍රදහය බොහෝ ආසියානු රටවල ජනයා මුහුණපා ඇති වැදගත් සෞඛ්‍ය ගැටළුවකි. පසුගිය දශවසර තුළ කායිකත්වය, බුරුමය, ඉන්දියාව, නේපාලය යන රටවල රෝගය දැඩිව පැතිර ගියේය. ලෝකයේ, වාර්ෂිකව 50,000 ක් පමණ මෙයින් රෝගී වන බවත් එයින් 15,000 ක් පමණ මිය යන බවත් සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ වී වගාව පවතින ප්‍රදේශවලත් තෙත් කලාපයේ උතුරන් ඇතිකරන ප්‍රදේශවලත් රෝගය වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත විය. මෙයට හේතුව වාහක මදුරුවන් බහුලව මෙම ප්‍රදේශ වලින් හඳුනාගෙන තිබීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු ලෙස රෝගය ඇති වූයේ 1987 දීය. එම අවස්ථාවේදී රෝගීන් 766 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර 138 දෙනෙකු මිය ගියහ. මෙම රෝගීන්ගේ පැතිරීම අනුරාධපුරයෙන් ආරම්භවී පසුව පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, පුත්තලම දක්වා ව්‍යාප්තවී තිබිණ.

පසුගිය වසර 2000 තුළදී ශ්‍රී ලංකාව විශාල දුෂ්කරතාවයකට පත්කල ඩෙංගු රෝගය අන්තිමදී ආසියාවේ රටවල් කිහිපයකට සීමාවී ඇති රෝගයකි. එම වසරේදී රෝගීන් 5000 ක් පමණ දිවයිනෙන් වාර්තාවූ අතර එයින් 400 ක් පමණ ස්ථිර වශයෙන්ම ඩෙංගු රෝගීන් විය. රෝගය දරුණු වසංගත මට්ටමින් පැවතුන අතර, ඉහත රෝග අතුරින් ජනතාවට බලවත්ම හානිය සිදු කළේ ඩෙංගු රෝගයයි. රෝග මර්දනය සඳහා දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක විය. ඩෙංගු මර්දන සහිත ප්‍රකාශයට පත්විය. අවට ප්‍රදේශවල එක් රැස්වී ඇති කැලිකසල, හිස් ටින්, තැඹිලි කෝමඩ, පොලිතින් බැග් ඉවත්කර පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘති, ග්‍රහණ වැනි වැඩසටහන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පැවැත්විණි. මෙහිදී පාසැල් සිසුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ වැඩසටහන් ඉතා වැදගත්ය. හේතුව ඩෙංගු වැඩි වශයෙන් බලපානුයේ ළමා පරපුරට බැවිනි. පාසැල් අවට ඩෙංගු මදුරුවන් ඉවත් කිරීම ගුරුවරුන්, සිසුන් හා අවට ජනතාවගේ සහයෝගයෙන් සිදුවිය. මර්දන කටයුතු ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන යාම සඳහා පහත සඳහන් දේ සිදුකිරීම අත්‍යවශ්‍යයැයි යෝජනා වී ඇත. කාර්යක්ෂම මෙවලන් උපකරණ නිපදවීම, අත්හැර දමනලද මැණික් වලවල්, ලිං. කානු, ඇල මාර්ග වල ජලය ඉවත්කිරීම සඳහා සේවා කණ්ඩායම් වෙන්කර තැබීම, සහ මදුරුවන් එක්රැස්වන පොලිතින් බැග්, හිස් තැඹිලි කෝමඩ, ඉවතලන වයර්, වැසිකිලි වලවල් යනාදියේ භයානකකම් ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම. වසංගත මට්ටමට රෝගය පැතිරීමෙන් පසු මදුරු මර්දන කටයුතු සිඳු කිරීම වෙනුවට මදුරුවන් පාලනය කිරීම නිරතුරුව සිදු කිරීමෙන් ස්ථිර විසඳුමක් කරා එළඹීමට හැකියාව ඇත. මහාචාර්ය කරුණාරත්න මදුරුවන් මර්දනය කිරීමේ ක්‍රියාවලි තෝරාගැනීමේදී අදාල මදුරු විශේෂවල ජීව විද්‍යාව, සැලකිල්ලට ගතයුතු බව පෙන්වා දෙයි. තවද සියළු මදුරු මර්දන කටයුතු පෞද්ගලික ආරක්ෂාව, නිවාස නිර්මාණය හා අවට පරිසරය, කෘමිනාශක භාවිතය යන මූලික ක්ෂේත්‍ර යටතේ සිදුකල යුතුව බව හෙතෙම පවසයි. මදුරුවාහකයන් මර්දනය කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය මදුරුනාශක ක්‍රමය භාවිතා කිරීමට ප්‍රථම එම ප්‍රදේශයේ සිටින මදුරු සිබිලියෝ විශේෂ හඳුනාගෙන එය සිදුකිරීම වඩා යෝග්‍ය බව ආචාර්ය මායා ගුණසේකර පෙන්වා දෙයි. විශේෂයෙන් මැලේරියා මදුරුවන්ගේ මර්දනයේදී ඔවුන් හඳුනා ගැනීමට ඩී.එන්.ඒ. කාක්ෂණය යොදාගත යුතුව සඳහන් කර ඇත. මදුරුවන් හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ දිවයිනේ විවිධ පර්යේෂණ ආයතනවල හා විශ්ව විද්‍යාලවල පවත්වා ගෙනයනු ලබති. ජාතික විද්‍යා පදනම මෙවැනි පර්යේෂණ වැඩසටහන් 20 කට පමණ ආධාර ලබාදී ඇත. මෙම පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති විවිධ පරිසරවල ජීවත්වන මදුරු විශේෂ හා බෝවෙන ස්ථාන, මදුරු විශේෂ හඳුනා ගැනීම, මදුරුවන් වර්ගීකරණය, රෝග පැතිරීම, කෘමිනාශක ප්‍රතිරෝධීතාවය යන ක්ෂේත්‍රයන් හා සම්බන්ධව සිදු කෙරේ. කෙසේ වුවද මදුරුවන් හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ මනා සම්බන්ධීකරණයක් තුළින් පවත්වා ගෙන යාම ඉතා වැදගත්ය. පවත්වනු ලබන පර්යේෂණ වැඩිවශයෙන් මදුරු මර්දන අරමුණු කරගෙන පැවැත්වීම ඉතා කාලෝචිතය. මේ පිළිබඳව පර්යේෂකයන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතුය.

ජාතික විද්‍යා පදනමේ විද්‍යා අධ්‍යාපන හා ප්‍රවේශකරණ කමිටුව මෙවර විදුරාව කලාපය මදුරුවන්ගෙන් බෝවන රෝග පිළිබඳව පළ කළේ පාසැල් සිසුන් හා ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් ඇතිකරලීම තුළින් රෝග වැළැක්වීමට සහාය වීමටය.

මැලේරියාව

වෛද්‍ය කපිල පියසේන
නයිතාරෝග්‍යශාලාව

මැලේරියා රෝගය වාර්ෂිකව ලෝකයේ දශ ලක්ෂ 100 කට වැළඳෙන අතර එමගින් 1% ක ප්‍රමාණයක් මිය යාම සිදුවේ. රෝගය ඇති කරනු ලබන්නේ ප්ලස්මෝඩියම් (*Plasmodium*) යන පරපෝෂිතයා මගිනි. පියවි ඇසින් බලා ගැනීමට නොහැකි වන මෙම මැලේරියා පරපෝෂිතයා මිනිසුන්ගේ රුධිරයේ සහ ශරීරයේ අනෙකුත් පටකවල ජීවත් වෙයි.


රෝග ඉතිහාසය

මැලේරියා රෝගයේ ඉතිහාසය ඉතා ඇතට දිව යන්නකි. මෙහිදී මෙම රෝගයට මැලේරියාව යන නාමය ලැබුණේ "අපිරිසිදු වාතය" (Bad air) යන නාමයට අනුරූපවයි. එයට හේතුව වූයේ මුලදී මැලේරියාව වැඩිපුර දක්නට ලැබුණේ මධ්‍යධරණී ආශ්‍රිත ජලාශවල නිමයි. 1880 දී පමණ ලොවරින් මෙම රෝගය ඇති කරන්නේ පරපෝෂිතයෙකු මගින් යයි සොයා ගනු ලැබු අතර, 1898 දී ග්‍රේරේසියා රෝගය පතුරුවනු ලබන්නේ මදුරුවකු මාර්ගයෙන් බව පරීක්ෂණාත්මකව සොයා ගන්නා ලදී. පසුව ග්‍රේරේසියා සහ මහගේ සිසු සිසුවියන් විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ

වලින් පසුව මැලේරියා පරපෝෂිතයාගේ ජීවන චක්‍රය ගැන වැඩි විස්තර සොයා ගැනීමට හැකි විය.

රෝග ව්‍යාප්තිය

ලෝකයේ මැලේරියාව පැතිරීම බොහෝ විට දකුණු අප්‍රිකා 30° ත් උතුරු අප්‍රිකා 40° අතර තිබේ. මෙහිදී වසංගත (epidemic) තත්ත්වයට මැලේරියාව පැතුරුණු රටවල් දක්නට ඇත. ප්‍රධාන වශයෙන් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2200 වඩා අඩු ප්‍රදේශවල ඇති උණුසුම් ආර්ද්‍රතාවයෙන් වැඩි දේශගුණික තත්ත්ව තිබෙන රටවල මැලේරියාව බහුල ව දක්නට ලැබේ. මෙයට ප්‍රධානම හේතුව වී ඇත්තේ රෝගය බෝකරන මදුරුවාගේ වර්ධනයට සුදුසු තත්ත්ව මෙම දේශගුණ තත්ත්ව වලදී ඇතිවන නිසාය. පැතිරීම සලකා බැලුවහොත් ලොව පුරාම පැතිරීමක් ඇති අතර දකුණු ආසියාතික රටවල්, අප්‍රිකා, මධ්‍යම ඇමරිකානු රටවලටත් වර්තමානයේ රෝගය පැතිරී ඇත.



රූපය 1 : ලෝකයේ මැලේරියාව ව්‍යාප්තවී ඇති ප්‍රදේශ

■ අදුරු වර්ණ යොදා ඇත්තේ මැලේරියාව ව්‍යාප්තවී ඇති ප්‍රදේශයි.

වර්තමානයේ, එය ශ්‍රී ලංකාවට කොපමණ බලපෑමක් ඇතිකර ඇත්දැයි කිවහොත් බෝවන රෝග අතුරින් ඉතා වැදගත්ම රෝගය මැලේරියාව ලෙස සලකයි. ඒ මගින් ආර්ථිකව මෙන්ම සමාජයීය වශයෙන් ඇතිකර ඇති තත්වය ඉතා දරුණුයි. 1998 වර්ෂයේදී පමණක් උණ රෝගීන් ලක්ෂ 13 කගේ ලේ පරීක්ෂා කරන ලද අතර එමගින් 15.8% කට මැලේරියා වැළඳී තිබුණ බව තහවුරු වී ඇත. එය 1997 දී 16.4% කි. මෙසේ මැලේරියාව වැළඳුණු රෝගීන්ගෙන් 80% ක්ම, ප්ලස්මොඩියම් වයිවැක්ස් (*Plasmodium vivax*) වර්ගයට අයිතිය. ඉතිරිය ප්ලස්මොඩියම් ෆැල්සිපාරුම් වර්ගයට (*Plasmodium falciparum*) අයත්ය. ශ්‍රී ලංකාවේදී රෝගය වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ උතුරු හා ඊසානදිග ප්‍රදේශ වලයි. එය 62% ක් වන බව ගණන් බලා ඇත. 1998 වර්ෂයේදී මැලේරියාව නිසා මරණ 115 ක් සිදුවී ඇති අතර, එයින් 106(92%) උතුරු ඊසානදිග පළාතෙන් වාර්තාවී ඇත.

මෙම ප්‍රදේශයේ පමණක් මෙසේ රෝගය වැඩිවීමට හේතුවී ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රදේශයේ පවත්නා අපහසුතාවයන්ය. රෝගීන් සොයා ගැනීමේදීත් ප්‍රතිකාර කිරීමේදීත් මෙම තත්ත්වය ඇතිවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් වැඩි වශයෙන්ම දක්නට ලැබෙන මැලේරියා පරපෝෂිතයා *Plasmodium vivax* රෝගී වාහක මදුරුවා ඇනොෆීලිස් කියුලෙයිපේසියස් ය. (*Anopheles culicifacies*) මීට අමතරව *Anopheles subpictus* සහ *Anopheles annularis* යන වර්ගද රෝගී වාහකයන් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මිනිසුන්ට රෝග බෝකරනුයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ප්ලස්මොඩියම් විශේෂ 4 ක් මගිනි.


- ඒවා නම් :
1. ප්ලස්මොඩියම් වයිවැක්ස් *Plasmodium vivax*
 2. ප්ලස්මොඩියම් ෆැල්සිපාරුම් *Plasmodium falciparum*
 3. ප්ලස්මොඩියම් මලාරියේ *Plasmodium malariae*
 4. ප්ලස්මොඩියම් ඕවාලේ *Plasmodium ovalae*

නිවර්තන හා ශිත රටවල වැඩි වශයෙන්ම ප්‍රචලිත මැලේරියා පරපෝෂිතයා *Plasmodium vivax*. මේ මගින් වැළඳෙන රෝගය ප්‍රතිකාර වලින් සුවවූ පසුවත් නැවත ඇතිවීමට හැකියාවක් තිබේ. නමුත් ප්ලස්මොඩියම් ෆැල්සිපාරුම් මගින් ඇති කරන මැලේරියාව වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ නිවර්තන රටවලයි. මේ දක්වා සොයා ගෙන ඇති කරුණු අනුව මැලේරියාව පැතිරීමට හැකියාවක් ඇත්තේ මිනිසාට පමණකි. නමුත් *Plasmodium malariae* විශේෂය විමිපන්සි මගින් පැතිරීමට පුළුවන. ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන්නේ *Plasmodium vivax* හා *Plasmodium falciparum* යන විශේෂ දෙක පමණකි.

පරාපෝෂිතයාගේ ජීවිත චක්‍රය

මැලේරියා විශේෂිත 4 ක් සිටියත් ජීවන චක්‍රය සියළුම විශේෂ වල පොදු වශයෙන් සමාන ස්වරූපයක් දක්නට ඇත.

- * මිනිසාගේ ශරීරය තුළ රුධිර සෛල වලින් පිටත අවස්ථාව හා රුධිර සෛල අවස්ථාව
- * මදුරුවා තුළ, අවස්ථාව
- * රුධිර සෛල වලින් පිටතදී පරපෝෂිත අවධිය.



රූපය 2 : අක්ෂාව තුළදී පරපෝෂිතයාගේ වර්ධනය


1. ස්පෝරොසොයිටය
2. ස්පෝරොසොයිටය අක්ෂා සෛල තුළට ඇතුළු වේ.
3. පේද ගුණනය වීම සිදුවේ.
4. අක්ෂා සෛල බිඳ දමා පරපෝෂිතයා නිදහස්වීම.

මැලේරියාව අපට වැළඳෙන්නේ රෝගිකාරක පරපෝෂිතයන් සිටින මදුරුවන් දෂ්ඨ කිරීමේදී එම පරපෝෂිතයන් ගර්ථය තුළට එක්වීමෙනි. මෙහිදී ගර්ථයට ඇතුල් කරන පරපෝෂිත අවස්ථාවට ස්පොරොසොයිටය (sporozoite) ලෙස නම් කරනු ලැබේ. මෙසේ ඇතුල්වන ස්පොරොසොයිට රුධිර සෛල තුළට ඇතුල් නොවේ. ඒවා රුධිර සංසරණ පද්ධතියෙන් ඉවත්වී අක්මාව තුළට ගමන් කරයි. සාමාන්‍යයෙන් මදුරුවකු දෂ්ඨ කිරීමේදී ස්පොරොසොයිට විශාල සංඛ්‍යාවක් ගර්ථයට ඇතුල් කරනු ලැබුවත්, ගර්ථයේ ඇති ආරක්‍ෂක පද්ධති මගින් විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ කරනු ලැබේ. එසේ එම ආරක්‍ෂක කඩුළු මගින් බේරී ආ පරපෝෂිතයන් පමණක් අක්මාව තුළට ගමන් කරයි.

මෙහිදී අක්මාව තුළදී පරපෝෂිතයා වර්ධනය වන අතර මෙහි අවම වශයෙන් දෙවරක්වත් ජේද ගුණනය (schizogonic cycle) වන අතර එයින් ලැබෙන පරපෝෂිතයන් අක්මා සෛල බිඳ දමා රුධිරයට එකතු වෙයි.

රතු රුධිරාණු තුළ පරපෝෂිත අවධිය

මදුරුවා දෂ්ඨකර ස්පොරොසොයිට ගර්ථයට එක්කර දින 7-10 අතර කාලයකදී කුඩු ජේදංගුවෝ (micro merozoite) රතුරුධිරාණු ආක්‍රමණය කිරීම සිදු කරති. මෙහිදී පරපෝෂිතයා රතුරුධිරාණු සෛල තුළ වර්ධනය වන අතර එහි මුල්ම අවධිය මුදු අවස්ථාව (ring stage) ලෙස හඳුන්වයි. එහිදී පරපෝෂිතයා වර්ධනය වන අතර, පරපෝෂිතයාට ස්පොරොසොයිටය ලෙස නම් කරනු ලබයි. මෙහිදී අවසානයේ ජේදංගුන් (merozoites) රුධිරයට එක්වීම සිදුවේ.




රූපය 3 : රතු රුධිරාණු තුළ පරපෝෂිත අවස්ථාව රතු රුධිර සෛල මුදු අවස්ථාවේ සිට ජේදංගු අවස්ථාව දක්වා වර්ධනය වීම

ජන්මාණු ගුණන අවධිය (එනම් මිනිසාගේ සිට මදුරුවා වෙත රෝගය ප්‍රචාරණය කිරීමට අවශ්‍ය වන පරපෝෂිත වර්ග නිපදවෙන අවස්ථාව)

රතුරුධිරාණුව තුළ වර්ධනය වන පරපෝෂිතයා නිහිප වීමක් ජේදගුණනයා වන අතර යම් අවස්ථාවක ජන්මාණුගුණන අවධියට පත්වේ. මෙහිදී ඉතා සුළු ජේදංගු සංඛ්‍යාවක් ජන්මාණු බවට හැරෙන අතර ඒවා රුධිර සෛල තුළදී තවදුරටත් වර්ධනය වේ. මෙලෙස වර්ධනය වන ජන්මාණු පිරිමි හා ස්ත්‍රී වශයෙන් වෙන් වෙන්ව වර්ධනයවී ගර්ථයේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ ගමන් කරමින් පවතී. මදුරුවකු දෂ්ඨකර ලේ උරාබීමේදී ලේ සමග මෙම ජන්මාණු මදුරුවාගේ අමාශයට ගමන් කරති.

මදුරුවා තුළ වර්ධන අවධිය


පිරිමි සහ ස්ත්‍රී ජන්මාණු මදුරුවාගේ අමාශයේදී තවත් වෙනස්වීම් වලට ලක්වන අතර පිරිමි ජන්මාණුවේ බාහිරව කහිකාවක් ඇතිවන අතර, එය වලනය කිරීම මගින් එහා මෙහා ගමන් කිරීමට ජන්මාණුවට හැකි වෙයි. පසුව පිරිමි සහ ස්ත්‍රී ජන්මාණුව සංසේචනය වී අණ්ඩ කෝෂ්ඨය (oocyst) ඇති වෙයි.



රූපය 4 : මදුරුවාගේ ආමාශයේ ඇති අණ්ඩ කෝෂ්ඨය

මෙය තුළ වර්ධනය වන පරපෝෂිතයා ස්පොරොසොයිට විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති කරයි. සමහර විට එක අණ්ඩ කෝෂ්ඨයක් තුළ ස්පොරොසොයිට 10,000 ක් පමණ තිබීමට පුළුවන. එසේම එවැනි අණ්ඩකෝෂ්ඨ 50 ක් පමණ මදුරුවාගේ ආමාශයේදී තිබෙන්නට පුළුවන. අණ්ඩකෝෂ්ඨය තුළින් නික්මෙන ස්පොරොසොයිට බේට ග්‍රන්ථි තුළට ගමන් කරයි.

පරපෝෂිතයෝ බේට ග්‍රන්ථියේ සෛල තුල හා ඉන් පිටත දක්නට ලැබෙන අතර මදුරුවා මිනිසෙකු දෂ්ඨ කරන විට මෙම රෝගී කාරක ස්පෝරොසොයිට මිනිස් ශරීරයට ඇතුළු වෙති.



රූපය 5 : මදුරුවාගේ බේටග්‍රන්ථිවල පරපෝෂිතයා

රෝග ලක්ෂණ

ලක්ෂණවය - මැලේරියාව ඇතිවූ විට, උණ ඇතිවන නමුත් එසේ වීමට ප්‍රථම අවස්ථා කිහිපයකදී ඇතිවන වෙනස්කම් නිසා උණ තත්වය රෝගයට ආවේණික ලක්ෂණ ලෙස දැක්වීමට පිළිවන.

සීතල අවධිය - මෙහිදී සිදු වන්නේ රෝගියාට අධිකශීතලක් දැනී වෙවිලීමට පටන් ගැනීමයි. එය කොතරම්දැයි කිවහොත් අතපය පමණක් නොව දත් පවා එකිනෙකට ගැටෙන මට්ටමට වෙවිලීම සිදුවේ. මේ නිසා රෝගියා රෙදි කීපයකින් ඇඟ වසාගන්නා අතර, සම වියලිව පවතියි. නාඩි වැටීමද ඉක්මන් වෙයි. කුඩා ලමයින්ට මෙහිදී වලිප්පුව ඇතිවිය හැකිය. එසේම වමනය යාමද සිදුවීමට පුළුවන. මෙම අවස්ථාව විනාඩි 15 සිට පැය 1 පමණ කාලයක් තුල තිබෙන්නට පුළුවන.

උණුසුම් අවධිය - අධික සීතල කාලය නිමවූ සැතින් රෝගියාට අධික උණුසුමක් දැනීම සිදු වෙයි. මුහුණ රතු වී ඇඟ පිච්චෙන ගතියක් ඇතිවන්නට පුළුවන. වමනය ගතිය හා වමනය යාමද සිදුවිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවේදී අධික පිපාසයක් ඇතිවන අතර ශරීර උෂ්ණත්වය 41°C (106°F) දක්වා වැඩි විය හැකිය. මෙම අවධිය පැය 2 සිට 6 දක්වා තිබෙන්නට පුළුවන.

දහඩිය දමන අවධිය - මෙම අවස්ථාවේදී රෝගියාට අධික ලෙස දහඩිය දමන අතර සියළුම ඇද ඇතිරිලි සහ ඇඳුම් දහඩියෙන් තෙත්වීම සිදුවේ. ශරීර උෂ්ණත්වය ඉතිමණින් පහත වැටෙන අතර සමහර විට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට

වඩා අඩුවෙන් වුවත් පහතට යාමක් සිදුවේ. පසුව රෝගියා නින්දට වැටෙන අතර මේ අවධිය වන විට ශරීරයට පහතැති භාවයක් ඇතිවේ. මෙම අවධිය පැය 2 සිට 4 දක්වා තිබීමට පුළුවන.

මැලේරියා උණ ඇතිවීම සැමවිටම පරපෝෂිතයාගේ ජීවන චක්‍රය හා සම්බන්ධිතව පවතී. රතුරුධිරාණු සෛල තුල ජීවත්වන පරපෝෂිතයා වර්ධනය වී රතුරුධිර සෛල කඩා රුධිර සංසරණ පද්ධතියට එක්වන විට මෙසේ උණ ඇතිවීම සිදුවේ.

මැලේරියා රෝගයේ බීජාණු සමය එනම් මදුරුවකු දෂ්ඨ කල අවස්ථාවේ සිට උණ ඇතිවීම දක්වා කාලය පරපෝෂිත විශේෂය අනුව වෙනස්වේ.

විශේෂය	බීජාණු සමය (දින)
ජලස්මෝඩියම් වයිවැක්ස් (<i>Plasmodium vivax</i>)	- 13-17 දින දක්වා සමහර විට මාස 09
ජලස්මෝඩියම් ෆල්සිපාරුම් (<i>Plasmodium falciparum</i>)	- දින 9-14

මැලේරියාව මගින් ජීවිත හානි හා දරුණු ප්‍රථිඵල ලබා දෙන්නේ *Plasmodium falciparum* විශේෂයෙන් ඇති කරන රෝගී තත්ත්ව වලදීයි. මෙහිදී ඇතිවන සැම රෝග ලක්ෂණයක්ම ඉතා උත්සන්නව ඇතිවන අතර එය වකුගඩු, අක්මාව, මොලය හා ආහාර මාර්ග පද්ධතියට බලපෑම් එල්ල කරයි. මෙලෙස දරුණු තත්ත්ව ඇති වන්නේ ශරීරයේ ඇති රතුරුධිර සෛල වලින් 5% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පරපෝෂිතයා ජීවත්වන අවස්ථාවේදීය.

* මෙහිදී මොලේ මැලේරියාව ඇතිවිය හැකි අතර, එමගින් සිහිමද ගතියත්, වලිප්පුව ඇතිවී සමහර විට මරණය වුවද ලභාවීමටද පුළුවන.

* ආහාර මාර්ග පද්ධතියට බලපෑම් ඇතිකර එමගින් ලේ සමග පාවනය සිදුවීමත්, අධික ලෙස බඩේ වේදනාවක් ඇතිවීමටද පුළුවන.

* වකුගඩු වලටද ආබාධ ඇති කරන අතර මෙමගින් මුත්‍රා සමග ලේ පිටවීමත් වකුගඩු අක්‍රියවීමත් සිදුවීමට පුළුවන.

ප්‍රතිකාර:

උණ අඩුකිරීම සඳහා ඇස්ප්‍රින් සහ පැරසිටමෝල් වැනි ඖෂධ නියමිත ප්‍රමාණයෙන් ලබාගන්නට පිළිවන. එසේම මැලේරියා පරපෝෂිතයා විනාශ කිරීමට ක්ලෝරොකීන් (Chloroquine) නම් ඖෂධය භාවිතා කරනු ලබයි. නමුත් විශේෂයෙන් *Plasmodium falciparum* විශේෂය මෙම ඖෂධයට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන බැවින් එවැනි අවස්ථාවලදී

මාපධ දෙකක මිශ්‍රණයක් ලබාදීම සිදු කෙරේ. එනම් සල්පර්ඩයොක්සීන් Sulphurdioxine) සහ පයිමිමෙතමයින් (Pyrimethamine).

මැලේරියා පාලනය

මැලේරියා රෝගය පාලනය ශ්‍රී ලංකාවේදී ආරම්භ කළේ 1946 දී පමණය. එම අවස්ථාවේදී ඩීඩීටී (DDT) නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසීම කළ අතර, එය මැලේරියා පවතින ප්‍රදේශවල සෑම නිවසකටම පාහේ ඉසින ලදී. එය කොතරම් සාර්ථක වුවද සි නිවහොත් 1958 දී මැලේරියාව ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීමට කටයුතු සලස්වන ලදී. මෙහි ප්‍රතිඵලය ලෙස 1963 වාර්තා වූයේ රෝගීන් 17 දෙනෙකු පමණය. නමුත් ඉන් පසුව ඇතිවූ යම් යම් හේතු නිසා මැලේරියාව යළි හිස ඔසවන්නට පටන් ගනු ලැබීය. එය කොතරම් සුලභව පැතිරුණේද යත් 1968-1969 වසර වලදී වසංගත තත්ත්වයට පත්වීම දක්වා වර්ධනය විය. මේ සඳහා ප්‍රධානතම හේතුව වූයේ ඩීඩීටී වලට රෝගීකාරක මදුරුවන් ඇතිකළ ප්‍රතිරෝධී තත්ත්වයයි.

මේ නිසා 1977 දී මැලරියයන් නම් ප්‍රතිබෝධනාශකය භාවිතා කිරීම ආරම්භ කළේය. මුලදී ඉන් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබුණු නමුත් නැවතත් මැලේරියාව වැඩි දෙනෙකුට වැළඳීම සිදුවිය.

මේ හේතු නිසා මැලේරියාව පාලනය කිරීම එක් ක්‍රමයක් මගින් නොව විවිධ ක්‍රම කිහිපයක එකමුතුවත් ලෙස සිදු කිරීමෙන් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව පෙනී ගොස් ඇත. එසේ කිනම් ක්‍රමයක් කෙසේ අනුගමනය කළත් ඒ සඳහා යන වියදම අධිකවීම මැලේරියා පාලනය ඉතා දුෂ්කරවී ඇත.

ප්‍රතිකාර මගින් පාලනය කිරීම

රෝගය වැළඳුන අය හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් රෝගය ප්‍රචාරණය වීම අඩුකළ හැකිය. මෙහිදී රෝගී අවස්ථාවට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී භාවිතා කරන මාපධ වෙනස් කිරීම මගින් මේ තත්ත්වය ඇති කිරීමටද පුළුවන.

රෝගය වැළඳීමට ප්‍රථම ඉන් ආරක්‍ෂාවීම

මෙසේ කළහැකි වන්නේ මැලේරියාව ඇති ප්‍රදේශවල සිටින අවදනම් සහිත අය, එනම් කුඩා දරුවන් සහ ගැබිනි මව්වරුන්ට රෝගයෙන් ආරක්‍ෂාවීමට මාපධ ලබාදීම. මෙහිදී සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලදී භාවිතා කරනවාට වඩා වෙනස් අයුරකින් භාවිතා කරන අතර එය මැලේරියාව නැති ප්‍රදේශයක සිට එම ප්‍රදේශවලට යන අයටත් භාවිතා කළ හැකියි.

මැලේරියා සඳහා එන්නත් කිරීම

මේ දක්වා පිළිගත් සාර්ථක එන්නතක් නිපදවා නැතත් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ විශාල වශයෙන් කෙරීගෙන යනු

ලබති. මේ සඳහා පරපෝෂිතයාගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථා හා සම්බන්ධ එන්නත් ඇති කිරීමට පරීක්ෂණ සිදු කෙරේ. එනම් පරපෝෂිතයා මදුරුවාගේ සිට මිනිසා තුළට ඇතුල්වන ස්පෝරොසොයිටයට විරුද්ධව ප්‍රතිශක්තියක් ඇති කිරීම සඳහා එන්නත් නිපදවීමෙන් රෝගය වැළඳීම නතර කළ හැකිය. එසේම රතුරුධිරාණු සෛල තුළ සිටිනා විවිධ අවධිවලට අනුරූපව එන්නත් සෑදීම සඳහාද පරීක්ෂණ සිදු කෙරේ.

මදුරුවන් දෂ්ඨකිරීම වැළැක්වීම

මේ සඳහා විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කිරීම මගින් රෝගය වැළඳීම සැහෙන දුරකට අඩුකළ හැකි අතර එමගින් වහන මදුරුවා විනාශ කිරීමත් සිදුවේ. ඇන්ටිසිප් මදුරුවා දෂ්ඨ කරන්නේ සවස් කාලයේදී සහ උදය පාන්දරම නිසා, මෙම කාලවලදී මෙය වැඩි වශයෙන් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුයි. මදුරුදැල් මේ සඳහා භාවිතා කිරීම, විශේෂයෙන් නින්දට යාමේදීත්, එසේම එම මදුරුදැල් ප්‍රතිබෝධනාශකයක් වන පයිරිත්‍රොසිඩ් හි හිල්වා වේලා එල්ලීමෙන් මදුරුවා විනාශ කිරීමකුත් සිදුවේ. මෙහිදී සිදු වන්නේ ප්‍රතිබෝධනාශකය මදුරුවාගේ පාද තුළින් ශරීරයට ඇතුළුවී මදුරුවා මිය යාමයි. මෙය ඉතා ප්‍රචලිත ආරක්‍ෂාකාරී ක්‍රමයකි.

එසේම මීට අමතරව දෙර ජනෙල් ආවරණ වලටත් ප්‍රතිබෝධනාශක ගැල්වීමත්, මදුරු දහර දැල්වීමත්, මදුරුවන් පලවා හැරිය හැකි ආලේපන වර්ග සමෙහි ගැල්වීමත් මගින් මදුරුවන් දෂ්ඨ කිරීම අඩුකළ හැකිය. නිවසක දෙර ජනෙල් සවිකිරීමත් සවස් කාලයේදී ශරීර ආවරණය වී තිබෙන සේ ඇඳුම් ඇඳීම මගින්ද ආරක්‍ෂාව සැලසේ. නිවාස ඉදිකිරීමේදීත් මදුරුවන් වැඩිපුර සිටින ස්ථාන වලින් දුරස්ථව එවා ඉදිකිරීමට පෙළඹවීමෙන් මදුරුවන් වැඩි වශයෙන් බෝවිය හැකි ස්ථාන විනාශ කිරීමත්, නිවාස තැනීමේදී මදුරුවන්ගෙන් ආරක්‍ෂා වියහැකි ලෙස ඒවා තැනීමත් සිදුකළ හැකිය.

මදුරුවන් රෝගීවීම අඩුකිරීම

අගල්, කාණු, කුණු වලවල්, වතුර පිරුණු මැණික් ගැරු පතල් වසා දැමීමත්, ටින් කැබලි, තැඹිලි කෝම්බ නිසි ලෙස බැහැර කිරීමත් ලිං ජලය එකතුකරන වැංකි නිසි ලෙස ආවරණය කිරීමත් කළ හැකිය. එසේම ග්‍රාමීය සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත්, මාර්ග සංවර්ධනයේදීත් වාරිමාර්ග වැඩවලදීත් ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියා කිරීම යෝග්‍ය වේ.

මදුරුවන් විනාශ කිරීම - ස්වාභාවික ක්‍රම

මදුරුවන් විනාශ කිරීමට විවිධ ක්‍රම ඇතත් ස්වාභාවික ක්‍රම අනුගමනය කර සිදු කිරීමෙන් ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පිළිවන. මදුරු පිළවුන් විනාශ කිරීමට බැක්ටීරියා වර්ග ඇති කිරීමත් සිදු කරනු ලැබේ.

බරවා රෝගය

වෛද්‍ය ඩී.එම්. ගෞතමදාස

අංශ ප්‍රධාන,

බරවා රෝග මර්දන ව්‍යාපාරය

දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල.

රෝග ඉතිහාසය :

බරවා රෝගය, ඉතා පැරණි ඉතිහාසයක් ඇති, නිමටෝඩ ගණයට අයත් පරපෝෂිත පණුවකු මගින් වැළඳෙන, මදුරු වාහකයෙකු මගින් පැතිරෙන රෝගයකි. මේ රෝගය සම්බන්ධව මුල් වරට කරුණු සඳහන් වී ඇත්තේ ක්‍රි. පූ. ෩ වන සිය වසේදී සංඝයා වහන්සේ වෙනුවෙන් ලියන ලද විනය පිටකයේය. ක්‍රි.ව. 339 දී බුද්ධදාස රජු විසින් ලියන ලද සාරථ සංග්‍රහය, ක්‍රි.ව. 1665 දී පලවූ යෝගරත්නාකරය වැනි ග්‍රන්ථ වලද මේ රෝගය ගැන සඳහන්වී ඇත. බරවා රෝගය සම්බන්ධව, ප්‍රථම වරට විද්‍යාත්මක කරුණු දැනගැනීමට ගැති වූයේ ක්‍රි.ව. 1879 දීය.

බරවා වර්ග :

බරවා රෝගය, ගම්බද හා නාගරික බරවා යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදිය හැක. ගම්බද බරවා රෝගය 12 වන සියවසේදී මලයා රටින්ද නාගරික බරවා රෝගය 15 වන සියවසේදී චීනයෙන්ද ලක්දිවට පැතුරුණේ විදේශීය ආක්‍රමණ නිසාය.

ගම්බද බරවා සහ එහි මර්දනය :

මේ රෝගය සම්බන්ධව සම්පූර්ණ මුල්වරට පැවැත්වූයේ 1914 දී මැන්සර්බාර් විසිනි. ඉන් ඉක්බිතිව සම්පූර්ණ නිපයක් පැවැත්වූන ද, දීප ව්‍යාප්ත සම්පූර්ණයක් මුල් වරට පැවැත්වූයේ 1936-1939 සමයේදී දසනායක විසිනි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල (විශේෂයෙන් වැව් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ) බරවා රෝගය පැතිර ඇති බවට කරුණු හෙළි විය. එකට මෙහි දක්නට ලැබුණේ (*Brugia malayi*) බුරුගිය මලායි නම් පරපෝෂිතයා මගින් බෝවන ගම්බද බරවා රෝගයයි. මෙම රෝගය එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් තව කෙනෙකුට පැතුරුණේ මැන්සෝනියා ගනයට අයිති මදුරුවෙකු මගිනි. දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පසු, බරවා රෝගයෙන් පෙළෙන්නන් විශාල සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවූ අතර, එය විශාල සෞඛ්‍ය ගැටළුවක් වූයෙන්, 1947 දී බරවා රෝගය මර්දනය කිරීම උදෙසා විශේෂ ව්‍යාපාරයක් අරඹන ලදී. එහි


ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් රෝගකාරක පණුවන් හා රෝගය පතුරුවන මදුරුවන් මර්දනය කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක කළ ක්‍රියාදාමයන් හේතුකොටගෙන, 1949 වන විට රෝගය බොහෝ දුරට මර්දනය වූ අතර, 1965 න් පසු ගම්බද බරවා රෝගීන් කිසිවකු වාර්තා නොවීය.

නාගරික බරවා රෝගය :

1949 සිට නාගරික බරවා රෝගය ලංකාවේ දකුණු හා බස්නාහිර මුහුදු තීරුවේ ව්‍යාප්තවීමට පටන්ගත් අතර, එයට මදුරුවාහක රෝග අතුරින් ප්‍රධාන තැනක් හිමි විය.

අද මෙම රෝගය ලංකාවේ බස්නාහිර, දකුණු, වයඹ යන ප්‍රධාන පළාත් සභා තුනක ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, මේ ප්‍රදේශවල වසන මිලියන 9.5 ක පමණ ජනගහනයක් රෝගයට ගොදුරුවී සිටිති.

නාගරික බරවා රෝගකාරකයා වනුයේ, ඩුවරේරියා බැන්ක්‍රොෆ්ට් (*Wuchereria bancrofti*) නැමති පරපෝෂිතයාය. මේ පරපෝෂිතයාගේ නිටයන්, රෝගී පුද්ගලයෙකු වෙත සිට නිරෝගී අයෙකු වෙත ගෙන යනු ලබන්නේ ක්‍රිෂ්ලෙක්ස් ක්වින්කිපැයියේටස් නැමති මදුරු විශේෂය මගිනි.



රූපය 1 : බරවා රෝගය බෝකරනු ලබන ක්‍රිෂ්ලෙක්ස් ක්වින්කිපැයියේටස් මදුරු විශේෂය

රෝගය වැළඳුනු මුල් අවස්ථාවේදී කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නොදක්වා, කෙනෙකුගේ සිරුර තුළ බරවා කිටයන්ට ජීවත්වීමට පුළුවන. පූර්ණ නිරෝගි පෙනුමක් දක්වන මෙම පුද්ගලයාගෙන් සමාජය වගයෙන් උවදුරක් වන්නේ, රෝගය පැතිරීමේ හැකියාව ඔවුන් සතුව ඇති හෙයිනි. තවද, බාහිර රෝග ලක්ෂණ නොතිබුණත්, මේ පුද්ගලයින්ගේ වසා පද්ධතියට හා වකුගඩු වලට මෙම රෝගය බලපෑ හැකිබව සොයා ගෙන ඇති මතයයි.

රෝගය ආසාදිත ගැහැණු මදුරුවකු දණ්ඩ කළ විට, මදුරුවාගේ ශරීරයෙන් පිටවන කිටයන් වසා පද්ධතියට ඇතුළුවී වර්ධනය වේ. මාස 09 ක පමණ කාලයකදී වැඩුණු පණුවකු වන කිටයා, ඉන්පසු වසර හය හතක් සිරුරේ ජීවත් වේ. මේ කාලයේදී ගැහැණු පණුවකු කිටයන් (සුක්ෂම බරවා පණුවන්) දහස් ගණන් බිහිකරයි. මේ සුක්ෂම බරවා පණුවන් පර්යන්ත සිරුරට එක් වන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී හෙයින් රුධිර පටලයක් ලබාගත යුත්තේ රාත්‍රී කාලයේදී ය.

සුක්ෂම බරවා පණුවා මාස 12 ක පමණ කාලයක් මිනිස් සිරුරේ ජීවත් වීමට සමත්ය. එම වකවානුවේදී දණ්ඩ කරනු ලබන ක්‍රියාලෙක්සුන් කිහිපයක් පැයියේවස් ගැහැණු මදුරුවකුගේ ශරීරගත වීමෙන් අනතුරුව දින 12 ක පමණ කාලයක් මදුරුවාගේ ශරීරයේදී වර්ධනය වී සිය ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරගෙන නැවත වෙනත් අයකුට දණ්ඩ කිරීමේදී එම පුද්ගලයාට රෝගය පැතිරවීමට සමත්වෙයි.

රෝග ලක්ෂණ :

බරවා රෝගයේ මූලික ලක්ෂණ ගණනාවකි.

- * මද උණ ගතිය, ඇතිව ඉබේම නැතිවන ඉදිමුට.
- * රාත්‍රී කාලයේ කැස්ස, රතු ලප.
- * කුද්දෙටි මතු වීම, සන්ධි ඉදිමුම, මස්පිඩු වේදනා, කැසීම, අත්පා ඉදිමුම.
- * රතු පැහැති ඉරි සමේ මතු වීම, කිරි පැහැති මුත්‍රා පිටවීම, පියසුරු ඉදිමුම.
- * පුරුප ගුහු නාල හා වාපණ කෝප ඉදිමුම ආදිය බරවා රෝගයේ සුලභ ලක්ෂණ වෙයි.
- * අලි කකුල්වල ස්වරූපය ඇති වන්නේ රෝගය උත්සන්නවී වසා නාල පූර්ණ වගයෙන් අවහිර වූ පසුය.



රූපය 2 : කල්ගිය ගැටිති සහිත බරවා පාදයක් (ශ්ලිප්දය)



රූපය 3 : කල්ගිය බරවා අතක්

රෝග මර්දනය

රුධිර පරීක්ෂණය :

බරවා කිටයන් ගර්ථගතව ඇත්දැයි හඳුනා ගැනීමට රුධිර පටලයක් ගත යුත්තේ රාත්‍රි කාලයේය. මේ සඳහා රුධිරය ලබා ගැනීමට වඩාත්ම සුදුසු කාලය නම් රාත්‍රි 10 න් උදේ 2 න් අතර වුවද මේ කාලය එතරම් ප්‍රායෝගිකව සුදුසු නොවේ. බරවා රෝග කාරකයාට එරෙහිව ප්‍රතිදේහ ඇත්දැයි පිරික්සීම කලහැකි වුවද, ආසාදිත මදුරු දළ්ඨනයකට පසුව බොහෝ දෙනෙකුගේ ගර්ථයේ තාවකාලිකව ප්‍රතිදේහ හට ගන්නා හෙයින්, මේ පරීක්ෂණ රෝගය නිගමනය කිරීමට එතරම් සුදුසු නොවේ.

ඖෂධ ප්‍රතිකාර :

රුධිර පරීක්ෂණයකට පසුව පුද්ගලයෙකු බරවා රෝගයෙන් පෙළෙන බව සනාථ වුවහොත්, රෝගය උත්සන්න වීමට ප්‍රථම ප්‍රතිකාර ලබාදීම වැදගත්. මේ සඳහා වයි ජනසිල් හා කාබමයින් සිට්‍රේට් (ඩී.ජී.සී) නැමති ඖෂධය ලබා දෙන අතර, මේ ප්‍රතිකාර වෛද්‍ය උපදෙස් මත ලබා දිය යුතුය. එවන් රෝගී පුද්ගලයෙකුට මේ ඖෂධය බරවා මර්දන විශේෂ සායනයකින් හෝ රජයේ රෝහලකින් හෝ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයකින් නොමිලේ ලබාගත හැක.



රූපය 4 : බරවා රෝගය මර්දනය සඳහා ලබා දෙන ඖෂධ

ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේදී සමහරෙකුට විවිධ ප්‍රතික්‍රියා ඇතිවිය හැක. මද උණ ගතිය, හිසරදය, සිරුරේ ඉදිමුම, කැසීම, මලබද්ධය, ආදී ඉන් කිපයක් වන අතර, මේවා

වැඩිපුර දැකිය හැකි වන්නේ කිටයන් වැඩිපුර සිටින අයගේය. කෙසේ හෝ මේ ප්‍රතික්‍රියා තාවකාලිකව පවතින හෙයින්, ප්‍රතිකාර මාලාව උපදෙස් අනුව, දිගින් දිගටම ගත යුතුය.

මදුරුවන් මර්දනය

වාහක මදුරුවන් මර්දනය

අද බරවා රෝගය ජනාකීර්ණ, නගරාශ්‍රිත රෝගයක් බවට පත්ව ඇත. මීට හේතුවී ඇත්තේ, සැලසුමෙන් තොර කඩිනම් නාගරීකරණය නිසා මිනිසා විසින් සාදන බෝවන ස්ථාන අධික වීමය. ක්‍රිස්ටෝෆර් ක්වින්ස්ටැඩ්ස්ටැඩ්ස් මදුරුවා බෝ වන්නේ ගලා නොයන අපිරිසිදු ජලයේය. මෙවන් ස්ථාන නාගරික පරිසරයක බහුලව දැකිය හැකිය. එබැවින් තාවකාලික බෝවන ස්ථාන ඉවත් කිරීම හා ස්ථිර බෝවන ස්ථාන වලට පිළියම් සෙවීම අවශ්‍යය. පාලු ලීං වයා දැමීම, අබලන් කාණු හා වැසිකිලි වලවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, අවහිර කාණු ගලා යාමට සැලසීම මෙහිදී වැදගත් වේ. තවද, මේ නයින් මදුරු මර්දනය කල නොහැකි ස්ථාන වලට කිට නාශක රසායනික බෙහෙත් ක්‍රමානුකූලව යොදනු ලැබේ. මීට අමතරව, මදුරු දළ්ඨනයෙන් වැලකී සිටීමට, මදුරු දූල් භාවිතය, මදුරු දූල්වලට රසායනික ගැල්වීම, මදුරුවන් පලවා හැරීමේ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි ක්‍රමෝපායන්ද මේ සඳහා උපයෝගී කරගත හැක.

පරපෝෂිත මර්දනය, මදුරු කිට සහ පිලා මර්දනය :

මේ දක්වා බරවා රෝග මර්දනය සඳහා පරපෝෂිත මර්දනය ප්‍රධාන වශයෙන් ද, කිට නාශක මගින් වාහක මර්දනය නගර සභා සීමාවන් තුළ සුළු වශයෙන්ද කෙරී ගෙන යයි. මේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී රෝගාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සෑම ගෙදරකටම ගොස් වසරකට වරක් එම ප්‍රදේශයේ සෑම පුද්ගලයෙකුගේම රුධිර පටලයක් ලබා ගැනීම සීමිත සම්පත් තුළ පහසු කාර්යයක් නොවේ. එසේ හඳුනාගත් සුක්‍ෂම බරවා පණුවන් සහිත පුද්ගලයන්ට සති දෙකක ප්‍රතිකාර මාලාවක් ලබා දුන්නද, එය සම්පූර්ණයෙන් අරගන්නේද යන්න සැක සහිතය. පිලානාශක බෙහෙත් මිල අධික අතර, ඉන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන තාවකාලිකය. ඇරුන් ඒ මගින් වන පරිසර දූෂණය හේතුකොට ගෙන පැන නැගිය හැකි දිරසකාලීන ප්‍රතිවිපාක ගැනද අප සැලකිලිමත් විය යුතුය.

රෝගයේ වර්තමාන තත්ත්වය :

අද ලෝක ජනගහනයෙන් දශ ලක්ෂ 120 ක් පමණ බරවා රෝගයෙන් පෙළෙන අතර, එයින් දශ ලක්ෂ 76 ක් පමණ රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන්ය. මින් බහුතරයක් වයස්ගත දකුණු - නැගෙනහිර ආසියාතික රටවලය. අද එම රටවල් 10 කින් 8 ක රෝගය දක්නට ලැබේ. මාරාන්තික නොවුවද, එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඇතිවන අංග විරූපිතාවය නිසා මිනිසාට ශාරීරික වශයෙන් පමණක් නොව, මානසික,

සමාජය හා ආර්ථික වශයෙන් මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටළු අපමණය. අද ලෝකයේ තුරන් කළ හැකි බෝවන රෝග ගයකින් එකකි බර්වා රෝගය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහභාගිත්වය සහ එක්දින ප්‍රතිකාර ක්‍රමය :

මේ කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, අද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ මත, රෝග මර්දන කටයුතු තව මුහුණවරකින් සිදුකිරීමට කටයුතු කරගෙන යනු ඇත. මෙහිදී, රාත්‍රි රුධිර පටල මගින් මුළු රෝගාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ රෝගීන් හඳුනා ප්‍රතිකාර ලබාදීම වෙනුවට, රෝගාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ මුළු ජනගහනයටම එක් දින ප්‍රතිකාර මාලාවක් ලබාදීම සිදු කෙරේ. මේ සඳහා ඩයි ජනයිල් කාබමයිත් සිට්ට්ට් නැමති ඖෂධය උපයෝගී කරගන්නා අතර, ශරීරයේ සෑම කිලෝග්‍රෑමයක බරකටම මෙම බෙහෙත් මිලිග්‍රෑම් 06 ක් බැගින් වාර්ෂිකව ලබා දීමෙන් අවුරුදු 6 7 ක් අතරදී රෝගය තුරන් කළ හැකි බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය උපදෙස් දී ඇත. මෙම ඖෂධය තනිව දෙනවා වෙනුවට ඇල්බෙන්ඩයෝල් නම් ඖෂධයත් සමග එකවර, වසරකට වරක් ලබාදීම වඩා ඵලදායී බව මවුන් පෙන්ටයි, ඇල්බෙන්ඩයෝල් වලින් උදරයේ වෙනත් පණුවන් මර්ධනය කළහැකි අතර, ඒ මගින් අප අතර දක්නට ලැබෙන නිරක්තියද දුරුකර ගැනීමටද හැකිවනු ඇත.

අප රටේ එක්දින ප්‍රතිකාර ක්‍රමය 1997 දී දියත් කරනු ලැබීය. ඉන් අනතුරුව 1999 සහ 2000 අප්‍රේල් වල මෙය ජාතික වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරුණි. මේ අවස්ථාවේ ඩයි ජනයිල් කාබමයිත් (ඩී.ජී.සී) පෙති පමණක් භාවිතා කරන ලදී. කෙසේ හෝ වර්ෂ 2001 ක් මාර්තු මස ඇල්බෙන්ඩයෝල් හා ඩී.ජී.සී සංයෝගය භාවිතා කිරීමට දැනට කටයුතු යොදා ගෙන යනු ලැබේ. මෙම ප්‍රතිකාරය ලබාදීමේදී, නියම ඵල ලැබීමට නම් රෝගාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සෑම පුද්ගලයෙකු විසින්ම (අවුරුදු 2 ට වැඩි, ගර්භණී හා නිර් දෙන මව්වරුන් හැරුණු විට) මෙම ඖෂධය භාවිතා කළ යුතුය. එසේ පෙති ලබා දීමේදී, අවම වශයෙන් 80% වක් පෙති භාවිතයට ලක් නොවන්නේ නම්, වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළයුතු කාලය අපේක්ෂිත අවුරුදු 5 - 6 කාලයට වඩා දීර්ඝ කිරීමට සිදුවනු ඇත.

බර්වා රෝගය මර්දනය කළහැකි, අප සමාජයෙන් තුරන් කළහැකි රෝගයකි. ඒ සඳහා මිනිස් සිරුර තුළ වෙසෙන බීජ පණුවන් අඩු කිරීම හා රෝගය පතුරුවන මිදුරුවන්ගේ සහත්වය අඩු කිරීම යන පියවර දෙකම සාර්ථකව කළ යුතුය. තවද රෝග ලක්ෂණ සහිත පුද්ගලයන්ට හා රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන්ට මේ එක්දින ප්‍රතිකාරය ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා සම්පූර්ණ ප්‍රතිකාර මාලාව දියයුතු අතර, රෝගය උත්සන්නවී ඇති අයට, ක්‍රමානුකූලව ආබාධිත ඉන්ද්‍රියයන් පිරිසිදුව තබා ගැනීමෙන් රෝගය වර්ධනය වීම වැළැක්විය හැක. එබැවින් මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගැනීම උදෙසා පූර්ණ ජනතා සහයෝගය හා සහභාගිත්වය අත්‍යාවශ්‍යය.

මිදුරාව විදුරාව කළාපය, වෙළුම 21, අංක 1

මෙම කළාපය "විද්‍යා සන්නිවේදනය" තේමා කරගෙන පළවනු ඇත. එහි ලිපි පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කෙරෙනු ඇත.

- * විද්‍යා සන්නිවේදනයේදී යොදා ගන්නා භාෂාව
- * විද්‍යා සන්නිවේදනය පිළිබඳ සඟරා
- * විද්‍යා සන්නිවේදනයේලා මාධ්‍ය සතු කාර්යභාරය
- * විද්‍යා සන්නිවේදනය සඳහා නාව්‍යකරණය යොදාගැනීම

ජපන් නිකර්පර ප්‍රදානය

(ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස්)

වෛද්‍ය ටී.එ. කුලතිලක
නිකේෂ වසංගත රෝග විද්‍යාඥ
වසංගත රෝග ඒකකය
කොළඹ

රෝගය හැඳින්වීම

ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් යනු එන්සෙප්ලයිට්ස් රෝග අතුරින් එක් වර්ගයක් පමණි. වසංගතයක් ලෙස පැතිරී යන්නේ වෛරස මගින් ඇතිවන එන්සෙප්ලයිට්ස් රෝගයයි. මෙය මොලේ උණ රෝගය නැත්නම් මොළය ඉදිමීමේ රෝගය හැටියටත් ජනතාව අතර ප්‍රචලිතය. මේ රෝගයේදී සිදු වන්නේ මූලිකව මොළය ඉදිමීමයි. එම නිසා මොළය වටා ඇති ආරක්ෂිත පටලය මතත්, අස්ථි හිස් කබලේ ඇතුළු අස්ථි මතත් මොළයේ තෙරපීම වැඩි වෙයි. අවසානයේදී මෙම රෝගය නිසා මරණය පවා සිදු වේ.

සාමාන්‍යයෙන් මෙම රෝගය සෑදී රෝහල් ගතවන රෝගීන් සියයක් අතුරින් 5-10 ක් පමණ මිය යන අතර එයින් 90%-95% ක් පමණ රෝගයෙන් ගැලවේ. එහෙත් සුව වෙන රෝගීන්ගෙන් අඩක් පමණ සුවකළ නොහැකි අතුරු ආබාධ උරුම කර ගනියි.

වඩාත්ම හයානක කරුණ නම්, මෙය පැතිරී යන රෝගයක් වීමයි. එබැවින් අති විශාල ප්‍රමාණයක් ජව බිලිවීමට දඩි අවදනමක් ඇත.

රෝග ඉතිහාසය

මෙම රෝගයේ රෝග කාරකය වන ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් වෛරසය ප්‍රථමයෙන්ම හඳුනා ගන්නා ලද්දේ 1935 වසරේදී ජපන් පර්යේෂකයන් විසිනි. ලංකාවේ මෙම රෝගයේ රෝග කාරකය වන ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් වසිරය සොයා ගන්නා ලද්දේ 1968 වසරේදීය.

ලෝකයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ රෝග ව්‍යාප්තිය

ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් රෝගය ආසියානු කලාපීය රටවල ජනයාට මුහුණපෑමට ඇති වැදගත් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයකි. ලෝක සංවිධානයේ වාර්තා අනුව වර්ෂයකට ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් රෝගීන් 50,000 ක් පමණ වාර්තාවේ. පසුගිය විසි වසර තුළ මෙම රෝගය ලංකාවේ නොයෙක්

පළාත්වල පැතිර ගිය අතර එය පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙලවල් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ලංකාවේ මෙම රෝගය වසංගත තත්ත්වයෙන් 1994/95 වසරවල පැතිර යන ලදී. 1997 වසරේදී රෝගීන් 766 දෙනෙක් වාර්තා වූ අතර එම රෝගීන්ගෙන් 138 දෙනෙක් මිය යන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර රෝගීන් වාර්තා වන්නේ නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් සහ ජනවාරි මාස වලය. මෙම වැඩිවීම වසර අතරින් පමණ පටන් ගන්නා ජ්‍යාන දිග මෝසම් වර්ෂාවත් සමඟ සම්බන්ධතාවක් පවතී.

ලංකාවේ ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් රෝගීන් වැඩිපුරම වාර්තා වන්නේ අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල, ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක වලිනි.

රෝගය ඇති කරන පිටි විශේෂය

රෝගය ඇතිකරනු ලබන රෝග කාරකයා වනුයේ වෛරස වර්ගයකි. එම වෛරස වර්ගය හඳුන්වන්නේ ජැපනීස් එන්සෙප්ලයිට්ස් වෛරස නමිනි.

වෛරසය සෑම කෙනෙකුගේම මොළයට ඇතුළුවේද?

මෙම වෛරසය මිනිස් මොළය තම ජීවත්වීම සඳහා වාසගුමිය ලෙස තෝරා ගන්නා අතර එය විනාශයට පත් කිරීමද වෛරස මගින් සිදු කරයි. මෙය රෝගයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි. මිනිස් සිරුර තුළට වෛරස් ඇතුළුවන අවස්ථාවකදී එම වෛරස් මොළය තුළට ගමන් කිරීමට ඇති සම්භාව්‍යතාවය පුද්ගලයින් 200-1000 අතරින් එක් පුද්ගලයෙක් පමණ වේ. මොළය ඉදිමීමට ලක් වනුයේ එසේ මොළය කරා ගමන් කරන වෛරස හේතුවෙනි.

රෝග වාහකයා

මේ රෝගයේ "රෝග වාහකයා" හෙවත් රෝගය පතුරුවනු ලබන්නේ මදුරුවෙකු මගිනි. එම මදුරුවන් ක්‍රියාලක්ෂ ගණයේ වේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ එවන් මදුරු විශේෂ

දෙකක් දැකිය හැකියි. ඒ ක්‍රියාලෙක්ස් ට්‍රයිට්නියෝර්න්කස් හා ක්‍රියාලෙක්ස් ජෙලිඩස්ස්.

මදුරුවා පිවත්වන ස්ථාන

ට්‍රයිට්නියෝර්න්කස් මදුරුවා දිව් ගෙවත්තේ කුඹුරු ආශ්‍රිතව කුඹුරුවල පවත්නා ජලයේයි. ඔවුන් ඒ තුල බිත්තර දමයි. උතුරු මැද පළාතේ සශ්‍රික වූ කුඹුරු සහිත වටපිටාවේ මෙම මදුරුවන් අධික ලෙස දැකිය හැකියි.

ජෙලිඩස් මදුරුවා බිත්තර දමන්නේ ජලය එකරැස් වන වලවල් ආදියේය. මේ නිසා පොල් ලෙලි වලවල් ආදිය බහුලව පවතින ලංකාවේ වෙරළබඩ තීරයක් එම මදුරුවාට කදිම පරිසරයකි. එමනිසාම එම ප්‍රදේශවලද රෝගය බහුලයි.

මදුරු දෂ්ඨතය

මිනිසාට දෂ්ඨ කරන්නේ ජෑපනිස් එන්සෙපලයිටිස් බෝකරන මදුරුවන්ගේ ගැහැණු සතුන් පමණකි. මොවුන් මුළු රාත්‍රි කාලයේම මිනිසුන්ට දෂ්ඨ කරනු ලබන අතර වැඩි වශයෙන්ම රුධිරය උරා බොන්නේ සවස 6.30 සිට රාත්‍රි 9.30 හා උදයන 2.00 සිට 5.30 අතර කාලයේදීය. මේ මදුරුවන්ගේ දෂ්ට කිරීමට මිනිසුන් ගොදුරු වන්නේ නිවෙස්වලදී නොව ප්‍රදිග්‍රහණේදීය.

මෙම මදුරුවන්ගේ ජීවිත කාලය සති 6-8 ක් පමණ වන බව පෙනී ගොස් ඇත. එක් මදුරුවෙකුට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ මීටර් 1 ක් 2 ක් වැනි දුරකට පියඹා යා හැකිය.

මදුරුවා රෝගබීජ ගෙනයන වාහකයෙක් පමණක්ම නොවෙයි. වෛරසයක් බෝ කිරීමේ (ගුණනය කිරීමේ) තවදුරටත් මදුරුවා තුළදීම සිදුවේ. මදුරුවා තුල ගුණනය වූ එම වෛරස මදුරු කෙළවලට එකතු වෙයි. මදුරුවා යම් පුද්ගලයෙකුගෙන් ලේ උරා බීමේදී දෂ්ඨ කළ තැනින් කෙළ ස්වල්පයක් ලේ වලට එක් කිරීම නිසා මිනිසාගේ ශරීරය තුලටද වෛරස ඇතුළු වේ.

රෝග ලක්ෂණ

වෛරස් ශරීර ගතවීමෙන් පසු දින 6-15 අතර කාලයකින් රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.

- * පලමුවෙන් උණ ඇතිවී ඒ සමග දරුණු හිස් කැක්කුම, කුඩා ලමයින් තම් තදබල අසහනකාරී බවක් පෙන්නවයි.
- * අතපය වේදනාව, බෙල්ලේ තද ගතිය සහ සිහි කල්පනාව අඩුකම මූලික රෝග ලක්ෂණ වේ.
- * උණ වලිස්සුව අතුරු ආබාධයක් ලෙස ලමයින්ට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ටත් ඇති වේ.

* ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ හැකියාව දුර්වලවීමක් සිදුවන නිසා මුත්‍රා ආබාධ ඇතිකරන විෂබීජ වර්ධනය වීමට පුළුවන. මේ හේතුවෙන් මුත්‍රාබාධ ද ඇතිවිය හැකිය.

* වලිස්සුව ඇතිවීමද රෝග ලක්ෂණයකි. එබැවින් වලිස්සුව ඇතිවූ රෝගියෙකුට ජපන් නිකර්පර ප්‍රදහයටද බෙහෙත් ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

මෙම රෝගය වේගයෙන් පැතිරී යන කාලයක නම්, දින 3-4 ක් උණ පැවතියේ නම් රෝගියා රෝහල වෙත යෑම අවශ්‍ය වේ. තවද උණ සැදුණු පමණින් එය සුවකර ගතහොත් වෙනත් අතුරු ආබාධ ඇතිවීමට ඉඩක් නැත. අතුරු ආබාධ ඇති වනුයේ වෛරස මගින් මොළය ආක්‍රමණය කළ විටයි. නමුත් වේදනා නාශක හෝ උණ අඩුකර ගන්නා ඖෂධ භාවිතා කරමින් කාලය ගත කළහොත් වෛරස මොළයට ඇතුළුවී එහි කොටස් විනාශ කිරීමට සමත් වෙයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අතුරු ආබාධ ද ඇතිවේ. අතුරු මතය වනුයේ ආබාධවල භයානක කම රඳා පවතින්නේ මෙසේ මොළයට සිදුවන හානියේ ප්‍රමාණය මතයි.

රෝගයෙන් මරණයට පත්වීමට හේතු

රෝහල්වලට ඇතුළු කරනු ලබන රෝගීන් අතුරෙන් 5-10% ක් පමණ මිය යාම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවේ. මෙයින් කොටසක් රෝගය නිසා මොළයට සිදුවන හානියෙන්ම මිය යෑමට පුළුවන. මීට අමතරව පහත සඳහන් තත්ත්වයන් නිසාද මිය යෑම සිදුවේ.

ආ) පෝෂණය හා ජලය මදුවීම:

සිහිය මදිකම හේතුවෙන් මේ රෝගීන්ට නිසි පෝෂණය නොලැබේ. ජලයද වැඩිපුර පානය කිරීමටද නොලැබේ. පෝෂණය හා ජලය ජීවය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය බැවින් ප්‍රමාණවත් පෝෂණය හා ජලය ශරීරයට නොලැබීමෙන් රෝගීන් මිය යයි.

ආ) විෂබීජ මගින් පැතිරෙන වෙනත් ලෙඩ බෝවීම


සිහිය මදිකම සහ ශරීරය දුර්වලවීම හේතුවෙන් රෝගියාට කහින්නටද අපහසුවේ. කැස්ස ස්වසන මාර්ගයට ඇතුළුවන අහිතකර ද්‍රව්‍ය පලවා හරින එක් උපක්‍රමයකි. මෙම උපක්‍රමය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා නිව්මෝනියාව වැනි රෝග ඇති කරන විෂබීජ ඇතුළුවීම පහසුවේ. එම රෝග මගින්ද මියයාම සිදු කරයි.

රෝගය බෝවීම

මෙම රෝගය ඇති කරන වෛරසය කෙළින්ම එක් මිනිසකුගේ සිට තවත් මිනිසකුට මදුරුවන් මගින් ගමන් කිරීමක් පිළිබඳව තවමත් සැලකිය යුතු තරම් සාක්ෂි ලැබී නැත.

තවද එක් හරකකුගේ හෝ එළුවකුගේ සිට වෙනත් හරකෙකුට හෝ එළුවකුට වෛරස් ඇතුළුවන බවක්ද වාර්තාවී ඇත. නමුත් උරුමයෙන් වෙනත් උරුමකුට මදුරුවන් මගින් වෛරස ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව සොයා ගෙන ඇත.

එබැවින් එම සතුන්ගේ සිරුරු තුළට එම වෛරස මදුරුවන්ගේ මාර්ගයෙන් ඇතුළු වෙයි. නමුත් ජීව ප්‍රතිචාර වශයෙන් එම සතුන්ට රෝග ලක්ෂණ පහල වන්නේ නැත. එහෙත් ජීවයන් ගබඩා වීමට මෙවන් වෛරස ගර්භගත වීම බලපාන බැව් නම් සොයා ගෙන ඇත.



රූපය 1 : ජපන් එන්සෙපලයිටිස් රෝගයේ ස්වාභාවික ජීවන චක්‍රය

1. මදුරුවන් විශාල ලෙස බෝවීමත් සමගම මිනිසාට රෝග තර්ජනය ඇතිවේ. 2. කුරුල්ලන් තුළ චක්‍රය
3. මිනිසාගෙන් මිනිසාට පැතිරීමක් නැත. 4. උරුම තුළ වෛරසය වර්ධනය වේ. 5. උරුම තුළ චක්‍රය
6. වැසි වතුර පිරි ජලාශ සහ කුඹුරුවල මදුරුවා බෝවේ. 7. කුකුළු හා සත්ත්ව ලේ වලට මදුරුවා ප්‍රිය කරයි.

සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නේ ජපනීස් එන්සෙපලයිටිස් වෛරස මදුරුවන්ගේ හා කුරුල්ලන්ගේ සිරුරු තුළට ඇතුළුවීමෙන් තම ජීවන චක්‍රය පවත්වාගෙන යාමයි. වනගත කුරුල්ලන්ගෙන් මදුරුවන්ටත්, නැවතත් එම මදුරුවන්ගෙන් කුරුල්ලන්ටත් ගමන් කරමින් එම වෛරසය තම පැවැත්ම පරිසරය තුළ සහතික කර ගනියි.

නමුත් ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල දීත්, මෝසම් සමය වැනි වැසි අධික කාලවලදීත්, එම මදුරු ගහණයක් විශාල වශයෙන් ඉහළ යෑවෙයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වන්නේ එම මදුරුවන්ගේ අතවරයට වැඩි වැඩියෙන් අපගේ නිවාස ආශ්‍රිතව වෙසෙන උරුම, එළුවන්, හරකුන් ආදී සතුන් ලක්වීමයි.

උරුමයේ සිරුරු තුළට වෛරස ඇතුළුවීමෙන් මෙය ඉතා හයානක තත්ත්වයක් බවට පත් වෙයි. උරුමයේ රුධිරයත් සමග නිරතුරුවම සංසරණය වන එම වෛරස සිසු සංඛ්‍යාවෙන් ඉහළ යයි. එම නිසා විශාල මදුරුවන් සංඛ්‍යාවකට එම උරුම ඔස්සේ වෛරස ඇතුළුවීම සිදු වෙයි. එවන් උරුම "වෛරස වර්ධක හැටියටත්" "වෛරස ගබඩාවක්" හැටියටත් ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගනී.

උරුමයෙන් ලබාගත් වෛරස එවන් අති විශාල රෝගවාහක මදුරුවන් ප්‍රමාණයක් විසින් මිනිස් රුධිරයට ඇතුළු කිරීම ජලගත සිදු වෙයි.

එබැවින් රෝගය වසංගතයක් ලෙස පැතිරීමට උරත්ගේ දයකත්වය අති විශාලයි. එපමණක්ද නොවෙයි. නිවාස ආශ්‍රිතව දිවි ගෙවන කුරුල්ලන් හා මදුරුවන් අතරත් එම වෛරසයට තම ජීවන චක්‍රය සපුරා ගන්නට පුළුවන. එනිසා කුකුළන්, පරෙවියන් වැනි කුරුල්ලන් ඇති කිරීමත් මෙම රෝගයට කෙරෙන රුකුල්දීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

රෝගය වැළැක්වීම

වෛරසය ගර්භයට ඇතුළු වූ මොහොතේ සිට දේහය ජීව විරුද්ධව ක්‍රියා කරයි. රෝගලක්ෂණ වෛරස වරයෙකුට කළ හැක්කේ දේහය මගින් කරන සටනට සහයෝගය දක්වීම පමණකි. තවද උණ හටගත් පමණින් එය ජෛව විද්‍යාත්මකව පත්සෙපලයිටස් රෝගය නිසා හට ගත්තේද යන්න දැනගැනීමටද නොහැක.

- * රෝගය වැළැක්වීමේ අරමුණින්, උරත් සහ මදුරුවන් ගෙන් මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීමට අනෙක් රටවල පියවර ගෙන ඇත. මේ සඳහා ශක්තිමත් මදුරුදෑල් මගින් උරු කොටු ආවරණය කළ යුතුයි. එවිට මදුරුවන්ට උරත් වෙත ලඟාවීම අපහසුය. මෙවිට උරත් තුළට වෛරස ඇතුළුවීම වැළැක්වේ. එලෙස "වෛරස ගබඩා" හිස්වන බැවින් රෝගය වසංගතයක් බවට පත්වීම වළකා ගත හැකිය.
- * ඒ අතරම උරත් ඇතිකිරීම අඩුකිරීමද කළ හැකිය. මස් සැපයීම පිණිස උරත් වෙනුවට වෙනත් සතුන් ඇති කිරීමද රෝග මර්දනය කිරීමට රුකුලක් වේ.
- * වෛරස පර්යේෂණායතනය පෙන්වා දෙන අන්දමට උතුරු මැද පළාතේ වාරිමාර්ග වලින් ජලය ලබා ගන්නා කුඹුරුවල මීට වඩා සාර්ථක ක්‍රමයක් යොදවා ගැනීමට පුළුවන. සාමාන්‍යයෙන් මදුරු කිටයන් සතියක් පමණ ජලයේ ජීවත්වන බැවින් අඩු තරමින් සතියකට වරක්වත් ඒවායේ ජලය බස්සවාහැර කුඹුරු හිස්කළ හැකි නම් මෙම මදුරු කිටයන් ඉතා පහසුවෙන් විනාශ කළ හැකිය. මේ වෙනුවෙන් අමතර වියදමක් දැරීමට සිදු නොවේ. ලංකාව වැනි රටකට එය ඉතාමත් යෝග්‍යයි.

මේ සියල්ලටම අමතරව මදුරු දෑල් විකර්ශක හෝ මදුරු දහර භාවිතා කිරීමෙන් මිනිසුන් මදුරු දෂ්ඨයෙන් ආරක්ෂා කළ හැකිය. එමගින්ද රෝග මර්දනයට ලැබෙනුයේ සැහෙන රුකුලකි.

මදුරුවන් මර්දනය

රෝගය අධික ලෙස පැතිර පවත්නා ප්‍රදේශවල නිවෙස් අවට සහ උරු කොටු අවට සිටින රෝග වාහක මදුරුවන් මේ ක්‍රමයෙන් විනාශ කළ හැකිය. මදුරුවන් වැඩියෙන් ක්‍රියාශීලී වන සවස් කාලයේදී හෝ පාන්දර ද මෙය සිදු කළ හැකිය. මෙය තාවකාලික ක්‍රමයකි. එක් දිනකදී එක් ස්ථානයකින් පමණක් මදුරුවන් දහස් ගණනක් පිටවන

නිසයි. එවන් තත්ත්වයන් යටතේ සුළු පිළියම් වලින් එතරම් යහපතක් සිදු වන්නේ නැත.

මදුරු මර්දනය රෝග පාලනයේ නව අංශයකි. මේ සඳහා සුපුරුදු මදුරු කීට නාශක යොදා ගැනීම සාර්ථක නැත. මන්ද පොල් ලෙලි වලවල්, කුඹුරු නිතරම මිනිසුන් ගැටයෙන නැත් නිසා කීට නාශක වැනි විෂ ද්‍රව්‍ය තිබීම අහිතකර බැවිනි.

තවද ගෙනුලට මදුරු නාශක ඉසීමෙන් අත්වන යහපතක් නැත. හේතුව මේ මදුරුවන් ගෙවල් තුළ වසා නොසිටී. මොවුන් බොහෝ ප්‍රිය කරන්නේ නිවෙස් වලින් පිටත පරිසරයයි. වතුර එකතුවන ඉහත සඳහන් තැන්වල කුඩා මාළු වර්ග බෝ කිරීම මගින් මදුරු ගහණය පහත දැමීමට පුළුවන. කෙසේ වුවද තාවකාලික පාලන ක්‍රමයක් ලෙස කෘෂිනාශක ධූමනය හෙවත් දුමක් සේ විදීම භාවිතා කරන්නට පුළුවන.

ජෛව විද්‍යාත්මකව පත්සෙපලයිටස් එන්නත

රෝගය වැළැක්වීමට ප්‍රතිරෝධී තත්ත්වයක් ඇතිකිරීම සඳහා එන්නතක් ලබා දේ. එන්නත් විධි කීප වරක් ලබාදීම සිදු කරයි. එය පහත දක්වා ඇත.

- * පළමුවර : එන්නත් විධි ලබාදීම.
- * පළමුවර ලබාදීමෙන් සති 2-4 කාලයේදී දෙවන වාසිය ලබාදීම.
- * දෙවනවර ලබාදී අවුරුදු 1 කට පසු තෙවන වාසිය ලබාදීම
- * තෙවන වාසිය ලබාදී අවුරුදු 3-4 කට පමණ පසු සිව්වන එන්නත් වාසිය ලබාදීම

මෙසේ එන්නත කීප වරක් ලබා දෙන්නේ නිපදවන ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය වරින් වර වැඩි කිරීමටයි. සාමාන්‍යයෙන් වරක් එන්නත ලබාදීමෙන් පසුව ක්‍රමයෙන් අඩුවී අවසානයේ නියත මට්ටමක පවතී. එන්නත අවසන් වර ලබාදීමෙන් පසුව බොහෝ කාලයක් ගතවන තුරු එහි බලපෑම පවතින බව හරියටම කිව නොහැකි අතර එය පර්යේෂණ මගින් සොයාගත යුතුයි.

එන්නත් ලබාදිය යුතු කාලය

වසංගතය තදින්ම පැතිර යන නොවැම්බර් මාසයේ එන්නත ලබාදීම සුදුසු නැතැයි යන්න විද්‍යාත්මකව පිළිගනු ලැබුවකි. හේතුව එන්නත දුන් මුල් කාලයේ වෛරසයට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීමට දේහයට ඇති ශක්තිය හීනවන බවක් පැවසෙන බැවිනි. වෛරසය විනාශ කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ගර්භයට ලැබෙනුයේ එන්නත ලබාදී මාසයකට හෝ මාස 1 1/2 කට පසුවයි. මේ නිසා වසංගතය පැතිරෙන කාලයට මාස 2-3 කට කලින් එනම් අගෝස්තු මාසයේ එන්නත ලබා දේ.

ඩෙංගු

ජයන්තර කරුණාසිංහ
පාඨික විද්‍යා පදනම

ඩෙංගු (ඩෙංගි) හි අරුත

ඩෙංගු අප්‍රිකානු වදනක් වන අතර එහි තේරුම ඇට කැබෙන යන අර්ථයයි. ඩෙංගු උණ රෝගය වැළඳුන අයෙකුගේ අස්ථි බිඳීමක් සිදු නොවන අතර රෝගය හේතුවෙන් සිරුරට දැනෙන දැඩි අපහසුතාව මින් අදහස් වේ.

රෝග ඉතිහාසය

ලෝකයේ ඩෙංගු හඳුනාගෙන දැනට වසර සියයකට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇති අතර එහි රක්තපාත ස්වභාවය නව රෝග තත්ත්වයක් ලෙස මූලින්ම හඳුනාගනු ලැබුවේ 1953 වසරේදී පිලිපීනයේදීය. ඉන් වසර 03 කට පසු එරට අගනුවර වූ මැනිලාවේ මරණ අනුපාතිකය 6% කින් වැඩි කිරීමට එය සමත් විය. ඉන් පසුව අග්නිදිග ආසියාවේ රටවල් කිපයකම මෙය වසංගත මට්ටමෙන් වරින්වර මතු විය.


ශ්‍රී ලංකාව තුළ රෝග තත්ත්වය

ඩෙංගු ආකාරයේ අසනීපයක් 19 වන ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේ පැවතුන බව වාර්තාවී ඇතත් පර්යේෂණ මගින් එය ඩෙංගු බවට සනාථකර ඇත්තේ 1962 දී පමණය.

වසංගත තත්ත්වයෙන් එය ඇති වූයේ 1967 වසරේදීය. එම වසරේ 08 දෙනෙකු මෙම රෝගය නිසා මියගිය අතර 28 දෙනෙකු දරුණු ලෙස රෝගී විය.

ඉන්පසු ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීම අඩුවිය. 1970 වසරේදී කිසිදු ඩෙංගු රෝගියෙකු වාර්තා නොවීය. නමුත් ගතවූ වසර 87-98 අතර මෙම රෝගය යළිත් වරක් වේගයෙන් වර්ධනය වූ බවක් පෙනෙන්නට ඇත. 1969 සිට 1988 දක්වා කාලය වසංගත ඩෙංගු උණ සමග ඩෙංගු මස්තු වර්ග (serotypes) නාගරික ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත වූ බවට සාක්ෂි ඇත.

රූපය 1 හි දක්වා ඇති ආකාරයට 1989 ට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවී ඇත්තේ වසරකට 08 දෙනෙක් පමණි. නමුත් වසර 1989 දී ඩෙංගු රෝගීන් යයි සැලකිය හැකි සංඛ්‍යාව 203 ක් දක්වා වැඩිවී ඇති අතර



රූපය 1 : දිවයිනේ ඩෙංගු රක්තපාත රෝගීන් වාර්තාවී ඇති ආකාරය

ඉන් 20 දෙනෙකු මියගොස් ඇත. 1990 දී රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1350 ක් දක්වා වර්ධනය වූ අතර, එයින් 54 දෙනෙකු මිය ගියහ. මෙම 2000 වසරේ මුල් මාස 06 තුළ මෙය අධික ලෙස උත්සන්න විය.

1991 සිට 1995 දක්වා රෝගීන් 440 සිට 1048 ක් අතර ප්‍රමාණයක් තුළ වර්ධනයවී ඇති බවක් පෙනේ. 1996 දී 1294 ක් රෝගීන් සිට ඇති අතර එයින් 54 දෙනෙකු පමණ මරණයට පත්වී ඇත. මේ අනුව ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයට පත්වී ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් පසුගිය අවුරුදු 04 තුළදීය. කොළඹ වෛද්‍ය ජිකසේ ඩී.ඒ. කුලතිලක වසංගත විශේෂඥ ප්‍රකාශ කළ ඇති පරිදි, මෙම වසර 2000 දී ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වය උපරිමව වර්ධනය වූ අතර ඩෙංගු යයි සැකකරන ලද රෝගීන් 5000 ක් පමණ දිවයිනේ විවිධ රෝහල් වලට ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුල් විය. මෙයින් 400 දෙනෙකු ස්ථිර වශයෙන්ම ඩෙංගු රෝගීන් බවට සනාථ විය. මෙම රෝගීන්ගෙන් 30 දෙනෙකු රෝගය නිසා මරණයට පත් විය. සංසන්දනාත්මකව බැලීමේදී 1999 දී රෝගීන් 1699 ක් රෝහල් වලට ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුල්වී ඇති අතර එයින් 300 ක් ඩෙංගු රෝගීන් බවට ස්ථිර වූ අතර, රෝගීන් 14 දෙනෙකු මරණයට පත් විය.

මෙයින් පෙනෙනුයේ බෙංගු රෝගය මෙම 2000 වසර තුළ දරුණු ලෙස වසංගත තත්වයට පත්වී ඇති අන්දමයි.

වසංගතය පැතිරුණු ප්‍රදේශ

1990 දී බෙංගු රක්තපාත රෝගීන් හමුවූ ප්‍රදේශ විමසා බැලීමේදී කොළඹ හා කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල හමුවූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව පිටපලාත්වල හමුවූ එවැනි රෝගීන් සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩිවිය. කොළඹ අවට රෝගීන් හමුවූ ප්‍රදේශ වූයේ නුගේගොඩ, මහරගම, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ, පිළියන්දල, රාගම විය. මීගමුව, කටාන, බේරුවල, මොරටුව, කළුතර, ගාල්ල, තංගල්ල ආදී ප්‍රදේශවලින් ද රෝගීන් හමුවී ඇත. අනුරාධපුරයෙන්ද රෝගීන් වාර්තාවී ඇත.

මෙම 2000 වසරේදී බෙංගු රෝගීන් පලමුවෙන් හමුවීම ආරම්භවී ඇත්තේ මාතර ප්‍රදේශයෙනි. ප්‍රථම මරණයද එම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය. සම්ප්‍රදයිකව බෙංගු රෝගයට නැඹුරු ප්‍රදේශවන කොළඹ, ගම්පහ, කෑගල්ල, ගාල්ල සහ කුරුණෑගලින්ද රෝගීන් වාර්තා විය. වසර 1999 දීද බෙංගු යයි සලකන ලද රෝගීන් 981 ක් පමණ කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවී ඇත.

බෙංගු රෝගය ඇතිකරන පීචි විශේෂය

ආබෝ වෛරස් නම් වෛරස් පවුලේ ෆ්ලේවි වෛරස් (Family : Flaviridae) ගණයට අයත් වෛරස්යන් මගින් මෙම රෝගය මනුෂ්‍යයින්ට ඇති කරයි. ආබෝ යන්නෙහි අර්ථය "ආත්‍රොපෝඩි බෝන්" හෙවත් සන්ධිපාදකයින් ගෙන් බෝවෙන යන අර්ථය ලබා දෙයි. බෙංගු උණ පතුරුවන වෛරස් දර්ශ 04 වර්ගයකි. ඒවා බෙංගු දර්ශ 1, 2, 3, 4 ආදී වශයෙන් වේ. මෙම දර්ශවලදී සුළු වෙනස්කම් ඇති වෛරස් දර්ශ / මාදිලි ඇති වෙයි. මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවූ බෙංගු වසංගත තත්වයට හේතු වූයේ දරුණු වෛරස් මාදිලිවල ඇතිවීම යැයි වසංගත රෝග විද්වතුන් අදහස් පල කරති. වර්ෂා කාලයකට පසු (virulent virus types) වර්ධනය වීම මෙයට තවත් සාක්ෂියකි.



රූපය - 2 : ෆ්ලේවි (Flavi virus) වෛරස් විශේෂයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීය ඡායාරූපයක් (අන්තර්ජාලය ඇසුරෙන්)

සම්ප්‍රදායික බෝවන වෛරස් රෝග වන පැපොල සහ සරම්ස වලින් වෙනස්වීමට හේතු

පැපොල සහ සරම්ස රෝග වලට ගොදුරු වූ අය නැවත වරක් එම රෝගවලට ගොදුරුවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා අඩුවුවත් බෙංගු වරක් වැළඳී ඇති අයෙකුට නැවත වරක් වැළඳීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ ඇත. මෙයට හේතුව වෛරස් දර්ශ කිපයක් රෝගය ඇති කිරීමයි. පලමුවර බෙංගු දර්ශ 1 නිසා රෝගී වූ අයෙකු දෙවන වර බෙංගු දර්ශ 2 නිසා රෝගී විය හැකිය.

බෙංගු වෛරස් පිළිබඳ ඉදිරිපත්වී ඇති මත අනුව බෙංගු රක්තපාත, උණ මගින් වඩාත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් කෙරෙනුයේ පලමුවර බෙංගු රෝගය වැළඳුනු අය නොව වරක් සුවවී නැවත දෙවන වර බෙංගු රෝගය වැළඳුණු අයයි. මෙහිදී පලමුවර ශරීරයේ නිපදවූ ප්‍රතිදේහ දෙවන වර යම් දරුණු තත්ත්වයක් ඇතිකරන බව පැහැදිලි වී ඇත.

එක් බෙංගු වෛරස් දර්ශයකින් සිරුර තුළ ඇතිකරන මෙම විශේෂ ප්‍රතිදේහ, වෙනත් බෙංගු දර්ශයක් ශරීරයට අනුච්චිමට විරුද්ධව ක්‍රියාකිරීම වෙනුවට එම තව ආගන්තුක දර්ශය සිරුර තුළ වර්ධනය ඇති කිරීමට මග පෑදීමයි. මෙවිට පුද්ගලයා පහසුවෙන් දෙවන වතාවේදී රෝගී වෙයි. මෙලෙස විශ්වාස කරන්නේ බෙංගු රෝගයට ගොදුරු වූ අයගෙන් 90% ක්ම වරක් හෝ දෙවරක් බෙංගු උණට කලින් ගොදුරු වූ නිසාය.

රෝග වාහකයා

මෙම බෙංගු වෛරස් (Flavi virus) පතුරුවනු ලබන වාහකයා ලෙස සැලකෙනුයේ ජඩ්ස් වර්ගයට (*Aedes*) අයත් මදුරුවන් දෙදෙනෙකු මගිනි. ජඩ්ස් ජප්පටයි (*Aedes aegypti*) සහ ජඩ්ස් ඇල්බොපික්ටස් (*Aedes albopictus*) වෙති. මෙම මදුරුවෝ බහුලව ගාණ්ඩවල ඇති පිරිසිදු ජලයේ බෝවන මදුරුවන් ලෙස හඳුන්වා ඇත. මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වනුයේ,

- * අප විසින් ඉවතලන ගිස් සැමත් ටින්
- * කිරිහට්ටි, පරණ මුවට්ටි
- * රබර් ටයර්, බෝතල්
- * පොල් කටු, පොල් කෝමබ
- * ප්ලාස්ටික් භාජන හා පොලිතින් බැග්
- * කොළ රොඩු එකතු වී වැගි ජලය රැඳෙන වැගි පිහිලි, මල් පෝච්චි,
- * මේස කකුල්වලට තබා ඇති කෑෂි උගුල්

තරමක තෙතමන තත්ත්වයක් යටතේ වුවද මෙම මදුරුවන්ගේ බිත්තර විනාශ නොවී පැවතීම මෙම මදුරුවන්ගේ සීඝ්‍ර වර්ධනයට හේතුවී ඇත.

මදුරුවන්ගේ රූපීය ලක්ෂණ

මොවුන් ප්‍රමාණයෙන් අනෙක් මදුරුවන්ට වඩා කුඩාය. එනම් මිලි මීටර් 2-4 පමණ ප්‍රමාණයකි. ස්ත්‍රී මදුරුවන් පමණක් ලේ උරා බොති. පිරිමි මදුරුවන් මල්පැති ආහාරයට ගනිති.

හඳුනාගැනීම :

ඊජිප්ටයි (aegypti)	ඇල්බොපික්ටස් (albopictus)
* වෙනස්වී පෙනෙන කළු සහ සුදු පියාපත් පාද සුගල මත ඇත.	- දිග පැත්තට පවතින උරසේ මතුපිට තනි සුදු රේඛාවක් උරසේ මතුපිට පිහිටයි
* උරසේ උඩ මතුපිට විණාවක් වැනි ආකාරයට රිදී පැහැති සලකුණ ඇත.	-

සාමාන්‍යයෙන් මොවුන් දහවල් කාලයේදී ක්‍රියාකාරී වී මිනිසුන්ට විදින අතර ගෙවල් තුළද විදීම සිදු කරයි. උදෑසන 6 සිට 9 දක්වාත් සවස 3 සිට 5 දක්වාත් මොවුන් වඩාත් ක්‍රියාශීලී බව වාර්තා වේ.



රූපය 3 : ඊඩ්ස් ගතයේ මදුරුවෙක්

මදුරු බිත්තර

මදුරුවන් බෝවෙන ජලයේ පහුරක් ලෙස එක්වී පාවේ.

කිටයන්

ජලය මතුපිටට ඇලව (කෝණාකාරව) පිහිනමින් සිටියි. සුහුඹුල් මදුරුවන් වසාලන තලයට සමාන්තරව වසයි.

රෝගය බෝවීම

ඊඩ්ස් ඊජිප්ටයි හෝ ඊඩ්ස් ඇල්බොපික්ටස් මදුරුවකු රෝගියකුගේ ලේ බි ආසාදිතව තමන්ගේ ශරීරය තුළට ඇතුළු වූ චෛරස ඊලතට ලේ උරාබොන පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය තුළට විදීමේදී එම පුද්ගලයාගේ ශරීරය තුළට චෛරස ඇතුළුවීමෙන් රෝගය වැළඳේ. රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙකුගෙන් තව කෙනෙකුට රෝගය කෙලින්ම බෝ නොවේ.

මිනිසාගේ සිරුර තුළ චෛරසය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

මෙසේ කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළට චෛරසය ඇතුළුවී දින 5-8 කින් (සමහර විට දින 3-15 විය හැක) බෙංගු උණ රෝග ලක්ෂණ පහලවේ. මෙය බීජෝෂණ සමයයි. චෛරස ඇතුළුවූ පමණින් බෙංගු රෝග ලක්ෂණ පහල නොවේ. එසේ වනුයේ එම බෙංගු චෛරසය හා සටන් කොට චෛරස් පරාජය කිරීමට ඇතැම් මිනිස් සිරුරු සමත් වන බැවිනි.

රෝග ලක්ෂණ

1) මූලික ලක්ෂණ

උණ
තද හිසරදය
කොන්ද කැක්කුම
සන්ධිවල සහ මස්පිඩු වල වේදනාව
ඇස් යට රිදීම

මේ අවස්ථාවේදී විවේක ගැනීම සහ උණ අඩුකර ගැනීමට පැරසිටමෝල් වැනි ඖෂධ ලබා ගැනීම කල යුතුය. බෙංගු පිළිබඳ සැකයක් පහලවී ඇති විට ඇස්ප්‍රින් සහිත ඖෂධ ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුය. ඇස්ප්‍රින් රුධිර පට්ටිකා එක්රැස් වීමට එරෙහිව ක්‍රියාකිරීම හේතුවෙන් ශරීර අග්‍රාන්තර ලේ ගැලීම ඇතිකල හැකිය.

2) ප්‍රතිකර්ම

වැඩිපුර දියර ආහාර ගැනීමෙන් උණ ඉක්මණින් අඩුකර ගැනීමට පුළුවන් වේ. සාමාන්‍යයෙන් දින 3-5 අතර තද උණ බැස යන අතර, ඇඟේ රිදීම ආදිය තවත් දින කිහිපයකින් අඩුවී රෝගියා සුව වේ.

ඉහත මූලික බෙංගු උණ රෝග ලක්ෂණයන්ට අමතරව ඇස්, නාසය, කණ, මුඛය, විදුරුමස් ආදී ශරීර ඉන්ද්‍රිය වලින් ලේ පිටතට ගැලීම, ලේ වමනය කිරීම, මල සමග ලේ පිටතට ගැලීම, මුත්‍ර සමග ලේ පිටවීම, සමේ රතු ලප(සම තුළ කෙරෙන ලේ ගැලීම නිසා) වැනි තත්ත්වයන් දැකිය හැකිය.

මෙවැනි තත්ත්වයන්ට හේතුව ලේ කැටි ගැසීමේ වෙනස්කම් සිදුවන නිසාය. තවද ලේ වල ඇති දියරමය ප්ලාස්ම ලේ නාල තුළින් පිටතට ගලා යාමද සිදුවේ.

3) මේ අවස්ථාවට පැමිණි පසු ඩොංගු රක්තපාන කම්පන තත්ත්වයට රෝගියා පත්වේ. මේ අවස්ථාවේදී උණ බැසගිය බවත් එක්වරම පෙන්වුවත් රෝගී ස්වභාවයේ වෙනසක් නොමැත. ඇඟ සුදුමැලි වෙයි. දහඩිය දමයි. නාඩි වේගවත් වී ඇඟ දුර්වල වෙයි. මේ මොහොතේදී රෝගියාගේ ලේ පර්මාව වැඩිකරන රුධිරය හෝ සේලයින් වැනි ද්‍රවණ ලබාදිය යුතුය.

ඩොංගු රෝග ලක්ෂණ අවස්ථා 04 කෙටියෙන්

පලමු අවස්ථාව : කැස්ස උණ පමණක් හටගෙන පසුව උණ නැතිවී යාමට පුළුවන.

දෙවන අවස්ථාව : රුධිර පටිපිකාවන්ගේ අඩුවීම.

තෙවන අවස්ථාව : විදුරුමස් වලින්, නහයෙන් ලේ පිටවීම, මල සමග ලේ පිටවීම ඇස් රක්ත වර්ෂාවීම

සිවුවන අවස්ථාව : ඩොංගු කම්පන අවස්ථාව.

රෝගය වැළැක්වීමට පියවර

- * රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා මදුරුවන් බෝවීම මර්ධනය කිරීම.
- * මදුරු දෂ්ඨයෙන් වැලකී සිටීම, උදා: මදුරු දැල්, මදුරු දහර සහ දුම් පාටිවීම්
- * රෝගීන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මගින් සුව කිරීම
- * විද්‍යාගාර රුධිර පරීක්ෂා කිරීම් මගින් රෝගීන් හඳුනා ගැනීම.
- * පාසැල් මට්ටමින් සිසුන් හා ගුරුවරුන් දනුවන් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

විවිධ වෛෂයික එන ඩොංගු උග්‍රත් කතාව, පිළිබඳ ලිපි ස ඕනෑම රාජ්‍ය නිකාය නිකාය, සැපත, 1990.3.1 (1-4) 1-5 සහ "ඩොංගු" නව දශකයේ වංශගතය, ඊබ්‍රහිම්, ඔබ්බර්වර් 2000 - 11- 20 6-8 පිටුව, යන ලිපි ඇසුරෙන් සකස් කරන ලදී.

හෝටන් තැන්න පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් විවිධයේ පටිය

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝටන් තැන්නේ පෙළව විවිධත්වය, සත්ත්ව හැසිරීම් සහ වඳවී යන පෙළව පද්ධතීන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් අති දර්ශනීය කැමරාකරණයකින් යුක්ත ඉංග්‍රීසි බසින් හඬ කථන ලද විනාඩි 20 ක විවිධයේ පටියක් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ඇන්ස්ලම් ද සිල්වා මහතාගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් හා නිෂ්පාදනයෙන් එළි දක්වා ඇත.


මෙහි ඇතුළත් කර ඇති තොරතුරු උසස් පෙළ විද්‍යා අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල හා පරිසර හිතකාමී සැමට ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඔබගේ පාසැල් ළමුන්ට මෙම විවිධයේ පටිය පෙන්වීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් රු. 5000/- ක අත්තිකාරම් මුදලක් ජාතික විද්‍යා පදනමට පැමිණා ගෙවීමෙන් ලබාගත හැකි අතර, නිකුත් කල දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත විවිධයේ පටිය ආයතනයට භාරදී ඉහත මුදල ඔබ වෙත නැවත ලබාදීමට කටයුතු සලස්වා ඇත.

උපුටා ගැනීම හෝ පටිගත කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්වේ.

අත්පිට වකුණුම් මිල රු. 15000/- කි.

විමසීම :

විද්‍යාත්මක නිලධාරී,
සත්ත්ව විද්‍යා සම්ප්‍රදාය කමිටුව
ජාතික විද්‍යා පදනම
47/5, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස
කොළඹ 07.
දුරකථන : 6 96 771-3



මදුරුවන් මර්දනය කිරීම

මහාචාර්ය එස්.එච්.පී. පරාක්‍රම කරුණාරත්න

සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යයනායුග්‍ය

පෙරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

භූමිකාව

මනුෂ්‍යයාගේ පැවැත්මට එරෙහිව බලවත්ම තර්ජනය එල්ල කරන සත්ත්ව කොට්ඨාශය ලෙස මදුරුවන් සැලකේ. ලේ උරා බීමෙන් කරදර ඇති කරනවාට අමතරව ඔවුන් මාරාන්තික රෝග වාහකයන් ලෙසද ක්‍රියා කරයි. මදුරුවන් බෝකරන රෝගයක් වන මැලේරියාවෙන් වසරකට අප්‍රිකාවේ පමණක් මිය යන මිනිසුන් සංඛ්‍යාව මිලියනය ඉක්මවයි. මදුරුවන් රෝග වාහකයන් ලෙස මූලින්ම හඳුනා ගැනුනේ දහනව වන ශත වර්ෂයේ අගභාගයේ දීය. එද සිට අද වන තුරුම මදුරුවන් මර්දනය කිරීම ඉතා වැදගත් කොට සැලකේ.

සත්ත්ව වර්ගීකරණයට අනුව මදුරුවන් අයත් වනුයේ ඉන්සෙක්ටා වර්ගයටත්. (Class- Insecta) ඩිප්ටෙරා

ගෝත්‍රයටත් (Order - Diptera), කියුලිසිඩේ කුලයටත්ය. (Family - Culicidae) ලෝකය පුරා මදුරු සහ 38 කට අයත් වන විශේෂ 3450 ක් පමණ සංඛ්‍යාවක් ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන මදුරු විශේෂ සංඛ්‍යාව 140 ක් පමණ වේ. පිරිමි මදුරුවා පලතුරු යුෂ වැනි සහිත ද්‍රාවණ ආහාරය සඳහා ගන්නා අතර ගැහැණු මදුරුවාගේ ප්‍රධාන ආහාරය රුධිරයයි. ගැහැණු මදුරුවාට තම දේහය තුළ බිත්තර විකාශනය සඳහා මෙම රුධිර ආහාරය අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ධාරකයාගේ රුධිරය උරාබීමේ දී ඔවුන් ධාරකයා තුළට නොයෙකුත් රෝග කාරකයන් ඇතුළු කරයි. මදුරුවන්ගෙන් බෝවෙන ප්‍රධාන රෝග 4 ක් ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ඇත.

1 වගුව : මදුරුවන්ගෙන් බෝවෙන ප්‍රධාන රෝග

රෝගය	වාහක මදුරු විශේෂය	රෝගකාරකය
1. මැලේරියාව	ඇනෝප්ලියස් කියුලෙසිපේසියස් <i>Anopheles culicifacies</i> ඇනෝප්ලිස් සබ්පික්ටස් <i>Anopheles subpictus</i>	ප්‍රොටොසොවාටෙන් ප්ලස්මොඩියම් <i>Plasmodium</i>
2. බර්වා	කියුලෙක්ස් කුවින්කිපැස්සියාටස් <i>Culex quinquefasciatus</i>	නෙමටෝඩා පණුවෙක් <i>Wuchereria</i>
3. ඩෙංගු	ඊඩ්ස් ඊජිප්ටයි <i>Aedes aegypti</i> ඊඩ්ස් ඇල්බොපික්ටස් <i>Aedes albopictus</i>	වෛරසයක්
4. පැපතිස් එන්සෙපලයිටිස්	කියුලෙක්ස් ට්‍රිටැනියොරිනක්ස් <i>Culex tritaeniorhynchus</i> කියුලෙක්ස් පෙලිඩස් <i>Culex gelidus</i>	වෛරසයක්

මදුරුවන් මර්දනය සඳහා මදුරු විශේෂවල වාසස්ථාන සහ විවිධ හැසිරීම් රටා ඇතුළත් ඔවුන්ගේ ජීව විද්‍යාව

පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇතිකර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍යවේ.

පීඩ විද්‍යාව

රුධිර ආහාරයකින් දින 2-3 කට පසුව ගැහැණු සතා ජලය මතුපිට හෝ මතුපිට ස්ථරයට ඉහළින් බිත්තිය මත හෝ බිත්තර දමයි. බිත්තර දමන ස්ථානය මදුරු විශේෂය අනුව වෙනස් වේ. උදාහරණයක් ලෙස *Anopheles culicifacies* ගංගා, ඇලදොල පත්ලවල සෑදෙන කුඩා චතුර වලවල් ප්‍රිය කරන අතර *Culex tritaeniorhynchus* කුඹුරුවල බිත්තර දැමීම ප්‍රිය කරයි. *Aedes aegypti* ප්‍රිය කරනුයේ ජලය පිරුණු කුඩා බඳුන්, වයර්, බෙලෙක්ක වැනි ස්ථානයන්ය. බිත්තර තනි තනිව (උදා:- ඇනොපිලස් *Anopheles*) හෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් එක් කොට තැනුනු පහුරු (උදා : කියුලෙක්ස්) ලෙස දමයි. මෙ සියළු බිත්තර වර්ග අතුරින් *Aedes* මදුරුවන්ගේ බිත්තර විජලනයට එරෙහිව දැඩි ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි.

බිත්තරයෙන් පිටතට එන කිටයා ජලයේ වාසය කරන අතර ස්වයන්ත සඳහා වායුගෝලීය ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමට ජලය මතුපිටට පැමිණේ. සර්ම කලාපික මදුරුවන්ගේ කිට ජීවිතය සතියකට පමණ සීමාවන අතර මේ කාලය තුළ හැව ගැලීම් 4 ක් සිදු කරයි. ඉන්පසු කිටයා පිළවා බටට පත්වන අතර පිළවා ගෙන් සුහුඹුලා පිටතට එයි. සුහුඹුල් මදුරුවකුගේ සාමාන්‍ය ආයු කාලය සතියක් හෝ සති දෙකක් පමණ වේ. මේ කාලය තුළ මදුරුවකු සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර 2 කක පමණ පරාසයක් තුළ පියාසර කරයි. කෙසේ වුවද සුළඟ මගින් මෙම මදුරුවන් බොහෝ ඇතට ගෙන යා හැක. රුධිර ආහාරයකට පසු බිත්තර දමන ගැහැණු මදුරුවාට නැවත රුධිර ආහාරයක් ගෙන නැවත බිත්තර දැමීම කළ හැක. මේ ආකාරයට බිත්තර දැමීම කිප වතාවක් සිදුවේ. සමහර මදුරු විශේෂ ගෙවල් තුළ වසා සිටීමට ප්‍රිය කරන අතර (indoor resting/endophilic) සමහරුන් පිටත වාසය ප්‍රිය කරයි. (outdoor resting/exophilic) සමහර මදුරුවන් මිනිසුන්ගේ රුධිරය උරාබීම වඩා ප්‍රියකරන අතර (anthropophilic) සමහර මදුරුවන් සතුන්ගේ රුධිරය වඩා ප්‍රිය කරයි. (zoophilic) සමහර විශේෂ දිවා කාලයේදී රුධිරය උරා බීමටද සමහර විශේෂ රාත්‍රිකාලයේ රුධිරය උරාබීමට ද ප්‍රිය කරයි.

මෙලෙස මදුරුවාගේ විලාසය සහ වාසස්ථාන එක් එක් විශේෂය අනුව පැහැදිලිව වෙනස් වේ. මදුරුවන් මර්දනය කිරීමේ නිවැරදි ක්‍රියාවලිය තෝරාගත යුත්තේ අදාළ මදුරු විශේෂවල ජීව විද්‍යාවට අනුවය. මර්දනය කිරීම විවිධ මට්ටම් වලින් සිදුකළ හැකි කිට මර්දන ව්‍යාපෘති සහ සුහුඹුල් මර්දන ව්‍යාපෘති යම් ප්‍රදේශයක සිටින මදුරු සංඛ්‍යාවන් පහත හෙළිම සඳහා දියත් කෙරේ. මීට අමතරව මදුරුවන්ගෙන් ආරක්‍ෂා වීමට එක් එක් පුද්ගලයන්ට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග විවිධය. මෙ සියළු මර්දන ක්‍රම ප්‍රධාන මාතෘකා හතරක් යටතේ මෙහි විස්තර වේ. එම මාතෘකා නම් පොද්ගලික ආරක්‍ෂාව, නිවාස නිර්මාණය සහ ඒ අවට වාසස්ථාන විනාශ කිරීම, පරිසරයේ සිදුකළ හැකි වෙනස් කිරීම් සහ කෘෂිකාරක භාවිතය යන්නය.

පොද්ගලික ආරක්‍ෂාව

* මදුරුවන් තමාගේ සිරුර වෙත ඒම වළක්වා මවුන් ඉවතට යොමු කරවන විවිධ රසායනික සංයෝග (උදා deet: NN-diethyl -3-toluamide) භාවිතයේ ඇත. විවිධ තෙල් වර්ග, ආලේපන සහ ඉසිනයන් ලෙස වෙළඳපොළේ දක්නට ඇති මේවා කෘෂිකාරක මෙන් විෂ සහිත නොවේ.

* ගම්බදව මදුරුවන් පලවා හැරීමට විවිධ දුම් වර්ග (උදා: කජුලෙලි පිළිස්සීම), පැලෑටි සාරයන් (උදා: කොහොඹ සාරය) සහ තෙල් වර්ග (උදා: පැහැරි තෙල්) භාවිත කෙරේ.

* එසේම මුළු දේශයම වැසෙන සේ ඇඳුම් ඇඳ සිටීමෙන්ද මදුරුවන් දෂ්ඨ කිරීමේ අවස්ථාවන් මගහරවා ගත හැකිය.

* එසේම, මදුරුවන් පොදුවේ ඉතා සක්‍රීය වන සහ වැඩිපුරම දෂ්ඨ කරන අවස්ථාවන් සේ සැලකෙන හිරු බැසයන විටද හිරු නැගීමට පෙරද මදුරුවන් ඇති ස්ථානවල ගැවසීම හැකි තරම් මගහරවා ගත යුතුය.

* මදුරුවන්ගෙන් ආරක්‍ෂාවීමේ තවත් ක්‍රමයක් ලෙස මදුරු දෑල් භාවිතය හැඳින්විය හැක. එහෙත් දිවා කාලයේ දෂ්ඨ කරන මදුරුවන්ගෙන් ආරක්‍ෂාවීමට මෙම ක්‍රමය පිටුවහලක් නොවනු ඇත. දිවා කාලයේ නිදියන ලදුවන් සඳහා මේ ක්‍රමය භාවිතා කළ හැක.

නිවාස නිර්මාණය, නිවාස තුළ සහ අවට වාසස්ථාන

* ජලාශ ආශ්‍රිත ගෙවල්වලට මදුරුවන් නිසා ඇතිවන කරදරය වැඩිය. සුළඟ හමනුයේ ජලාශයේ සිට ගෙය දෙසට නම් සුළඟ සමග අළුත බිහිවූ සුහුඹුලන් විශාල ලෙස පැමිණේ. මේ නිසා නිවාස තැනීමේදී මේ කරුණු සලකා බැලීම වැදගත්ය.

* වහලය සහ බිත්ති අතර ඇති හිඳුස තුළින් ඇතුළුවන මදුරුවන් වැලැක්වීමට පහලින් ඉඳි කරනු ලබන සිලිම ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය.

* නිවාස තුළට පිටතින් මදුරුවන් පැමිණෙන මාර්ග වන දෙර, ජනෙල්, ග්‍රිල් ආදිය මදුරු දෑල් මගින් ආවරණය කළ හැක. මෙසේ දෑල් ආවරණය කිරීම අපහසු නම් මදුරුවන් ඉතා සක්‍රීයව දෂ්ඨ කරන කාලයන් තුළ දෙර ජනෙල් වසා තැබිය යුතුය. (කරුවල වැටීමට පෙර සිට පසුද ඉර උදවන තෙක්)

* ගෙවල් තුළ තබා ඇති ජල බඳුන් තුළ මදුරුවන් බෝවිය හැකි බැවින් ඒවා නිසි ලෙස පවත්වා ගත යුතුය. උදා: මල් බඳුන්වල ඇති ජලය දින දෙකකට

වරක්වත් මාරු කළ යුතුය. කුඹින් යාම වැලැක්වීම සඳහා තබන ජල බඳුන් මේස කකුල් යට තුළ මදුරු කිටයන් විකාශනය නොවන පරිදි ඒවා ලුනු හෝ සබන් මිශ්‍ර ජලයෙන් පිරවිය යුතුය.

* ගෙවත්තේ ඇති ජල පිරුණු කුඩා බඳුන්, ටින්, පොල් කෝමළ ආදිය විනාශ කළ යුතුය.

* කුඩා වතුර වලවල්, ගස් බෙන ආදියේද මදුරුවන් බෝවීම සිදුවිය හැකි නිසා ඒවා පස්, කුණු රොඩු, ගල්කැට හෝ සිමෙන්ති මගින් වසා දමිය යුතුය.

* වහල වලට සවිකර ඇති පිහිලි, ශාක පත්‍ර වැටී අවහිරවී ඇති වතුර පිරි මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන බවට පත්විය හැක. මේ නිසා වැහි පිහිලි නිතිපතා ගුද්ධ කළ යුතුය.

* වහල මත විවෘතව ඇති වැංකි සහ කසල වලවල් ආදිය මදුරුවන්ට ඇතුල්විය නොහැකි වන පරිදි පියන්, සිමෙන්ති ලෑලි හෝ පොලිස්ටයිරීන් කැට (Polystyrene beads) මගින් වසා දමිය යුතුය. (පොලිස්ටයිරීන් කැට) යනු විෂ රහිත ජලයේ පාවෙන රිජිමේම් කැට විශේෂයක් වන අතර, මේවා අතහැර දමන මැණික් පතල් වැනි විශාල ජලයපිරි වලවල් වැසීම සඳහාද උපයෝගී කරගත හැක.

පරිසරයේ සිදුකළ හැකි වෙනස් කිරීම්

කෘෂිකර්මාන්තයේදී ඉදි කෙරෙන ජලය බැසයාමේ පද්ධති සහ වැහිජලය/අපද්‍රව්‍ය ගලාබසින පද්ධති, නිසි ලෙස සැලසුම් කර නොතිබීම නිසාත් නිසිලෙස පාලනය නොකිරීම නිසාත්, මේවා මදුරුවන් විශාල වශයෙන් බෝවන ස්ථාන බවට පත්වේ. මෙවැනි පද්ධති ක්‍රමවත්ව සැකසීම අත්‍යාවශ්‍යය. හැකි සෑම විටම ස්වාභාවික ජලය බස්නා දිශාව අනුගමනය කළ යුතුය. ජල පහරවල ජලය රැඳී තිබිය හැකි ස්ථාන අවම කළ යුතුය. උදා: ජල පහරේ වංගු සහිත බව අවම කළ යුතුය. ඉවුරු කැඩී බිඳී නොතිබිය යුතු අතර ගැඹුරු විය යුතුය. විශාල ජල පහරවල් හෝ ඇලවල් වල ඇති ඇතිකට් හෝ වේලි (dam) ආධාරයෙන් පවතින ජල මට්ටම වෙනස් කරමින් වරින් වර විශාල ජල කඳන් නිදහස් කර හැරිය යුතුය. මේ මගින් (Stream sluicing) මදුරුවන් බෝවීමේ ස්ථාන යෝද යැවිය හැක.

උස් ජල මට්ටම් සහිත වගුරුබිම් වල නිතර ජලය රැඳී තිබෙන නිසා මේවා අධික ලෙස මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඉසුකැලිප්ටස් වැනි අධික වර්ධන සීඝ්‍රතාවක් සහ උත්ස්වේදන සීඝ්‍රතාවක් ඇති ශාක විශේෂ වැවීමෙන් මේවායේ ජල මට්ටම පහත දමා ඒවා වියලී බිම් බවට පත්කරවා ගත හැක. වැවි, පොකුණු වැනි විශාල ජලාශ නිසාද ඉතා හොඳින් මදුරුවන් බෝවීම සිදු වේ. සමහර මත්ස්‍ය, ක්‍රස්ටේෂියා හා තෙමටෝඩා පත්‍රවත් විශේෂ

මදුරු කිටයන් ආහාරය සඳහා ගනිති. මදුරු කිටයන් කා දමන මත්ස්‍ය විශේෂ උදා: ගජපි, නලහඳයන් මෙවැනි ස්ථානවල බෝකිරීම මදුරුකිට මර්දන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රධාන අංගයකි. ජල පෘෂ්ඨය වසා දමන අසොල්ලා (Azolla) වැනි ශාක විශේෂ ජල මතුපිට වැවීමද මදුරුවන් බෝවීම වලක්වයි.

කෘෂිකාශක භාවිතය

මදුරුවන් මර්දනය කිරීමේ ව්‍යාපාර සඳහා වර්තමාන ලෝකයේ ප්‍රධාන ලෙසට යොදා ගැනෙන්නේ කෘෂිකාශකය. මේවා ස්වාභාවිකව පවතින හෝ රසායනික සංලේපණය කළ සංයෝගයන් වේ. බැසිලස් තුරින්ජියෙන්සිස් *Bacillus thuringiensis* සහ බැසිලස් ස්පෙරිකස් *Bacillus sphericus* යන බැක්ටීරියා විශේෂ යොදා ගනිමින් නිපදවන ලද ජෛව කෘෂිකාශකද භාවිතයේ ඇත. මෙම බැක්ටීරියාවලින් නිපදවන ස්ථවික විශේෂයක් අධිග්‍රහණය කිරීම නිසා මදුරු කිටයෝ විනාශ වෙති. ජෛව-කෘෂිකාශකයන් ලෙස අලෙවි කෙරෙන්නේ මෙම බැක්ටීරියා බීජාණු සහ ස්ථවිකයන් ය. එහෙත් මිල අධික නිසාත් කල්තබා ගැනීමට අපහසු නිසාත් මේවායේ භාවිතය සීමාවී ඇත.

කෘත්‍රිමව නිෂ්පාදනය කරන සියළු කෘෂිකාශක අතුරෙන් වඩාත් සාර්ථකවී ඇත්තේ ස්නායු-නියෝබකයන් ය. අධික වියදම සහ පරිසර දූෂණය යන සාධක එරෙහිව තිබියදීත්, අද දින ලෝකයේ කෘෂි මර්දනය සඳහා මේවා විශාල ලෙස යොදා ගැනෙන්නේ ඒවායේ ඇති සමාන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසාය. සුලභ ලෙස භාවිතයේ ඇති කෘෂිකාශක ප්‍රධාන කාණ්ඩ සතරකි;

- * මර්ගැනොක්ලෝරීන්,
- * මර්ගැනොපොස්පේට්,
- * කාබිඇමේට් සහ
- * පයිරෙත්රොයිඩ් ලෙසය.

මෙයින් මර්ගැනොක්ලෝරීන් කාණ්ඩයේ භාවිතය පරිසරයට ඉතා හානිකර නිසා ලෝකයේ බොහෝ රටවල තහනමට ලක්වී තිබුනද, ඒ යටතේ එන ඩී.ඩී.ටී. (DDT) තවමත් අප්‍රිකානු රටවල බහුල ලෙස මැලේරියා මදුරුවන් මර්දනය සඳහා යොදා ගැනේ. මර්ගැනොපොස්පේට් සහ කාබිඇමේට් යටතේ එන කෘෂිකාශක ස්නායු-සම්ප්‍රේෂකයක් වන ඇසිටිල්කෝලින් ජලවිච්ඡේදනය කරන ඇසිටිල්කෝලින් එන්සයිමය නිශේධනය කරයි. මර්ගැනොක්ලෝරීන් උප කාණ්ඩයක් වන සයික්ලොඩයින ස්නායු තත්ත්වල ක්ලෝරයිඩ් අයන පරිවහනයට බාධා පමුණුවයි. අනෙකුත් මර්ගැනොක්ලෝරීන් සහ පයිරෙත්රොයිඩ් ස්නායු තත්ත්වල සෝඩියම් අයන පරිවහනයට බාධා පමුණුවයි. මේ සියළු කෘෂිකාශක මගින් පලමුව කෘෂි සිහි මුර්ජා තත්ත්වයට පත් කොට පසුව මරා දමනු ලබයි.

මදුරුවන් මර්දනය කිරීම සඳහා කෘමිනාශක භාවිතයට ප්‍රථමයෙන් ඒවා යෙදිය යුත්තේ කිනම් ස්ථාන වලට දැයි නිවැරදිව නිගමනය කළ යුතුවේ. මේ සඳහා මර්දනය කිරීමට අවශ්‍ය මදුරු විශේෂවල ජීව විද්‍යාත්මක පසුබිම දැනසිටීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස මැලේරියා වාහකයා වන ඇනෝප්ලස් ක්‍රිසිලෙසිලේසිස් *Anopheles culicifacies* කිටයන් මර්දනය කිරීමට උත්තේ ප්‍රියතම බෝවන ස්ථාන වන ගංගා ඇලදෙල වල පත්ලේ ඇති වතුර රැඳෙන ස්ථාන වලට කෘමිනාශක යෙදිය යුතුය. එම විශේෂයේ සුහුඹුලන් ගෙවල් තුළ වාසය ප්‍රිය කරන නිසා (indoor resting) කෘමිනාශක ගෙවල්වල බිත්ති මතට ඉසිය යුතුය. මෙම ස්ථාන වලට කෘමිනාශක යෙදීමෙන් එම විශේෂය සාර්ථකව මැඩලිය හැකි වුවද අනෙකුත් මදුරු විශේෂ සඳහා එයින් බලපෑමක් ඇති නොවිය හැක්කේ ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන වෙනස් නිසාය. කෙසේ වුවද ඉතා තදින් රෝග පැතිරෙන, මදුරු මර්දනය වීගය සිදුකළ යුතු වූ අවස්ථාවල වාහන වලට හෝ ගුවන්යානා වලට සවි කෙරුණ යන්ත්‍ර මගින් සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයටම කෘමිනාශක ඉසිනු ලැබේ.

මදුරු දහර අද දින මදුරු උවදුරෙන් මිදීමට ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල වශයෙන් භාවිතා කෙරේ. මේවායේ අඩංගු කෘමිනාශක වාෂ්පශීලී පයිරෙත්රොයිඩ කාණ්ඩයට අයත්ය. මේ සඳහා නිර්දේශ කොට ඇති කෘමිනාශක ප්‍රමාණය මනුෂ්‍යයාට විෂදායී නොවන බව සහතික කොට ඇත. එහෙත් මුළු රාත්‍රියක් පුරා කෘමිනාශක, කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු මෙම දුමාරයට විවෘත වීමෙන් නොයෙකුත් අසනීප තත්ත්වයන් (විශේෂයෙන්ම ස්වසන පද්ධතිය හා ආශ්‍රිතව) ඇතිවිය හැකිය. ලංකාවේ සූලභ ලෙස දක්නට නොලැබුණද කෘමිනාශක අන්තර්ගත මදුරු දල් භාවිතය ඉතා සාර්ථක මදුරු මර්දන ක්‍රමයක් ලෙස අප්‍රිකාව වැනි රටවල යොදා ගැනේ. මෙහිදීද පයිරෙත්රොයිඩ කෘමිනාශක හානිදායක නොවන තරමේ ස්වල්ප ප්‍රමාණ වලින් යොදා ගන්නා අතර කෘමිනාශක ද්‍රවණ පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් ගම්බද ජනතාවට සුහුඹුලන් ලබා දේ. මෙසේ ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණ වලින් කෘමිනාශක මදුරු දල්, මදුරු ආවරණ, තිර, ඇඳුම් සහ බිත්තිවල ආලේප කරන තිත්ත වලටද මිශ්‍ර කරගත හැක. මේ මගින් මදුරුවන් පලවා හැරේ.

මදුරුවන් කෘමිනාශක වලට දිගටම විවෘත වූ විට ඔවුන් තුළ කෘමිනාශක ප්‍රතිරෝධයක් වර්ධනය වේ. මදුරු දහර දිගටම භාවිතා කිරීම මගින්ද මේ තත්ත්වය ඇති වේ. මෙම ප්‍රතිරෝධය ආකාර දෙකකට ඇතිවිය හැක. එනම් මදුරුවන්ගේ දේහය තුළදී කෘමිනාශක කඩා දමන එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිවීම සහ කෘමි ස්නායු පටකවල ඇතිවන වෙනස්වීම් නිසා ඒවා කෘමිනාශක වලට ප්‍රතික්‍රියාවක් නොදක්වීම නිසාය. මදුරුවාගේ දේහය තුළ කෘමිනාශක පරිවෘත්තීය සඳහා වැදගත් වන එන්සයිම carboxylesterases, glutathione- S-transferases සහ oxidases ලෙස කාණ්ඩ 3 කි. ස්නායු පටක වෙනස්වීම් ඇති වනුයේ මදුරුවන්ගේ ජානවල ඇති වන ජාන විකෘති නිසාය. **ඔර්ම කලාපීය රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව කෘමිකර්මාන්තය සහ සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍ර දෙකම සඳහා කෘමිනාශක විශාල වශයෙන් පරිහරණය කරයි. 1975-1977 ට පෙර මදුරුවන් මර්දනයට යොදා ගැනෙන්නේ DDT (ඔර්ගැනොක්ලෝරීන්) ය. එතැන් සිට මැලතියන් තුල (ඔර්ගැනොපොස්පේට්) සුහුඹුලන් මර්දනයටද ටෙමෙන්ටෝස් සහ ෆෙන්තියොක් (ඔර්ගැනොපොස්පේට්) කීට මර්දනය සඳහාද ප්‍රධාන ලෙස යොදා ගැනුණි. පයිරෙත්රොයිඩ කෘමිනාශක භාවිතය ආරම්භ වූයේ මෑතකදීය. (1994 පමණ සිට). වඩාත්ම සුදුසු කෘමිනාශකය තේරීමේදී එම ප්‍රදේශයේ පවතින මදුරු විශේෂ වල කෘමිනාශක ප්‍රතිරෝධී තත්ත්වය ගැන අවබෝධයකින් සිටීම ඉතා වැදගත්ය.**

අප සියළු දෙනාම දන්නා පරිදි කෘමිනාශක පරිසරය දූෂණය කරයි. මේ නිසා අනෙකුත් මර්දන ක්‍රම (උදා: බෝටිම වැලැක්වීම) හැකි සෑම විටම උපයෝගී කළ යුතුය. කෙසේ වුවද සිසුයෙන් රෝගී වසංගතයක් පැතිරී යාම වැනි තත්ත්වයන් යටතේ භාවිතා කළ යුතු ක්ෂණිකව ප්‍රතිඵල ලබා දෙන මර්දන ක්‍රමය වනුයේ කෘමිනාශක භාවිතයයි.

මදුරු විශේෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා ඩී.එන්.ඒ ප්‍රෝබ් (DNA probes)

ආචාර්ය මායා ඒ. ගුණසේකර,

රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනායතන

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය.

හැඳින්වීම

මිනිසාට රෝග බෝ කරන වාහකයන් (vectors) ලෙස බොහෝ මදුරු විශේෂ වැදගත්වේ. උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රොටෝසෝවා රාජධානියට අයත් ප්ලැස්මෝඩියම් (*Plasmodium*) නැමැති පරපෝෂිතයාගෙන් ආසාදිත වූ මදුරුවකු දළඬු කිරීමෙන්. මිනිසාට මැලේරියා රෝගය වැළඳේ. මෙයින් ඇනෝෆිලස් ක්‍රිෆේසිෆේසියස් (*Anopheles culicifacies*) මදුරුවා ශ්‍රී ලංකාවේ මැලේරියා රෝගය පතුරවන ප්‍රධානතම රෝග වාහකයා ලෙස සැලකේ. එමෙන්ම ඉන්දියාවේ හා පකිස්තානයේ ද මෙම මදුරු විශේෂය ප්‍රධාන මැලේරියා රෝග වාහකයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

බොහෝ මදුරු විශේෂ ස්වාභාවිකව පවතින්නේ තනි විශේෂයක් ලෙස නොව විශේෂ සංකීර්ණයක් ලෙස බව හෙළි වී ඇත. විශේෂ සංකීර්ණයක් (species complex) යනු ප්‍රජනනව හුදෙකලා වීම නිසා ඇතිවූ සිබ්ලිංග් විශේෂ (sibling species) කිහිපයක් අඩංගු කාණ්ඩයක් වේ. සිබ්ලිංග් විශේෂ ලෙස හඳුන්වන්නේ බාහිර ලක්ෂණවලින් එක හා සමාන (සමරූපී) වන එහෙත් එම විශේෂ අතර අන්තර් අභිජනනයක් සිදු නොවන හෝ ඔවුන් අතර අන්තර් අභිජනනයක් සිදු වුවද එමගින් කිසි විටෙක සරු ජනිතයන් බිහි නොවෙන විශේෂ වලටයි. කෙසේ වුවද, මෙම සිබ්ලිංග් විශේෂ සමරූපී නිසා බාහිර රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ අධ්‍යයනයෙන් සිදුකරන සම්මත වර්ගීකරණ යතුරු ක්‍රමය (taxonomic keys) මොවුන් හඳුනාගැනීම සඳහා යොදා ගත නොහැක. මදුරුවාගේ සෛලවල ඇති යෝධ වර්ණදේහ විශ්ලේෂණය (polytene chromosome analysis) ආශ්‍රිතයෙන් වර්ගීකරණය කිරීමෙන් ඉන්දියාවේ සිටින ඇනෝෆිලස් ක්‍රිෆේසිෆේසියස් සංකීර්ණයෙහි සිබ්ලිංග් විශේෂ 5 ක් මේ දක්වා හඳුනාගෙන ඇත. මීට අමතරව මෙම එක් එක් සිබ්ලිංග් විශේෂයන් ඔවුන්ගේ

කාලානුකූල ව්‍යාප්තියන්හි රෝග වාහකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව හා කෘමිනාශක වලට ඔවුන් දක්වන ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් ආකාරයේ විචල්‍යතාවයන් දක්වන බව ද ඉන්දියාවේ කරනලද පර්යේෂණ වලින් සොයාගෙන ඇත. උදාහරණයක් ලෙස එක් සිබ්ලිංග් විශේෂයක් අනෙකුත් සිබ්ලිංග් විශේෂවලට වඩා ඩී.ඩී.ටී. කෘමි නාශකය සඳහා වැඩි ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වයි. සිබ්ලිංග් විශේෂ අතර පවතින මෙවැනි වෙනස් හැසිරීම් රටාවන් නිසා එම එක් එක් සිබ්ලිංග් විශේෂය මැලේරියා රෝග ව්‍යාප්තිය සඳහා බලපාන ආකාරයද වෙනස් විය හැක. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ මැලේරියා රෝගය ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රදේශවලට අදාළ ඇනෝෆිලස් ක්‍රිෆේසිෆේසියස් නියමාකාරයෙන් හඳුනා ගැනීම, එම ප්‍රදේශ වල මැලේරියා රෝගය මර්ධනය හා පාලනය කිරීමට, දියත් කරන විවිධ ව්‍යාපෘති වල සාර්ථකත්වය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස මදුරු නාශක බෙහෙත් විදීමට පෙර එම ප්‍රදේශයේ සිටින මදුරු සිබ්ලිංග් විශේෂය හඳුනාගැනීමෙන් එම වාහකයා මර්ධනය කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය මදුරු නාශක වර්ගය භාවිතා කළ හැක. මේ නිසා ක්‍රමාණුකූලව මදුරු නාශක භාවිතා කිරීම මෙන්ම නිරපරාදේ මුදල් අපතේ යෑම ද වළක්වා ගත හැක.

සිබ්ලිංග් විශේෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා දැනට භාවිත කරන සෛලවල යෝධ වර්ණදේහ වර්ගීකරණය කිරීමේ ක්‍රමය

ඇනෝෆිලස් ක්‍රිෆේසිෆේසියස් සිබ්ලිංග් විශේෂ වෙන්කර හඳුනාගැනීම සඳහා දැනට යොදා ගන්නේ, අදාළ මදුරුවන්ගේ බෝධ ග්‍රන්ථියේ හෝ ඩිම්බ කෝෂ වල ඇති යෝධ වර්ණදේහ වර්ණගැන්වීමෙන් දක්නට ලැබෙන රටා අධ්‍යයනය කිරීමයි. නමුත් මෙය ඉතා අපහසු, කාලය වැයවන වර්ගීකරණ ක්‍රමයකි. තවද මෙමගින් හඳුනාගත හැක්කේ මදුරු ජීවන චක්‍රයේ සමහර අවස්ථාවන් පමණි. එනම්, මදුරුවාගේ ජීවන චක්‍රයේ බිත්තරය, කිටයා, පිළව්

සහ සුහුඹුලා ලෙස ගත කරන විවිධ අවධි අතුරින් අර්ධ ගර්හනී සුහුඹුල් හෝ මේරු පිලවා හෝ පමණක් කුමන සිබ්ලියෝ විශේෂයට අයත් වේදැයි මෙම ක්‍රමය මගින් හඳුනාගත හැක. මෙවැනි සීමාකරී හේතූන් නිසා, ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන වලදී එකතුකර ගනු ලබන ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථාවන්හි ඇති බොහෝ මදුරු නියැදියන් නිසි ලෙස හඳුනාගැනීම මෙම ක්‍රමය මගින් ඉතා අසීරු කාර්යයක් වී ඇත.


මදුරු සිබ්ලියෝ විශේෂ හඳුනාගැනීම සඳහා ගොඩනගා ගත හැකි ඩී.එන්.ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ

ඩී.එන්.ඒ ප්‍රතිසංයෝජන තාක්ෂණයෙන් (recombinant D.N.A. technology), ද නොමඳ පිටුවහල නිසා වාහක මදුරු විශේෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා ඩී.එන්.ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගොඩනගා ගැනීම වැනි නවතම විද්‍යාත්මක ක්‍රම අද බිහි වී ඇත. මදුරු වාහකයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා පැරණි සම්මත තාක්ෂණික ක්‍රම වෙනුවට ඩී.එන්.ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ යොදා ගැනීමේ නොයෙකුත් ප්‍රතිලාභ ලැබේ. ඉන් සමහරක් නම් මෙම ක්‍රමයෙහි ඇති සරල බව, පහසුතාවය, නිරවද්‍යතාවය හා දැඩි සංවේදීතාවය මෙන්ම එහි ඇති විශ්වාසනීයත්වය වේ. මෙවැනි ලක්ෂණ නිසා ඩී.එන්.ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ යොදා ගැනීම වඩාත් සිත් ඇදගන්නා සුළු පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් බවට පත් වී ඇත. මෙම විශ්ලේෂණ ක්‍රමය මදුරුවාගේ ලිංග හේදයකින් තොරව, උගේ ජීවන චක්‍රයේ ඕනෑම අවස්ථාවක් සඳහා යොදා ගත හැක. එමෙන්ම විශාල මදුරු නියැදි ප්‍රමාණයක් එකවර විශ්ලේෂණය කිරීමට ද හැකියාවක් ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය ඩී.එන්.ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගොඩනගා ගත්තේ මදුරු විශේෂ සංකීර්ණයක සිටින එක් එක් සිබ්ලියෝ විශේෂයන්ගේ ඩී.එන්.ඒ වල පවතින වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම තුළිනි.

ඩී.එන්.ඒ ගනු කුමක්ද ?

ජීවියෙකු සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ථකථනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ගබඩාකර ඇති රසායනය ඩී.එන්.ඒ (ඩිමන්සිරයිබොනියුක්ලික් අම්ලය : deoxyribonucleic acid) ලෙස දැක්විය හැක. එනම් ඩී.එන්.ඒ යනු ජෛවයේ මූලික පිටපතයි. මෙම ඩී.එන්.ඒ සෛලයක න්‍යෂ්ටිය නම් වූ කොටසෙහි අඩංගු වර්ණදේහ තුල ගැබ් වී ඇත. ඩී.එන්.ඒ අණු ඉතා දිගු. නියුක්ලියෝටයිඩ නම් වූ ඒකක වලින් තැනුණු බහු අවයව හෙවත් යෝධ අණුවේ. නියුක්ලියෝටයිඩයක් කොස්පේට්, සීනි හා ගණ්‍ය කාණ්ඩ 3 කින් සෑදී ඇත. නියුක්ලියෝටයිඩ ගණ්‍ය වර්ග 4 ක් ඩී.එන්.ඒ අණුවෙහි ඇත. ඒවා ඇඩීනින් (A), ගුවැනින් (G), සයිටොසීන් (C) හා තයමීන් (T) ලෙස හැඳින්වේ.

මේ අනුව ඩී.එන්.ඒ අණුවේ නියුක්ලියෝටයිඩ එකිනෙකට වෙනස් වන්නේ එහි ඇති ගණ්‍ය පමණක් වෙනස් වීමෙනි.




රූපය 1 : ඩී.එන්.ඒ අණුවක ව්‍යුහය

ඩී.එන්.ඒ අණුව සෑදී ඇත්තේ නියුක්ලියෝටයිඩ බහුඅවයවීකරණය (polymerization) වීමෙනි. නියුක්ලියෝටයිඩවල ඇති කොස්පේට් හා සීනි කාණ්ඩ එකිනෙක හා ප්‍රත්‍යාවර්තනය වී ඩී.එන්.ඒ අණුවේ පිටකොන්ද (backbone) සාදයි. නියුක්ලියෝටයිඩ ගණ්‍ය (A, G, T, C) සීනි කාණ්ඩ හරහා පිටි කොන්දට සම්බන්ධවන අතර එම ගණ්‍ය ඕනෑම අනුපිළිවෙලකට ඩී.එන්.ඒ අණුවේ තිබිය හැකිය.

එක් වර්ණදේහයක නියුක්ලියෝටයිඩ බිලියන සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වන අතර එහි විවිධ ආකාරයෙන් ඩී.එන්.ඒ ගණ්‍ය අනුක්‍රමයන් (DNA base sequence) පිහිටිය හැක. ඩී.එන්.ඒ අණුවේ ප්‍රවේණි තොරතුරු ගැබ් වී ඇත්තේ මෙම නියුක්ලියෝටයිඩ ගණ්‍ය අනුක්‍රමයට අනුවය. උදාහරණයක් ලෙස ඩී.එන්.ඒ අණුවක ප්‍රවේණි තොරතුරු ගැබ් වී ඇති ආකාරය අපට භාෂාවකට සමාන කළ හැක. මෙම ඩී.එන්.ඒ භාෂාවේ ඇත්තේ එකිනෙක වෙනස් අක්ෂර 4 ක් පමණි. එම අක්ෂර 4 නොයෙක් පිළිවෙලට සම්බන්ධ වී වචන හා වාක්‍ය තනමින් සෛලයේ කාර්යයන් කිරීමට අවශ්‍ය විවිධ පණිවුඩ හා තොරතුරු ගබඩා කරයි. ගණ්‍ය අනුක්‍රමය වෙනස් කිරීමෙන් එහි ඇති තොරතුරු වෙනස් කළ හැක.

සෛලයක ඩී.එන්.ඒ සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ නියුක්ලියෝටයිඩ දාම දෙකකින් සෑදුණු ද්විත්ව සර්පිලාකාර (double helix) අණු ලෙසිනි. මෙම දාම දෙක එකිනෙක හා සම්බන්ධ වන්නේ එක් දාමයක ඇති නියුක්ලියෝටයිඩ ගණ්‍ය එහි ඉදිරිපස දාමයේ ඇති ගණ්‍ය සමග හසිඳුපත් බන්ධන මගින් යුගලනය වීමෙනි.



රූපය 2 : ඩී.එන්.ඒ. අණුවේ අනුපූරක දම හයිඩ්‍රජන් බන්ධන මගින් සුගලනය වීම.

මෙහිදී A ගැන්මය T සමග හයිඩ්‍රජන් බන්ධන දෙකක් මගින්ද C ගැන්මය G, C සමග හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තුනක් මගින්ද විශිෂ්ඨ ලෙස බැඳේ. (කැඩී ඇති රේඛා වලින් දක්වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වේ)

මෙහිදී සෑම විටම ඇතිවන්නේ තයමින් සමගද ගුවැනින් සයිටෝසින් සමගද සම්බන්ධ වේ. මේ නිසා ඩී.එන්.ඒ. අනුවේ දාම දෙක එකිනෙකට අනුපූරක (complementary) යැයි කියති. එනම්, ඩී.එන්.ඒ. අණුවේ එක් දාමයක ඇති ගැන්ම අනුවේ වල අප දනිනම් එහි අනෙක් දාමයේ ගැන්ම අනුවේ වල අපට කිව හැක. සත්ත්ව විශේෂවල ඇති විවිධත්වයට මූලික හේතුව වන්නේ එක් එක් සත්ත්ව ඩී.එන්.ඒ. වල ඇති ගැන්ම අනුක්‍රම වල ඇති වෙනස්කම් නිසාය. එසේම, ඕනෑම සත්ත්ව විශේෂයක එම සත්ත්ව විශේෂයට විශිෂ්ඨ (specific) එනම්, එම සත්ත්ව විශේෂයට පමණක් ආවේණික වූ ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රමයන් ඔවුන්ගේ එම ඩී.එන්.ඒ. වල අඩංගු වේ. මෙවැනි ඩී.එන්.ඒ. ගැන්ම අනුක්‍රමයක් ඔවුන්ගේ ගෙනෝමය (genomic) ඩී.එන්.ඒ. නිස්සාරණයකින් වෙන්කර හෝ ක්ලෝනිකරණයෙන් හෝ ලබා ගැනීමෙන් එම සත්ත්ව විශේෂය හඳුනාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පයක් අපට ගොඩනගා ගත හැක.

ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පයක් යනු කුමක් ද ?

යම් කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් මගින් (උදා : විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක්) සලකුණු කර ඇති ඩී.එන්.ඒ. කණ්ඩයක් හෝ කැබැල්ලක් ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පයක් ලෙස හැඳින්විය හැක. ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පයෙහි ඇති ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රමයට අනුපූරක ඩී.එන්.ඒ. දාමයක් යම්කිසි ඩී.එන්.ඒ. නියැදියක ඇත්නම් ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පය ඒ සමග මුහුම් වේ. එම ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පය හා බැඳුණු ඩී.එන්.ඒ. අණු, සලකුණු කළ රසායනික ද්‍රව්‍යට අනුකූලව සංඥාවක් නිකුත් කරයි. ඒ ආධාරයෙන්

ඒප්පයට අනුපූරක දාම පමණක් අඩංගු ඩී.එන්.ඒ. නියැදි අපට හඳුනාගත හැක. මෙම ක්‍රියාවලිය නියුක්ලිසික් අම්ල මුහුම්කරණය (nucleic acid hybridization) ලෙස හඳුන්වයි. (රූපයටහන 3) මෙහිදී පළමුවෙන්ම පරික්ෂා කරන ඩී.එන්.ඒ. නියැදියේ ද්විත්ව පට ව්‍යුහයේ ඇති හයිඩ්‍රජන් බන්ධන දුර්වල කර දාම දෙක නතිපට දාම දෙකක් ලෙසට වෙන්කර (දුස්සවගාවීකරණය; denaturation) සලකුණු කරනලද නතිපට ඩී.එන්.ඒ. දාමයක් (ඒප්පය) සමග නැවතත් මුහුම් වීමට සලස්වයි. ඩී.එන්.ඒ. ඒප්පයක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් තෝරා ගන්නේ ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. නියැදියකින් වෙන්කරගත් හෝ ක්ලෝනිකරණයෙන් වෙන්කරගත් හෝ විද්‍යාගාරයේදී නිපදවාගත් කෙටි ඩී.එන්.ඒ. දාමයකි.

ඩී.එන්.ඒ. ක්ලෝනිකරණය


ඩී.එන්.ඒ. ප්‍රතිසංයෝජන තාක්ෂණයෙන් අද ලබා ඇති විශිෂ්ඨ දියුණුව නිසා ඒවිසෙක සතු සියළුම ඩී.එන්.ඒ. එනම් ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. අතුරින් අපට අවශ්‍ය ඩී.එන්.ඒ. කැබැල්ලක් පමණක් වෙන්කරගෙන එහි පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට, එනම් ඩී.එන්.ඒ. ක්ලෝනිකරණයට අද අපට හැකියාවක් ඇත.

මදුරු විශේෂයකින් අපට අවශ්‍ය ඩී.එන්.ඒ. කැබැල්ලක් වෙන්කර ගැනීමට ප්‍රථමයෙන්ම අප කළ යුත්තේ එම මදුරු විශේෂයේ ගෙනෝමය පුස්තකාලයක් (genomic library) ගොඩනගා ගැනීමයි. ඒ සඳහා මූලිකම එම විශේෂයට අයත් මදුරුවන්ගේ ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. වල නිස්සාරණයක් ලබා ගනී. ඉන් ලැබෙන විශාල වර්ණදේහ ඩී.එන්.ඒ. අණු එන්සයිම ආධාරයෙන් කුඩා කැබලිවලට කපා වෙන්කර එවා ප්ලැස්මිඩ (plasmid) නම් ක්ලෝනිකරණයට යොදා ගන්නා ඩී.එන්.ඒ. වාහකයෙකුට ඇතුළත් කර ගනී. ප්ලැස්මිඩයක් යනු බැක්ටීරියානු සෛල වල එහි තිබී වර්ණදේහයට අමතරව ස්වාභාවිකව පවතින ඉතා කුඩා වෘත්තාකාර ද්විත්ව සර්පිල ඩී.එන්.ඒ. අණුවක් වේ. මෙම ප්ලැස්මිඩවලට බැක්ටීරියාවක් තුළ ස්වාධීනව ප්‍රතිගුණනය වීමට හැකියාවක් ඇති අතර එසේ වීමේදී එහි අඩංගු ජානමය තොරතුරු ද බැක්ටීරියාව තුළ ප්‍රකාශිත වේ. උදාහරණයක් ලෙස බොහෝ ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අණු වල ඇම්පිසිලින් සහ ටෙට්‍රසෙක්ලින් වැනි ප්‍රතිජීවක වලට ප්‍රතිරෝධීතාවයක් (resistance) දැක්විය හැකි ජාන අඩංගු වේ. එවැනි ප්ලැස්මිඩයක් බැක්ටීරියා තුලට ඇතුළු වීමෙන් එම ප්‍රතිරෝධී ජානය බැක්ටීරියා තුළ ප්‍රකාශිත වීමත් සමගම එම බැක්ටීරියා ඇම්පිසිලින් සහ ටෙට්‍රසෙක්ලින් ප්‍රතිජීවක අඩංගු මාධ්‍යයක රෝපණය වීමට හැකියාවක් ලැබේ.


ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අණු සහසුවෙන් බැක්ටීරියාණු වර්ණදේහ ඩී.එන්.ඒ. වලින් වෙන්කර පිරිසිදුකර ගත හැකි නිසා ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාඥයන් එම ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අණු සෛලයෙන් පිටතට ගෙන පරික්ෂණ කළයුත්තක් තුළ

බහා විද්‍යාගාරයේදී නොයෙකුත් ආකාරයේ වෙනස් කිරීම් වලට භාජනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස මෙම ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අණුවක් කපා එය තුලට මදුරුවකුගේ ඩී.එන්.ඒ. කැබලිලක් එක්සයිම ආධාරයෙන් බද්ධකර ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිසංයෝජන ප්ලැස්මිඩ (recombinant plasmid) ඩී.එන්.ඒ. අණු නැවතත් බැක්ටීරියාවක් තුලට ඇතුළුකළ හැක. මෙහි, එම නව ඩී.එන්.ඒ. අණුවේ ජානමය තොරතුරු

අනුව බැක්ටීරියාවේ ලක්ෂණ වෙනස් වේ. එනිසා මෙම ක්‍රියාවලියට බැක්ටීරියාණු පරිණාමනය (transformation) යයි කියති. මෙසේ එක් ජීවියෙකුගේ ඩී.එන්.ඒ. තවත් ජීවියෙකුට ප්ලැස්මිඩ ආධාරයෙන් ඇතුළුකළ හැකි නිසා ප්ලැස්මිඩයකට ඩී.එන්.ඒ. වාහකයක් යයි කියති.



රූපය 3 : නියුක්ලියික් අම්ල මුහුම්කරණය
සාමාන්‍යයෙන් ගණිත 15 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඇති නිව්ට සලකුණු කරන ලද
ඩී.එන්.ඒ. අණුමයක් එක්ණයක් ලෙස භාවිතා කරයි.



- i ඇම්සිසිලින් සහ ටෙට්‍රසෙක්ලීන් ප්‍රතිජීවක වලට ප්‍රතිරෝධී ජාන (පිළිවෙලින් Amp^R, Tet^R) සහිත ප්ලැස්මිඩ වාහකයකුගේ ටෙට්‍රසෙක්ලීන් ප්‍රතිරෝධී ජානයේ අතරමැදි ස්ථානයකිනි (E) එක්සයිමයක් භාවිතාකර තැපීම.
- ii මදුරුවාගෙන් නිස්සාරණය කරගත් ගෙනෝමය නි.එන්.එ. ද එක්සයිමයක් මගින් තුඩා කැබලිවලට කපා ගනී.
- iii කපාගත් ප්ලැස්මිඩ අණු සමූහයක් සමග මදුරු ගෙනෝමය නි.එන්.එ. කැබලි බද්ධ කිරීම.
- iv මෙහිදී මදුරු නි.එන්.එ. කැබලි අන්තර්ගත ප්‍රතිසංයෝජන ප්ලැස්මිඩ නි.එන්.එ. අණු විශාල ගණනාවක් ලැබේ. ඉන් එක් එක් අණුවක අන්තර්ගත මදුරු නි.එන්.එ. කැබලිවල නි.එන්.එ. ගණ්‍ය අනුමත එකිනෙකට වෙනස් වේ. එසේම සෑම ප්‍රතිසංයෝජන නි.එන්.එ. අණුවකම ටෙට්‍රසෙක්ලීන් ප්‍රතිරෝධී ජානය මදුරු නි.එන්.එ. කැබැලිලික්ඛ්‍යේ ඇදේශවීම නිසා විනාශ වී ඇත.
- v ප්‍රතිසංයෝජන ප්ලැස්මිඩ නි.එන්.එ. අණු සමූහය ඇම්සිසිලින් සහ ටෙට්‍රසෙක්ලීන් වලට සංවේදී (පිළිවෙලින් Amp^S, Tet^S) ධාරක බැක්ටීරියා සෛල සමූහයක් තුලට ඇතුළතර ඇම්සිසිලින් අඩංගු රෝපණ මාධ්‍යයක වර්ධනය කිරීම. මෙහිදී ලැබෙන බැක්ටීරියා ක්ලෝනවල ප්‍රතිසංයෝජන නි.එන්.එ. අන්තර්ගත නම් ඒවාට ඇම්සිසිලින් මාධ්‍යයේ වැළීමට හැකියාවක් ඇති නමුත් ටෙට්‍රසෙක්ලීන් මාධ්‍යයේ වැළීමට හැකියාවක් තැනිතිසා සදුනාගත හැක.

මෙලෙස අපට මදුරු ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. කැබලි ප්ලැස්මිඩ අණු සමග මිශ්‍ර කර එන්සයිම ආධාරයෙන් බද්ධ කර ලැබෙන එම ප්‍රතිසංයෝජන ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අණු සමූහය බැක්ටීරියානු සෛල සමූහයකට ඇතුළු කිරීමෙන් එකවර බැක්ටීරියා ගණාවාස මිලියන ගණනාවක් ලැබේ. මෙවැනි එක් ගණාවාසයක් ක්ලෝනයක් ලෙස නම් කර ඇත. මේ අනුව එක් බැක්ටීරියාණු සෛලයකින් ආරම්භවුණු එම බැක්ටීරියානු ගණාවාසයේ ඇති සියලුම සෛලවල අඩංගු වන්නේ මදුරුවාගේ ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. වලින් ලබාගත් එක් ඩී.එන්.ඒ. කැබලිලක පිටපත් විශාල ගණනකි. එක් ගණාවාසයක සෛල විභාජනයට ලක්වීමේදී මදුරු ඩී.එන්.ඒ. කැබලිල සහිත ප්‍රතිසංයෝජන ප්ලැස්මිඩ අණුද ස්වාධීනව ප්‍රතිගුණනය වීමෙන් තම දුගීතෘ සෛලවලට එම මදුරු ඩී.එන්.ඒ. කැබලිලේ පිටපත් ලබාදේ. බැක්ටීරියානු සෛල පරිණාමනයේ මදුරුවාගේ ගෙනෝමයේ නොයෙක් ප්‍රදේශ වලින් ලබාගත් ඩී.එන්.ඒ. බණ්ඩ සමග බද්ධ වූ ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අණු එම එක් එක් බැක්ටීරියානු සෛල තුලට ඇතුළු වී ගණාවාස සාදයි. මෙම බැක්ටීරියානු ගණාවාස සියල්ලම එකතු කළ විට මදුරුවාගේ මුළු ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. අණු නියෝජනය කරන නිසා මෙම ක්ලෝන සමූහයට ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. පුස්තකාලයක් ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි පුස්තකාලයක් ගොඩනැගීමේ එක් එක් පියවර කෙටියෙන් (රූපසටහන 4) හි දක්වා ඇත. මිලහට අප කළ යුත්තේ මදුරු විශේෂය හඳුනා ගැනීමට භාවිතකළ හැකි ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් ගොඩ නැගීමට උවිත ඩී.එන්.ඒ. කැබලිලක් සහිත ක්ලෝනයක් මෙම පුස්තකාලය පරීක්ෂා කිරීමෙන් තෝරා ගැනීමයි.

සත්ත්ව විශේෂ හඳුනාගැනීමට යොදා ගන්නා ඩී.එන්.ඒ.ඒෂණ වල ගුණාංග මොනවාද?

සත්ත්ව විශේෂයක් හඳුනාගන්නා ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයකට පැහැදිලිවම නිබිය යුතු ගුණාංග දෙකක් ඇත. ඒවා නම් අධිසංවේදීතාවය සහ අනිවිශිෂ්ඨ භාවයයි. අධිසංවේදී ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් මගින් ඉතා සුළු ඩී.එන්.ඒ. ප්‍රමාණයක් වුවත් හඳුනාගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස මදුරුවකුගේ හිසෙන් කොටසක් හෝ එක් පාදයක් වුවත් ඩී.එන්.ඒ.

ඒෂණය මගින් පරීක්ෂා කර එම විශේෂය හඳුනාගත හැක. එවැනි ඒෂණයක් ගොඩනගා ගැනීමට ඉතා උවිත වන්නේ සත්ත්ව ගෙනෝමයේ එක්වරක් පමණක් පිහිටන ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රම නොව එහි ඇති බහුපිටපත් ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රම නොහොත් ගෙනෝමයේ නැවත නැවත පුනරාවර්ථනය (repeating) වන ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රම වේ. ඒනිසා අප දැන් කළ යුත්තේ අප ගොඩනගා ගත් ඩී.එන්.ඒ. පුස්තකාලයේ මෙවැනි පුනරාවර්ති මදුරු ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රම සහිත ක්ලෝනයක් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමයි. මේ සඳහා අප කළයුත්තේ මදුරුවාගේ ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. කැබලිවල

එක් මදුරුවෙකුගෙන් නිස්සාරණය කරගත් ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ.

මදුරු විශේෂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 species



රූපය 5 : Rp 36 නම් ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණය ඇනොෆිලස් ක්‍රිෂ්ලෙයිෆේසිස් මදුරු විශේෂය සමඟින් විශිෂ්ඨ ලෙස හඳුනාගන්නා බව පෙන්වීම.

එක් එක් මදුරු විශේෂයන් නිස්සාරණය කරගත් ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. (1-12) විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක් මගින් සලකුණු කරන ලද ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් හා සමග නියුක්ලෙයික් අම්ල මුහුම්කරණයේදී ඇනොෆිලස් ක්‍රිෂ්ලෙයිෆේසිස් ගැහැණු (4) සහ පිරිමි (5) මදුරුවන්ගේ නිස්සාරණය සමඟින් මුහුම්වීමේ සංඥාවක් නිකුත් කරයි. (පරීක්ෂා කරනලද ඇනෝ ෆිලිස් ක්‍රිෂ්ලෙයිෆේසිස් A,B සහ C යන විශේෂ තුනම මෙම ඒෂණය සමග මුහුම් වෙත බව අනාවරණය වූණි)


1. *Aedes aegypti*
2. *Aedes togoi*
3. *Anopheles aconitus*
4. *Anopheles culicifacies* (ගැහැණු)
5. *Anopheles culicifacies* (පිරිමි)
6. *Anopheles jamesi*
7. *Anopheles kaweri*
8. *Anopheles nigerrimus*
9. *Anopheles subpictus*
10. *Anopheles vagus*
11. *Culex quinquefasciatus*

පුර්ණ මිශ්‍රණයක් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් මගින් සලකුණු කර එම මිශ්‍රණය ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් ලෙස භාවිතා කර එම පුස්තකාලය පිරික්සීමයි. යම්කිසි බැක්ටීරියානු සනාථායයක මදුරු පුනරාවර්ති ඩී.එන්.ඒ. කැබැල්ලක් අන්තර්ගත ප්‍රතිසංයෝජක ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. අඩංගු වේනම් එම ක්ලෝනයෙහි අන්තර්ගත ඩී.එන්.ඒ. ඉතා ඉක්මනින් ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයේ අඩංගු අනුපුරක පුනරාවර්ති ඩී.එන්.ඒ. දම සමග මුහුම් වීමෙන් ඉතා නිවු සංශුද්ධ දෙයි. මෙයට හේතුව නම් ගෙනෝමය ඩී.එන්.ඒ. කැබලි මිශ්‍රණයේ පුනරාවර්ති ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රමයක පිටපත් විශාල ගණනාවක් ඇති නිසා එම පිටපත් සියල්ලම ජට අනුපුරක දමයක් සහිත ක්ලෝනයක් හමුවූ විගසම ඒ සමග මුහුම් වී සංශුද්ධ දෙයි.

පුස්තකාලයේ කුමන ක්ලෝනයක එවැනි පුනරාවර්ති අනුක්‍රමයක් සහිත මදුරු ඩී.එන්.ඒ. කැබැල්ලක් අඩංගු දැයි අපට සොයා ගත හැක. එම ක්ලෝනය ඩී.එන්.ඒ. පුස්තකාලයේ අනෙක් ක්ලෝන වලින් වෙන්කර ගෙන එහි අඩංගු ප්‍රතිසංයෝජක ප්ලැස්මිඩ ඩී.එන්.ඒ. බැක්ටීරියානු වර්ණදේහ වලින් මිලඟට වෙන්කර ගත හැක. එම ප්ලැස්මිඩයේ අඩංගු මදුරු ඩී.එන්.ඒ. අනුක්‍රමය එක්සයිම ආධාරයෙන් කපා වෙන්කර ගෙන එය ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් ලෙසට භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය දෙවන ගුණාංගය වන අතිවිභිජ්‍ය භාවය දැන් පිරික්සිය හැක. එනම් අධ්‍යයනය

කරන මදුරු විශේෂ අනෙක් සියලුම මදුරු විශේෂ වලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි විශේෂිත ලක්ෂණයක් එහි අඩංගු වී දැයි තහවුරු කරගත යුතුය. මෙහි, අප සිදු කරන්නේ ඇනෝරිලස් ක්‍රිස්ටෙයිලේසිස් මදුරුවාගෙන් ක්ලෝන කරගත් එම ඩී.එන්.ඒ. කැබැල්ල අනෙක් මදුරු විශේෂ සමග මුහුම් වෙනවාද නැද්ද යයි සොයා බැලීමයි. මෙලෙස ඇනෝරිලස් ක්‍රිස්ටෙයිලේසිස් මදුරු විශේෂය අනෙක් බොහෝ මදුරු විශේෂ වලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් ප්‍රථමයෙන්ම ලොවට හඳුන්වා දීමට අපගේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම (බී.ජී.එන්.කේ. ද සිල්වා, ඩබ්ලිව්. අබේවික්‍රම, ජී.එච්. කරුණානායක) සමත්විය.

මෙම ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණය මදුරුවාගේ ජීවන චක්‍රයේ ඕනෑම අවස්ථාවක් හඳුනාගත හැකි අතර මෙම පරීක්ෂණයට ඔවුන්ගේ ඉතා කුඩා කොටසක් පමණක් සැලේ. එපමණක් නොව ඇනෝරිලස් ක්‍රිස්ටෙයිලේසිස් A නැට් සිබිලියෝ විශේෂය අනෙකුත් B සහ C සිබිලියෝ විශේෂ වලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණ ක්‍රමයක්ද (රූපසටහන 6) අප විසින් ලොවට හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම ගොඩනගා ගත් ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණ යොදාගෙන අප විසින් සිදුකරන ලද ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇනෝරිලස් ක්‍රිස්ටෙයිලේසිස් A විශේෂය නොමැති බව ද අනාවරණය වුණි.



රූපය - 6 : Rp 217 නම් ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණය ඇනෝරිලස් ක්‍රිස්ටෙයිලේසිස් සිබිලියෝ මදුරු විශේෂය සිබිලියෝ B සහ C විශේෂ වලින් වෙන්කර හඳුනා ගන්නා බව පෙන්වීම










ඇනෝරිලස් ක්‍රිස්ටෙයිලේසිස් A, B සහ C වලින් නිස්සාරණය කරගත් ඩී.එන්.ඒ. විකිරණශීලී සමස්ථානික මගින් සලකුණු කර ඇති ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණය සමග නිසැකලෙයික් අම්ල මුහුම්කරණයේ සිබිලියෝ විශේෂයන් පමණක් මුහුම් සංශුද්ධ නිකුත් නොවේ. එහෙත් B සහ C සිබිලියෝ විශේෂ වල ඉතා සුළු මදුරු ඩී.එන්.ඒ. ප්‍රමාණයකින් (1/200 ක කොටසකින්) මුහුම් සංශුද්ධ ලැබේ.

විවිධ රෝගවාහක මදුරුවන්ගේ ලක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ වූ රෝග ඵනම් බෙංගු, බරවා, මැලේරියා හා පැපතිස් ඵන්සෝපලයිටිස් පැතිරීම සිදු වනුයේ එක මදුරු වර්ගයකින් නොවේ. විවිධ මදුරු වර්ග මෙම රෝග පැතිරවීමට ක්‍රියා කරයි. තවද ශ්‍රී ලංකාව තුළ මදුරු වර්ග 140 ක් පමණ ඇති අතර ඉහත සඳහන් රෝග පතුරුවනුයේ මදුරු වර්ග කිපයකට අයත් ගැහැණු මදුරුවන්ය. එයට ප්‍රධානම හේතුව මිනිසා ඇතුළු සතුන්ගේ (ගැහැණු මදුරුවන්) රුධිරය උරාබීම නිසාය.

පිරිමි මදුරුවන් ලේ උරාබීමක් නොකරන අතර, ගස්වැල්, පලතුරු මල්වල සුළු ආහාරය සඳහා ලබා ගනී. ලංකාවේ රෝග වාහකයින් ලෙස කටයුතු කරනුයේ මදුරු විශේෂ 10 ක් පමණ සුළු සංඛ්‍යාවකි.

මදුරුවන්ගෙන් බෝවන රෝග පැතිරීම වලක්වා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනය ඉතා වැදගත්ය. ඒ අනුව විවිධ මදුරු වර්ගවල සුහුඹුල් මදුරුවා (adult) කීටයා

	ඇනෙපිළිස්	ඒඩීස්	කිපුලෙස්
බිත්තර			
ජිවුලා			
කීටයා			
වැඩුණු මදුරුවා	 ගැහැණු පිරිමි	 ගැහැණු පිරිමි	 ගැහැණු පිරිමි
මහා සිව්න අයුරු			

රූපය 1 : මදුරු වර්ගවල ජීවන අවස්ථාවල රූපීය වෙනස්කම්

(larvae) පිලිබා. (pupa) බිත්තර (eggs) වල රුපීය ලක්ෂණ හඳුනාගැනීම අවශ්‍ය වේ. ප්‍රධාන මදුරු වර්ගවල විවිධ ජීවන අවස්ථාවල වෙනස්කම් රූපසටහන 1 හි දක්වා ඇත.

ප්‍රධාන මදුරු විශේෂ

ශ්‍රී ලංකාවේ මදුරුවන් ප්‍රධාන මදුරු කාණ්ඩ දෙකකට වෙන්කර දැක්විය හැකිය. ඒ ඇතෝෆිලින හා කියුලියින

වගුව 1 : මදුරු වර්ගවල ජීවන අවස්ථාවල රුපීය වෙනස්කම් -

වේ. මෙම කාණ්ඩ දෙක අතර මූලික වෙනස්කම් වනුයේ ඔවුන් යම් තලයක වසා සිටින ඉරියව්වේ ආකාරයයි. ඇතෝෆිලින මදුරුවන් වසා සිටින තලයට කෝණාකාරව සිරුර තබා ගන්නා අතර කියුලියින මදුරුවන් වසා සිටින තලයට සමාන්තරව සිරුර තබා ගනිති. ඇතෝෆිලින කීටයන් ජල පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව සිටින අතර කියුලියින කීටයන් ජල පෘෂ්ඨයට කෝණාකාරව එල්ලී සිටිති.

ජීවන අවස්ථාව	මදුරු ගණ (genus)		
	ඇතෝෆිලිස්	රිඩ්ස්	කියුලියිස්
	පලයේ තනි තනිව පාහේ.	එකට එකව පහුරක් ලෙස පලයේ පාහේ.	100 ක් පමණ එකට එකව පහුරක් ලෙස තැනි පලයේ පාහේ.
බෝවෙන ස්ථාන	සිඳිගිය ඇලදෙල තැනින් තැන ඇති දියකඩිති වල මුවීම්, පොල්කටු, අත්තරින ලද මැණික් පහල්, තැනින් තැන රැඳී වර්ෂා ජලය වගුරු, බිම්හි දූෂිත නොවූ ජලය	ඉවත දමන ටින්, හට්ටි, පොල්කටු, මුවීම්, ඇතිරි ගිය වැහිපිහිල්ල, මලබඳුන් කුහුඹු පලාල් ආදියෙහි (තාපත්වල) රැඳී පලය, ඉවත දැමූ ටයර්	දූෂිත වතුර පිරි වැසිකිලි වලවල්, පොල්ලෙලි වලවල් පුවක්ලෙලි අවහිර වූ කාණු පල්ලු වතුර
කීටයන්	ජල පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව සිටීමත් පිහිනයි.	ජල පෘෂ්ඨයට කෝණාකාරව පිහිනමින් සිටී.	ජල පෘෂ්ඨයට කෝණාකාරව පිහිනමින් සිටී.
සුගුඹුලා	ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය. වසා සිටින පෘෂ්ඨයට කෝණාකාරව සිරුර තබා ගනී. කළු පැහැයට හුරුය. පියාපත්වල කළු ලප ඇත.	ප්‍රමාණය සාමාන්‍යය. මදුරුවන් තරමිස. වසා සිටින පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව සිරුර තබා ගනී. කළු පැහැයට හුරුය. ශරීරය කෙලවර පල්ලී ඇති ආකාරයට පෙනේ. පියාපත්වල කළු ලප නොමැත. ආංචික සුදු පැහැති රටාවන් උරසේ ඇත.	ප්‍රමාණය සාමාන්‍යය. මදුරුවන් තරමිස. වසා සිටින පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව සිරුර තබාගනී. තද දුඹුරු සහ ලා දුඹුරු පැහැති.
භූගෝලීය කාලය	සවස 6-10 අතර උදේ 4-6 අතර	දහවල් කාලය උදේ 7-9 සවස 3-5	උදේ 4-6 සවස 6-10
වඩා රුචි ආහාරය	ගව රුඬිරය	මිනිස් රුඬිරය	උරු, ගව සහ එළු රුඬිරය

ආචාර්ය මජ්ඣිම ඩී. වික්‍රමසිංහ, සැප්ත 1990, 31 වෙනම - 1-4 කලාපයෙහි පලවූ "විවිධ මදුරුවාහකයින් හඳුනා ගත්ත" යන ලිපිය අනුසාරයෙන් සකස් කරන ලදී.

රෝග අධ්‍යයන පරීක්ෂණ සඳහා පළතුරු මැස්සන් යොදාගත හැකිද?

මදුරුවන් මගින් බෝවන රෝග පුද්ගලයෙකුගෙන් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට සම්ප්‍රේෂණය කරනුයේ කෙසේද යන්න අධ්‍යයනය කිරීම ඉතා වැදගත්ය. විද්‍යාඥයින්ට පවා මෙවැනි සිදුවීම්වල ක්‍රියාකාරීත්වයන් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබී ඇත්තේ සුළුය. මෙයට හේතුව මදුරුවන් පර්යේෂණ සඳහා යොදවා ගැනීම අසීරු වන අතරම විද්‍යාගාර අධ්‍යයන සඳහා ද ඔවුන් යෝග්‍ය නොවීමයි. වයිට් හෙඩ් ආයතනයේ (White head Institute ඩේවිඩ් ෂිනයිඩර් (David Schneider) නම් පර්යේෂකයෙක් මදුරුවන් වෙනුවට පළතුරු මැස්සන් (fruit flies) යොදා මදුරුවන්ගෙන් මිනිසාට පැතිරෙන රෝග පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා පළතුරු මැස්සන් සුදුසු වන බව පවසයි.

තවද රෝග අධ්‍යයනය සඳහා පළතුරු මැස්සන් අනගි මදුරු ආදර්ශකයක් වන බවද සඳහන් කරයි. මෙසේ වන්නේ මැස්සන්ගේ පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහ ප්‍රයෝජන නිසා යැයිද පෙන්වා දෙයි.

- * ජාන වෙන් කිරීම් සඳහා සරලව හා විශාල වශයෙන් යොදවා ගැනීමට හැකිවීම. තවද මැස්සන්ගේ සම්පූර්ණ ජාන සකස්වී ඇති පිළිවෙල ලබා ගැනීමට පුළුවන් වීමද පහසුවකි.
- * ජාන සලකුණු විශාල වශයෙන් තිබීම.
- * මැස්සන්ගේ හා මිනිසාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය බොහෝ දුරට සමානව ක්‍රියා කිරීම.

ඔහු කුකුල් පැටවුන්ට මැලේරියාව සාදන ප්ලස්මෝඩියම් වෛරස මැස්සන්ගේ ශරීර කුහරය තුලට විදින ලද අතර වාහක මැස්සන් කුකුල් පැටවුන්ට ආසාදනය කරවීමට සලස්වන ලදී. කුකුල් පැටවුන්ට එවිට මැලේරියාව වැළඳුණි. ආසාදනයට ප්‍රතිරෝධී ක්‍රියා කිරීමේදී මැස්සන්ගේ ප්‍රතිශක්ති ක්‍රමය තුළ මැක්රෝ ෆාජ් (macrophage) වැනි අවයවයන් මගින් ප්ලස්මෝඩියම් වෛරස් විනාශ කිරීමට උත්සාහ ගන්නා බව ඔහු විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මදුරුවන් එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් තව කෙනෙකුට රුධිරය ගමන් කරවීමට ඉඩ දෙනවා පමණක් නොව වෛරස් පරපෝෂිතයා, මදුරුවා තුළ ජීවත්වීමට අවශ්‍ය පරිසරයද සකස් කරයි.

ජාන ඉවත්කල විට පරපෝෂිතයා හොඳට වර්ධනය වනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමටද මැස්සන් යෙදීමෙන් මදුරුවන්ට වඩා පහසුවෙන් කළ හැකිය. විකෘති තත්ත්වයොයා ගැනීමටද පහසුවේ. පරපෝෂිතයා මදුරුවා තුළ නොනැසී පැවැත්මට අවශ්‍ය සාධක හඳුනා ගැනීමෙන් මදුරුවා තුළ පරපෝෂිතයාගේ වර්ධනය වළක්වන ඖෂධ නිපදවීම මේ ආකාරයට හැකිවන බවද ප්‍රකාශ කරයි. පරපෝෂිතයන්ගේ ජීවන චක්‍ර තුළ දුර්වල අවස්ථා මැලේරියා නාශක ඖෂධ හා එන්නත් වලට විභව ඉලක්කවේ. ප්‍රතිශක්ති ක්‍රමය මිනිසාගේ ප්‍රතිශක්ති ක්‍රමයට සමාන වන නිසා ආසාදනයට විරුද්ධව කෙසේ කටයුතු කළයුතු ද සහ රෝග ප්‍රතිකාර වලදී නව මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමටද හැකිවේ.

මදුරුවන් මැලේරියා සම්ප්‍රේෂණය කරනුයේ කෙසේද යන්න නිවැරදිව දැනගනිමින් සම්ප්‍රේෂණ අවහිර කරන එන්නත් (transmission blocking vaccine) නිපදවීමටද මාර්ග සාදයි. මැලේරියා එන්නත් බොහෝ විට මග හැරී යනුයේ ප්ලස්මෝඩියම් මිනිස් සෛල තුළ සැතපී සිටින බැවිනි. එවිට ප්‍රතිශක්ති ක්‍රමය මගින් එම වෛරස් සෛල හඳුනා ගෙන ඉවත් කිරීම අපහසුවේ. තවදුරටත් පැවසුවහොත් පරපෝෂිත වෛරසයන් කටුස්සෙකු හෝ බෝදිලිමකු ලෙස හැසිරෙන අතර එහි මතුපිට නිරතුරුවම වෙනස් කර ගනිමින් සිටී.

සම්ප්‍රේෂණ අවහිර කරන එන්නත් නිපදවීමට හැකි වුවහොත් එය රෝග මර්දන ක්‍රියාවලියේ නව ආරම්භයක් වනු බවටද ඔහු ඉති පලකරයි.

මීර්ශන

2000 දෙසැම්බර් 10 දින Sunday Observer හි පළවූ ලිපියක් ඇහුරෙන් සකසන ලද්දේ ජයනන්දන කරුණාකිංග.

තරුණ පර්යේෂකයන්ට/නව නිපැයුම්කරුවන්ට ජාතික විද්‍යා පදනමෙන් ආධාර

විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ හා නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් ඇති තරුණ තරුණියන් සඳහා මූල්‍යාධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ජාතික විද්‍යා පදනම මගින් දියත්කර ඇත. මේ යටතේ නව නිපැයුම් හෝ නවීකරණයන් ලෙස සැලකිය හැකි භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් නිර්මාණය කිරීම හෝ සංවර්ධනය කිරීම හෝ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ආධාර ප්‍රදානය කෙරේ.

සහභාගිවිය හැකි අය :

ඉල්ලුම් කරන දිනයේදී වයස අවුරුදු 25 ට අඩු පාසැල් ශිෂ්‍යයින් හා පාසැල් හැරගිය තරුණ/තරුණියන් මේ යටතේ සුදුසුකම් ලබනු ඇත.

ආධාර ඉල්ලුම්කරන ආකාරය :

අයදුම්කරුවන් පහත සඳහන් විස්තර අයදුම්පත්වල සපයා පාසැල් අයදුම්කරුවන් තම විදුහලේ විදුහල්පතිගේ නිර්දේශයද සෙසු අයදුම්කරුවන් පර්යේෂණ විද්‍යාඥයෙකු/ඉංජිනේරුවරයෙකු ගේ නිර්දේශයද සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

- අ. ඉල්ලුම්කරුගේ නම :
- ආ. පුද්ගලික ලිපිනය :
- ඇ. පාසැලේ/ආයතනයේ (අදාළ වේනම්) නම :
- ඈ. ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු :
- ඉ. අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය :
- ඊ. ව්‍යාපෘතියට වැයකළ හැකි කාලසීමාව :
- උ. අවශ්‍ය සම්පත්/පහසුකම් :

ප්‍රදානය කරනු ලබන මූල්‍යාධාර :

- * ව්‍යාපෘතියේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව සාමාන්‍යයෙන් රු. 25,000/- කට නොවැඩි මුදලක් ප්‍රදානය කළ හැකිය. මීට අමතරව සුදුසු මාසික දීමනාවක් හා යම් ආයතනික ගාස්තු (වෙතොත්) ඒවා ගෙවීමද වෙනම සලකා බැලීමට පුළුවන.
- * ප්‍රදානයක් මාස 06 ක කාලයක් සඳහා වන අතර, එය දීර්ඝ කිරීමේ හැකියාවද තිබේ.
- * ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව ඇගයීම හා ඉල්ලුම්කරු සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජන කිරීම, කළමනාකාර මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබන කමිටුවක් විසින් සිදුකෙරෙනු ඇත. එම කමිටුව ජාතික විද්‍යා පදනමේ අධ්‍යක්ෂ, විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයෙකු හා අදාළ විෂයයේ/විෂයයන්හි විශේෂඥ දැනුමක් ඇති වෙනත් අයකු/අයගෙන් සමන්විත වනු ඇත.
- * පර්යේෂකයාට සිය පර්යේෂණ කටයුතු යම් පර්යේෂණ ආයතනයකදී/විශ්ව විද්‍යාලයකදී කරගෙන යාම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම ජාතික විද්‍යා පදනම විසින් සිදුකළ හැකිය. එහිදී ඔහුට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයෙනු ඇත.

මෙම කොන්දේසි කලින් කල සංශෝධනය විය හැකිය.

විදුරාව - "පැන විසඳුම්"

1. මැලේරියා පරපෝෂිත විශේෂ අතරින් බහුල වශයෙන් මිනිසුන්ට ආසාදනය සිදුකර ඇති පරපෝෂිත විශේෂය කුමක් ද?
2. මැලේරියා රෝගයේ දී මිනිසාට ආසාදනය කරනු ලබන පරපෝෂිත අවස්ථාව සහ මදුරුවා තුළ පරපෝෂිත අවස්ථාවන් මොනවා ද?
3. බරවා රෝගය පැතිරීම හා සම්බන්ධ වන්නේ කිනම් මදුරු විශේෂයක් ද?
4. බරවා රෝගයේ දී සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් සිරුරේ ආසාදනය නොකරන ස්ථානයක් නම් කරන්න.
5. මොළයේ උණ නමින් ප්‍රචලිත රෝගී තත්ත්වය බෝකරනු ලබන රෝග කාරකයා හඳුන්වනු ලබන්නේ කිනම් නමකින් ද?
6. ශ්‍රී ලංකාවේ පැපතිස් එන්සෙපලයිටිස් රෝගය පතුරුවනු ලබන මදුරු ආකාර දෙකකි. එම ආකාර දෙක හඳුන්වන්න.
7. Flavi virus කිනම් රෝගයක් හා සම්බන්ධ වේද? මෙය පතුරුවනු ලබන වාහකයා කවරෙක් ද ?
8. ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණයක් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
සත්ත්ව විශේෂ හඳුනා ගැනීමට යොදා ගන්නා ඩී.එන්.ඒ. ඒෂණ වල ගුණාංග සඳහන් කරන්න.
9. ඊඩ්ස්, ඇනොග්ලිස් සහ කියුලෙක්ස් සුහුඹුලන්ගේ රුපිය ලක්ෂණ අනුව ඔවුන්ව පරිසරයේ දී හඳුනාගත හැකි ආකාරය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.
10. ශ්‍රී ලංකාවේ රෝග වාහකයින් ලෙස ක්‍රියාකරන මදුරු විශේෂ සංඛ්‍යාව කොපමණ ද? මදුරුවන් මර්දනයේදී යොදා ගන්නා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ඉතා කෙටියෙන් හඳුන්වන්න.

ඉහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයා එවන තරගකරුවන් අතරින් කුසපත් ඇදීමෙන් තෝරාගන්නා ජයග්‍රාහකයන් තිදෙනෙකුට රු. 300/- බැගින් ත්‍යාග ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ. ඔබේ පිළිතුරු පහත ලිපිනයට, මෙහි සඳහන් කර ඇති විස්තර සමගින් දෙසැම්බර් මස 31 දිනට ප්‍රථම අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න.

ලිපිනය :

"විදුරාව" සංස්කරණ කාර්යාලය

ජාතික විද්‍යා පදනම

මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස

කොළඹ 07.

නම :

ලිපිනය :

පාසැල :



විද්‍යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳ පොත් ප්‍රකාශන

ජාතික විද්‍යා පදනම විසින් විද්‍යා අධ්‍යාපන පොත් ශ්‍රේණියේ පළකිරීම සඳහා **විද්‍යාව හා තාක්ෂණය (Science & Technology)** පිළිබඳ මාතෘකා යටතේ ලියවී ඇති අත්පිටපත් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. මෙම ප්‍රකාශන උසස් පෙළ පාසැල් සිසුන්ට සහ පොදු මහජනතාවට පරිශීලනය කිරීම පිණිස මුද්‍රණය කිරීමට අරමුණු කරගෙන ඇත. තවද විද්‍යාව පිළිබඳ දැනුම ගවේශණය හා වර්ධනය කරගැනීමට අවශ්‍ය අතිරේක කියවීම් සඳහා මෙම ප්‍රකාශන කුඩා පොත් (booklets) ලෙස ප්‍රකාශනය කෙරේ.

විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සම්බන්ධ කැමති මාතෘකාවක් යටතේ අත්පිටපත් එවිය හැකිය. අත්පිටපත් ප්‍රමාණය මාතෘකාව අනුව වෙනස් විය හැකි අතර, අත්පිටපතක පේළි දෙකක පරතරයකින් යුක්තව (double spaced) තිබිය යුතු උපරිම පිටු ගණන සියලු රූප සටහන්, පැහැදිලි කිරීම් සහ ඡායාරූප ද සහිතව A4 ප්‍රමාණයේ පිටු 50 කි. අත්පිටපතේ A4 ප්‍රමාණයේ එක් පිටුවක් සඳහා රු. 200/= ක මුදලක් බුද්ධිමය දයාකතවය වෙනුවෙන් ගෙවනු ලැබේ. අත්පිටපත් සකස් කිරීම සඳහා රු. 500/= ක මූලික ගෙවීමක් (කම්ටුට් විසින් අනුමත කළ අයදුම්පත් වලට පමණක්) කරන අතර, ඉතිරි මුදල ගෙවනුයේ අදාළ පොත මුද්‍රණය කිරීමෙන් අනතුරුවය. මුද්‍රණය කිරීමෙන් පසු එම ප්‍රකාශනය ජාතික විද්‍යා පදනමේ දේපොළක් බවට පත් වෙයි.

අත්පිටපත් පිළියෙල කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කතුවරුන් මුද්දරය සහිත ලිපිනය ලියන ලද **අගල් 9x4 ප්‍රමාණයේ** ලියුම් කවරයක් සහිතව පහත සඳහන් ලිපිනයට ලියා විමසන්න. අයදුම්පත් ලබාගන්නා අවසාන දිනය, **2001 නොවැම්බර් 05.**

මේ පිළිබඳව ජාතික විද්‍යා පදනම ගන්නා තීරණය අවසන් තීරණය වේ.

ලිපිනය : අධ්‍යක්ෂ
ජාතික විද්‍යා පදනම,
නො: 47/5, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස,
කොළඹ 07.
දුරකථන : 696 771-3
ෆැක්ස් : 694754
ඊමේල් : jayakaru@nsf.ac.lk