

පටක රෝපණය මගින් පැලෑටි බෝ කිරීම

ඉහුළු විස්තරයක්
සිතා කරුණාර්තන,
අධිකාරී,
පටක රෝපණ අංශය,
පොල් පර්යේෂණ ආයතනය,
ඉහුරිල.

මවු ශාකයකින් ලබා ගන්නා ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ සජීවී කොටස්, විශේෂ පැලෑටි පොතොර මිශ්‍රණයක බතා වගා කර ගැනීම පටක් රෝපණය නම් වේ. මෙම පොතොර මිශ්‍රණය පටත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ඉතා සිසුම් ලෙස පාලනය කෙරෙන පරිසර තත්ත්වයන් යටතේය. රෝපණ අවශ්‍යතාවන් අනුව බොහෝ වගා කෙරෙන කොටස්වල වැඩිම හා සංවර්ධනය වකිනෙක මාර්ග අනුව යොමු කෙරේ. පැලෑටි මහා රාශියක් බෝකර ගැනීම සඳහා 'ශාක ප්‍රචාරණය' මෙබඳු එක් මාර්ගයකි.

ශාක පුනර්වර්ධනයේ පදනම කුමක්ද?

මවු ශාකයකින් ඉවත් කර ගත් පටක හෝ ඉන්ද්‍රියන් උචිත පෝර මිශ්‍රණයක බතා ඊට ගැලපෙන පරිසරය සැපයූ කල, ඒවා බෝවන්නේ ඇයි? මේ වූ කලී සුන්‍යාංශ්වික, ජීවීන්ගේ විභේදනය හා බැඳී පවත්නා ප්‍රශ්නයකැයි විශ්වාස කෙරේ. සත්‍ය පිළිතුර තවමත් හරිහැටි සොයා ගෙන නැත. කෙසේ වුවද මෙබඳු බෝවීමේ හැකියාවක් සතු වීම ශාකයක් සත්වයන්ගෙන් වෙනස් කරවන එක් වැදගත් ලක්ෂණයක් වන බව නම් පැහැදිලිය.

සත්ව සෛලයක විභේදනය නිශ්චිතය. අවසානය, යළි ආපසු හැරවිය නොහැකිය. ඒ අනුව, යුක්තාණුව සංවර්ධන අවස්ථා රාශියක් පසු කරමින් වැඩුණු සතෙකු බවට පරිවර්තනය වෙයි. ශාක යුක්තාණුවක සිදු වන්නේ ද එයමය. යුක්තාණුව සංවර්ධන අවස්ථා රැසක් පසු කරමින් 'පරිණත' ශාකයන් බවට පරිවර්තනය වෙයි. එහෙත් මේ ක්‍රියාවලිය අවසාන නැත. ආපසු හැරවිය නොහැක්කක්ද නොවේ. යුක්තාණුවෙන් සතෙකු වැඩෙන නාස්ම ශාක යුක්තාණුවේ සංවර්ධන අවස්ථාවෙහි එය ශාකයේ විවිධ කටයුතු ඉටු කරනු සඳහා විශේෂයෙන් සැකසුණු නොයෙක් කොටස්වලට බෙදෙයි. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය හා ආහාර සංචිත වශයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා සැකසුණු ජලෝයම, ශෛලම හා මාදුස්තර සෛල එබඳු විශේෂ කාර්ය සෛල වර්ගවලින් සමහරකට නිදසුන් වේ. එසේ වුවද සත්ව සෛල මෙන් නොව, මෙම ශාක සෛලවලට ද්විවිභේදනය වීමට පුළුවන. මෙයින් අදහස් වනුයේ මෙබඳු විශේෂ කාර්ය සෛලවලින්, ඊට වඩා විශේෂතාවයෙන් අඩු (එනම් සාමාන්‍ය කාර්ය) සෛල බෝකර ගැනීමට පුළුවන් බවයි. මෙසේ විභේදනය වූ සෛල තවදුරටත් විභේදනය වීමට සැලැස්වීමෙන් වෙනත් විශේෂ කාර්ය මාර්ග ඔස්සේ සංවර්ධනය වීමට සැලැස්වීමට පුළුවන. ශාක පුනර්වර්ධනය එබඳු එක් විශේෂ කාර්ය මාර්ගයකි. විශේෂ කාර්ය සඳහා ගොඩනැගී තිබෙන (මවු ශාකයෙන් ඉවත් කරගත්) සෛලවලට සංවර්ධන මාර්ගය ඔස්සේ ආපසු ගමන් කරමින් කලල, මට්ටමට, එනම් යුක්තාණුවක් වන තුරු, ද්වි - විභේදනය වීමේ හැකියාව තිබෙන බව පෙනේ. මෙම යුක්තාණුවලින් නව ශාක හට ගනී. මවු ශාකවලින් ඉවත් කර ගන්නා ලද පටක, ඉන්ද්‍රිය, හුදකලා සෛල හා ප්‍රාග් ශාක ආදියෙන් නව ශාක බෝකර ගැනීම සඳහා මෙසේ ශාකවල ඇති මෙම අලිංගික ප්‍රජනන හැකියාව උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. උසස් ශාක සෛල සතුරු ඇති පුනර්වර්ධන ශක්තිය (totipotency) ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අයුරින් ප්‍රදර්ශනය වනුයේ පටක ඇසුරෙන් ශාක පුනර්වර්ධනය කිරීමේදීය.

පරික්ෂණ නළ තුළ ශාක ප්‍රජනනය

අලුතින් කරා ගන්නා ලද නොමේරූ ශාක අංකුර, පත්‍ර, මුළු වල කොටස්, යුක්තාණු කලල හා පුෂ්ප අංකුර ආදිය මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම කොටස් සහිත රෝපණ මිශ්‍රණය නරක් වීම වැළැක්වීම සඳහා රසායනාගාරය තුළ සියලු කටයුතු කෙරෙනුයේ ඉතාමත් පිරිසිදු, ජීව ද්‍රව්‍ය රහිත පරිසරයකය. පළමුවෙන්ම රිප්ටයිල් මිදුසාර, ක්ලෝරොක්ස්, නිරොජ්ක කුඩු, මර්කියුරික් ක්ලෝරයිඩ් ආදී සාමාන්‍ය විෂබීජ නාශක යොදා ශාක කැබලි පිරිසිදු කෙරේ. ඊට පසු විෂබීජ නාශකය සහමුලින් ඉවත්කිරීම පිණිස, ශාක කොටස් කලින් ජීවාණුහරණය කරන ලද ජලයේ බතා p.s.i. 15 පීඩනයක් යටතේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 20° ක උෂ්ණත්වයකදී සෝදා ගනු ලැබේ. මෙම කොටස් ජලයෙන් ඉවතට ගෙන, සෙන්ටිමීටරයකට අඩු තරම් කුඩා කැබලිවලට කපා මුළුමණින්ම ජීවාණු රහිතව පිළියෙල කළ ශාක පොතොර මිශ්‍රණ සහිත දිසි හෝ නළ තුළ බතනු ලැබේ. (පෝර මිශ්‍රණය සාදන අන්දම පසුව විස්තර කරනු ඇත.) කුඩා අංකුර හා කලල රෝපණය කරනුයේ මුළුමණින්මය. භාරජයේ වර්ගය අනුව රෝපණ මිශ්‍රණ ඇතුළත් බදුන්, ජීවාණු රහිත පුළුන්වලින් හෝ පියන්වලින් වසනු ලැබේ. ඉක්බිති, මැනවින් පාලනය කෙරෙන පරිසර තත්ත්වයන් යටතේ ඒවා ප්‍රරෝහණ වීමට සැලැස්වෙයි.

රෝපණ මාධ්‍යය බෙහෙවින්ම සාරවත්ය. ප්‍රධාන හා සුක්ෂම ශාක පොතොර වර්ග, වීටමින්, ශාක වර්ධක හෝමෝන හා පිෂ්ටකාතු සැපයෙන මාර්ගයකින් (සාමාන්‍යයෙන් යුක්රෝස්) එය ආධාරය. අවශ්‍ය වුවහොත්, අහාර නම් වූ ජෙලටින් වැනි ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කර මෙම මිශ්‍රණය උකු කර ගනු ලැබේ. අවශ්‍යතාවන් අනුව, පොල් වතුර, මුහුන් සාරය ආදිය ද ශාක වර්ධන මාධ්‍යය සකස් කිරීමේදී උපයෝගී වෙයි. එහි pH අගය 5.0 - 6.0 අතර පවත්වා ගනු ලැබේ. මාධ්‍යය සුදුසු බදුන් වල බතා, මිනිත්තු 15 ක් පුරා පීඩනය යටතේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 120° උෂ්ණත්වයකට පාත්‍ර කිරීම එහි ජීවාණුහරණය පිණිස ගන්නා පියවරකි.

මාධ්‍ය ද්‍රව්‍යයෙන් ශාක බෝකර ගැනීම පියවර කිහිපයකින් සිදු කළ යුත්තකි. එකිනෙක පියවර සඳහා විවිධ මාධ්‍ය තත්ත්වයන් අවශ්‍ය වේ. මේවා තහඩුරු කර ගනුයේ කුමනුකුලට මාධ්‍ය සංයුතිය හා පරිසරය වෙනස් කිරීමෙනි. පරික්ෂණ නළය තුළ ඇති වන පැලෑටි පසෙහි ඉන්ද්‍රීය ද ඉතා වෙහෙසකාරී, ප්‍රවේසමෙන් කළ යුතු කටයුත්තක් වේ.

ශාක පුනර්වර්ධනයේ ගමන් මාර්ග

පෝෂණය කළ ශාක වලින් පැලෑටි පුනර්වර්ධනය වීමේදී අනුගමනය කෙරෙන මාර්ග දෙකක් වෙයි. මෙය තීරණය වනුයේ ශාක වර්ගය, රෝපණය කළ කොටසේ ස්වභාවය හා මාධ්‍ය තත්ත්වය යන මේවායිනි. සෘජු රූපජනනය හා අනියම් රූපජනනය යන මේ මාර්ග දෙකට පදනම සැලසෙනුයේ ශාක සෛලවල ඇති පුනර්වර්ධන හැකියාව (totipotency) තුළිනි. පළමුවැනි මාර්ගය යටතේ විශේෂ කාර්ය සෛල විභේදනයෙන් කලල හෝ දලහට ගනී. අනියම් රූපජනනයේදී විශේෂ කාර්ය සෛල විභේදනය වී, කිණකය

නම් සෛල සම්භාරයක් තව ගනී. මේ සෛල පසුව කළ ලබාදීම පත් වේ. ක්‍රම දෙක යටතේම අවසාන ප්‍රතිඵලය වනුයේ සම්පූර්ණ ශාකයකි.

අතුරු අංකුරවලින් ප්‍රචාරණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අතු කැපුම්වලින් මුල් ඇදවීමට සමානයි. එහෙත්, පරීක්ෂණ නිසා තුළදී අංකුර සංඛ්‍යාව වේගයෙන් වැඩිවීමට සැලැස්විය හැකිය. ප්‍රතිඵලය වනුයේ ඉතා කෙටි කාලයක් තුළදී ශාක අංකුර මහා රාශියක් ජනිත වීමයි. මෙම අංකුර පසුව වෙන් කර ගෙන, වෙන්වෙන් ශාක වශයෙන් මුල් ඇදීමට සලස්වනු ලැබේ.

පටක රෝපණ ක්‍රමයෙන් ශාක ප්‍රචාරණය කිරීමේදී ශාකයේ සංවර්ධන අවස්ථාවෙහි ජන්මාණු ජනිතවීමත් හෝ සංයෝජනයක් සිදු වන බව පැහැදිලිය. එබැවින් එය ලිංගික ක්‍රියාවලියක් නොවේ. ඒ වූ කලී, කුදු වර්ධක හෝ අලිංගික ක්‍රියාවලියකි. මෙසේ ඇතිවන ශාක රුපානුදර්ශීය හා ජානමය වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් මවු ශාකවලට (හෝ ධාරක ශාකවලට) සමාන වේ. මේ අනුව, උසස් ශාක වනාන්තර බෝ කර ගැනීම සඳහා (ක්ලෝන් සෑදීම සඳහා) මෙම උපක්‍රමය වේදයෙහි සමත් වෙයි. සාර්වක ලෙස වැඩි දියුණු කරගත හොත්, සාමාන්‍ය උපක්‍රම අනුව ප්‍රචාරණය ඉතා දුෂ්කර වන බහු වාර්ෂික ශාක ක්ලෝන ඇති කිරීම විශිෂ්ට මෙම උපාය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මේ අනුව, පටක ක්‍රමය සාර්වක වී තිබෙනුයේ සාමාන්‍ය වර්ධක උපක්‍රම අනුසාරයෙන් බෝ කර ගත නොහැකි ශාක වර්ග සම්බන්ධයෙනි. ඇතැම් එළවළු හා පළතුරු ගස් වර්ග සහ වීඩිතුරු ශාක මීට අයත්ය. වන වාසය, පළතුරු ගස් හා වාණිජ පදනමෙන් වනා කෙරෙන ගස් වර්ග ආදිය සම්ප්‍රදයික උපක්‍රම අනුසාරයෙන් ප්‍රචාරණය කිරීම අසීරුය.


මේවායින් ලබාගන්නා කොටස් ශාක රෝපණ මාධ්‍යයේදීද ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අදිමදි කරයි. එබැවින් වර්ග ඉතා කුඩා සංඛ්‍යාවක් හැර, තෝරා ගත් සෙසු වාසය වර්ගයන්ගෙන් ක්ලෝන ලබා ගැනීමේ කාර්යය තවමත් පරීක්ෂණ අවස්ථාවෙහි පිටුවෙයි.

මහා පරිමාවෙන් පැලෑටි බෝ කිරීම සඳහා පටක රෝපණ ක්‍රමය භාවිතා කළ යුත්තේ කෙසේද?

අප දැන් මුහුණ පා සිටින ප්‍රශ්නයට පිළිතුර පටක රෝපණ ක්‍රමයදැයි විමසා බැලීම වැදගත්ය. නිපදවිය යුතු බෝගවලට අදාලව, මෙම ක්‍රමයේ වාසි හා පාඩු මොනවාදැයි සලකා බැලිය යුතුව තිබේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී, ප්‍රශ්නයට තිබෙන ඉතාමත් ලාබසහ ඉතාමත් වේගවත් වියදම වූ කලී සම්ප්‍රදයික ප්‍රචාරණ උපක්‍රම වන්නට පුළුවන. වාණිජ පදනමෙන් පටක රෝපණ ක්‍රමය උපයෝගී කර ගැනීමේදී :

1. මවු ශාකවලින් ලබා ගත් කොටස් වලින් ශාක පුනර්වර්ධනය වීම ඉතා වේගවත් විය යුතුය.
2. ලැබෙන ශාක රුපානුදර්ශීය හා ජානමය වශයෙන් ඒකාකාරී විය යුතුය. ඇතැම් රෝපණ මාධ්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ මවු ශාක කොටස් වලින් අස්වාභාවික පැලෑටි සැලකිය යුතු ගණනක් නිපදවේ.
3. ඉතා කෙටි කලකදී සුළු ඉඩමක් තුළ පැලෑටි මහා රාශියක් නිපදවිය යුතුය. (ලාබදයක වීම සඳහා).
4. ඉතා උසස් ගණයේ මවු ශාක වලින්ම ප්‍රරෝහණය වූ ශාක ලබාගත යුතුය.
5. ප්‍රරෝහණය කළ ශාක පසෙහි ඉන්ද්‍රීය ඉතා සාර්වක ලෙස ඉටු කළ යුතුය.

මෑතවත් උපයෝගී කරගත හොත්, පටක රෝපණ වීද්‍යා ක්‍රමය කෘෂිකාර්මික හා වන වීද්‍යා කටයුතු කෙරේ ඉතා තදින් බලපාන්නට ඉඩ ඇති බව අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළ යුතුව තිබේ. එහෙත් විශේෂයෙන්ම, වැදගත් පළතුරු ගස් ඇසුරෙන් මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම තවමත් දුෂ්කර බව පෙනී යයි. යම් යම් ජයග්‍රහණ අත්පත් කර ගෙන ඇත්ත්, පටක රෝපණ ක්‍රමය සාමාන්‍ය පිළිවෙතක් ලෙස හඳිනවිය හැකි තත්ත්වයට එළඹීම සඳහා තවත් බොහෝ දුර යා යුතු වෙයි.



රූ 1. - පෘථිවි ප්‍රදේශයේ ජල චක්‍රය.
 මූලාශ්‍රය: ජල චක්‍රයේ වෙනස් වීම් අන්තර්ගත කොටස.

මූලාශ්‍රය: Lydian, Kye (1983)

මිනිසාගේ සතුරා - මාරාන්තික පුස් වර්ග

එස්.සේ. හැරල්ඩ් සිල්වා,
සෞඛ්‍ය පීඨ රසායනාගාරය
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය.

මිනිසාලොව පහළට පිදුනු පටන්ම සිය ආහාර වේල සපයා ගැනීම සඳහා පරිසරය සමඟ සැකසීමක් සමත් කළ යුතුය. එමෙන්ම නොවේ. තමාට සෙත සැලසූ පරිසරයේ තුළ පැවැත්ම රැක ගනු සඳහාද ඔහු විසින් නොනැවතෙන සටනක් කළ යුතු විය.

නිදහසේ ලැබෙන වාතය හැරුණුවිට මිනිස් ජීවිතයේ පැවැත්මට ප්‍රධාන වශයෙන් ද්විත්ව වන්නේ ආහාර සහ ජලයයි. එහෙත් එද පටන් අද දක්වාම, රසායනික දූෂක ද්‍රව්‍යයන් නිසා ආහාර හා ජලය පමණක් නොව, ඇතැම්විට වාතය පවා අපවිත්‍ර වීම මිනිස් ජීවිතයට එල්ලවන මහා තර්ජනයකි. අද ද්‍රව්‍ය කාර්මිකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මිනිස් පරිසරය දූෂණය වීමේ අන්තරාව ගැන අපි කතා කරමු. එහෙත්, ස්වාභාවිකව හට ගන්නා රසායනික බලපෑම් නිසා ආහාර පාන සහ ඇතැම්විට වායුමය පවා දූෂණය වීමේ තවත් අන්තරාවක් වෙයි.

ජීව විද්‍යාත්මක බලවේග නිසා ජනිත වන මේ අන්තරාව වූ කලී, සංවර්ධනය වන හා සංවර්ධනය වූ යන දෙකාකාරයේම රටවල් වෙත එකසේ බලපාන්නකි. ඉබේ එල්ල වන මෙවන් ව්‍යසන අනාදිමත් කාලයක් පුරා මිනිසාට ගැටලුවක් විය. එය කෙසේ ඇති වන්නේදැයි ඔහු නොදන්නේය. එහෙත් එය පහළ වූයේ මිනිසාට හා ඔහු ඇති දැඩි කළ සතුන්ට වැළදුණු - ඔවුන්ගේ ජීවිත විනාශ කළ - මාරාන්තික වසංගත ලෙඩ රෝගවල ස්වරූපයෙනි. තමාට දුරව බෝ වූ මෙම අතුරු අන්තරාව එළඹෙන්නේ දේව ශාපයක් නිසා යයි විද්‍යාව හා තාක්ෂණය නොදියුණුව තිබූ එවක මිනිසා සිතුවේ නම් එය බලාපොරොත්තු විය යුත්තකි. බොහෝ රෝගවලට හේතු වනුයේ සෘෂ්ටි ජීවීන් හෝ ඔවුන්ගෙන් පරිසරයට එකතු වන පරිවෘත්තිජයන් බව අද අපි දනිමු. එහෙත් අද ලොව තාක්ෂණික දැනුම නොමැතිව, සුදුසු උපකරණ නොමැතිව, සෘෂ්ටි ජීවීන් හඳුනා ගැනීමට හෝ විශේෂයෙන්ම ආහාර පාන තුළ පරිවෘත්තිජයන් සිටින බව සොයා ගැනීමට හෝ ප්‍රචාරකයක් ආදී කාලීන මිනිසා සතු නොවීය. පුස් වර්ග තිබෙන බව ඔහු දැන සිටියේ ඒවා තම ආහාර ද්‍රව්‍ය මත වැඩෙනු දැක සිටි නිසාය. එපමණක් නොවේ, ඇතැම් පුස් වර්ග - එනම් හතු වර්ග - ඔහු තම ආහාරය සඳහාද යොදා ගන්නේය.

සෘෂ්ටි ජීවීන් හා මිනිසා අතර සම්බන්ධය ඇත අතීතය තෙක් දිවෙන්නකි. බොහෝ ඉහත කලෙක පටන් සමහර සෘෂ්ටි ජීවීන් තම ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගත හැකි බව ඔහු දැන සිටියේය. පාන් වැනි ආහාර සඳහා භාවිතා වන පිටි පිපීම සෞඛ්‍යය යොදා 'මුහුන්' මෙබඳු එක් ද්‍රව්‍යයකි. අද අප ඒවා හඳුන්වන්නේ එක්තරා පුස් වර්ගයක් ලෙසටයි. වයින් (රා) සහ සයිඩර් තැනීම සඳහා පලතුරු යුෂ හෝ ශාක යුෂ 'පැස්සවීම' පිණිස යොදා මුහුන්ද එබඳු තවත් නිදසුනකි. තම ආහාර ද්‍රව්‍ය මත වැඩෙන අහිංසක පෙනුමෙන් යුත් තවත් පුස් වර්ග තිබෙන බව මිනිසා දැක සිටින්නට ඇත. ඒ පුස් වර්ග නිසා ආහාර ද්‍රව්‍ය නරක් වීමෙන් සිදුවන මහා විනාශයද ඔහු දැන සිටි බව පැහැදිලිය. ආහාර හිඟයක් ඇති වූ කල මෙසේ පුස් බැදුණු ධාන්‍ය බිස්ස සහ ගෙඩි වර්ග හෝ ඒවායින් සාදන ලද ආහාර පාන පරිභෝජනයට ගැනීමට ඔහුට සිදු විය. අහිංසක පෙනුමැති ඒ පුස් වර්ග හා ඒවා නිසා මිනිසුන්ට මෙන්ම මිනිසා ඇති දැඩි කළ සතුන්ටද වැළදුණු මාරාන්තික ලෙඩ රෝග අතර වූ සබඳතාව කීමෙන් දැයි යනු සිටියේ ගණනාවක් පුරාම මිනිස් සංකල්පයට අවිෂය වූවක් සේ පැවැත්තේය. මිනිසාට හා ඔහුගේ ගවමහිණාදීන්ට වන කුළ අදහුප්පනය ලෙඩ

රෝග ඇති බව මධ්‍යතන යුගයේ සිට දැන සිටි නමුදු ඒවා ඇති වනුයේ පුස් වර්ග නිසා යන බව අනාවරණය කරන ලද්දේ විසිවන සියවසේ දෙවන භාගයේදීය. සෘෂ්ටි ජීව විද්‍යාව, ජීව රසායන විද්‍යාව හා විශේෂයෙන් ව්‍යාධි විද්‍යාව ආදී විද්‍යා - තාක්ෂණික සංවර්ධනයන් සමගම, තමන්ද තමන් ඇති දැඩි කළ සතුන් හා සිය රට පිටා වේ සිටින අන්‍ය ජීවීන් අතර වූ ස්වාභාවික අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය කීමෙන් දැයි විමර්ශනය කරන්නට - අවබෝධ කරගන්නට - මිනිසා ප්‍රයත්න දැරීය.

නිදසුනක් ගනිමු:
බ්‍රිතාන්‍යයේ නැගෙනහිර ඇන්ග්ලියා ප්‍රදේශයෙහි අති විශාල කළුකුන් ගොවිපලක් විය. 1959 වසරේ නත්තල් උත්සවය සඳහා ඇති දැඩිකරමින් සිටි කළුකුන් රැළ අතර හදිසියේ පැතිර ගිය වසංගතයක් නිසා පස්සින් ලක්ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවක් මරාමුරට පත් වූහ. මෙම සිද්ධිය ලෝකයේ රටවල් ගණනාවකම විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කටයුතුවලට මග සැලසීය. ඉන් ලැබුණේ ආහාර හා ආහාර ද්‍රව්‍යවල පවත්නා පුස් වර්ග කෙරෙහි වූ මිනිස් ආකල්පයෙහි මූලික පෙරළියක් ඇති කරවන සුළු දැනුම් සම්භාරයකි. බ්‍රිතාන්‍යයේ කළුකුන්ට වැළදුණු රෝගයට හේතුව වූයේ ඔවුන්ට දෙන ලද කැට කළ ආහාරය බව සොයා ගන්නා ලදී. එම ආහාරය සාද තිබුණේ බ්‍රසිලියෙන් ආනයනය කළ රටකපු කුඩු වලිනි. මෙකී රටකපු ඇටවල තිබූ ඇස්පර්ගිලස් ෆ්ලවස් නම් පුස් වර්ගයක් නිසා කළුකුන් ව්‍යසනය හටගත් බව අවසාන වශයෙන් සොයා ගන්නා ලදී. තනි පටල ආශ්‍රිත විශේෂ වර්ණ ලේබ් ශිල්ප ක්‍රමයක් (Thin Layer Chromatography - TLC) අනුසාරයෙන් කරන ලද පරීක්ෂණ වලදී පුස් වර්ග විසින් නිකුත් කරන ලද නරිතම රසායනික සංයෝග ගණනාවක් සොයාගන්නට පුළුවන් විය. මෙම ද්‍රව්‍ය 'ඇෆ්ලටොක්සින්' යනුවෙන් නම් කෙරිණි. මේ නම සාදා ගෙන ඇත්තේ විෂජනක පුස් වර්ගයේ නම වන ඇස්පර්ගිලස් ෆ්ලවස් (Aspergillus flavus) යන දෙපදයේ මුල් අකුරු ආශ්‍රිතවය. දීර්ඝ තරංග සහිත අල්ට්‍රා වයලට් (පාරජම්බුල) කිරණවලට ඇල්ලූ කළ, ඇෆ්ලටොක්සින් අනුසාරයෙන් ද්‍රව්‍ය දිලිසෙන්නට වෙයි. මේ නිසා විකිරණය යටතේ, මෙම ද්‍රව්‍යවලින් නිකුත් වූණු නිල් සහ හරිත - කසාවත් පැහැයෙන් යුත් වර්ණ අනුව එම ඇෆ්ලටොක්සින් දෙවර්ගය ඇෆ්ලටොක්සින් ඒ (Aflatoxin A) ඇෆ්ලටොක්සින් බී (Aflatoxin B) යනුවෙන් නම් කරන ලදී.

මිනිසුන්ට මෙන්ම ගොවිපල සතුන්ටද එකසේ මාරාන්තික වූ (ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍යවලට සමාන) රසායනික පරිවෘත්තිජයන් නිකුත් කරන තුරුත් පුස් විශේෂ (ඇස්පර්ගිලස් ගණයේ) සහ සාමාන්‍ය පුස් වර්ග ගණනාවක් ඇති බව පසුව කරන ලද පරීක්ෂණ අනුසාරයෙන් සොයා ගනු ලැබීය. ඉන් සමහරක් පිළිකා ජනකයන් බවද සොයාගන්නා ලදී. මේ විෂ සහිත රසායනික ද්‍රව්‍ය මහා රාශිය 'දිලීර විෂජනක' (මයිකොටොක්සින්) එනම් පුස් වර්ග නිසා ඇතිවන විෂ ලෙස හඳුන්වන ලදී. 1960 මුල් වසරවල සිට 'ඇෆ්ලටොක්සින්' හා 'මයිකොටොක්සින්' යන පද යුරවල සමාන අර්ථ ඇති සේ සලකනු ලැබීය. එහෙත් 'මයිකොටොක්සින්' යන පදය වැරදි අරුත් ඇත්තකි. මීට සමාන වූ 'පයිටොටොක්සින්' හා 'සුටොක්සින්' යන පද, පිළිවෙලින් 'ශාකවලට විෂ වන' හා 'සතුන්ට විෂ වන' යන අරුත් ගෙන දෙයි. ඒ අනුව 'මයිකොටොක්සින්' යන්නෙන් 'දිලීරවලට

විෂටන' වනා 'දිලිට නිසා' ඇතිවන, මිනිසුන්ට හා සතුන්ට අහිතකර විෂ යන්න අදහස් නොවේ.

විෂ ඇතිකරවන සුළු පුස්තකයකිනි. ඇතැම් විට ආහාර ද්‍රව්‍ය අනුභවය නිසා මිනිසුන්ට හා ගොවිපල සතුන්ට වැළඳෙන රෝග 'දිලිට විෂ ව්‍යාධි' (මයිකෝටොක්සිකෝසිස්) යනුවෙන් නම් කෙරේ. මෙම රෝග දෙයාකාරය. විෂ සහිත, පුස්තකයක ඇතැම් විට වැළඳෙන රෝග 'දිලිට විෂ ව්‍යාධි' යනුවෙන් හැඳින්වෙයි. දිලිට විෂ සහිත ආහාර ද්‍රව්‍ය අනුභව කරන සතුන්ගෙන් එම විෂ ද්‍රව්‍යයන්, එකිනෙකට වශයෙන් වැළඳෙන රෝග වලට ද ඇතුළත් වන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. එළකිරි හා රතු පාට මස් මීට නිදසුනකි. කේන්ද්‍ර වැනි සැකසූ කිරි නිෂ්පාදන වලද එම විෂ අඩංගු වන බව සොයා ගෙන ඇත්තේය. ඇස්ලොවොක්සින් B1 හා B2 සහිත ගව ආහාර ද්‍රව්‍ය එළඳෙනුන් විසින් අනුභව කළ විට ඒවා ඇස්ලොවොක්සින් M1 හා M2 බවට පරිවර්තනය වී, අනුභව කළ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු තරමින් කිරිවලට එකතු වී පිට වී යයි. මෙසේ ඇතිවන දිලිට විෂ සහිත සත්ව ද්‍රව්‍ය අනුභව කිරීම නිසා (විශේෂයෙන්ම) මිනිසුන්ට වැළඳෙන රෝග 'දිලිට විෂ ව්‍යාධි' නම් වේ. මෙසේ වැළඳෙන රෝග විවිධාකාරය. විෂ නිපදවන පුස්තකයේ සහ නිකුත් වන දිලිට විෂ වර්ගයේ ස්වභාවය මත එය රුදු පවතියි. සැක කටයුතු දිලිට විෂ නිසා හටගන්නේ යයි සනාථ කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි සහිත මිනිසාට වැළඳෙන දිලිට විෂ ව්‍යාධි ඇත්තේ තුනක් පමණි. නව වැනි සහ දහවැනි ශත වර්ෂ වල පැතිර ගිය (එවකට 'ශාන්ත අන්තෝනිගේ ගින්න' St. Anthony's Fire නම් ලත්) දිරා යෑමේ රෝගයක් වූ අර්ගටිසම් (Ergotism) ව්‍යාධිය එකක් වේ. ක්ලවිපෙරපස් පරිපූර්ණය (Claviceps purpurea) නම් වූ විෂ ජනක මාදිලියේ අර්ගටි (Ergot) හෙවත් පළතුරු (දිලිට කෝෂ්ට බෝවූ රයි හා අනෙක් ධාන්‍ය වර්ග වලින් පිසින ලද පාන් අනුභවයට ගැනීම ඉහත සඳහන් රෝගයට හේතුව විය.

මෙම පුස්තකයෙන් නිපදවෙන විෂ අර්ගටි ඇල්කලොයිඩ නම්. ඒවා නිසා අතපය වල රුධිර නාල හිර වෙයි. ලේ සැපයුමට බාධා වී අදල පටක මැරී යයි. ඉක්බිති ඔහු දුර්වල තුවාල හටගෙන අතපය ගැලවී වැටේ. හෘදය ස්පන්දනය අඩක වීම, ග්‍රන්ථිවලින් යුෂ ශ්‍රාවය වැඩිවීම, පාලනය කර ගත නොහැකි තරමට අතපය වේදිලීම, පාද වලට ගැතිවීම ආදිය මෙහි අවශේෂ රෝග ලක්ෂණයි.

අර්ගටි ඇල්කලොයිඩ නිසා වමනය ඇති වේ. ඊට අමතරව ගර්භණී දෙනුන්ගේ මුත්‍ර මාර්ගය ආශ්‍රිත රුධිර නාලිකා අවහිර වීමෙන්, කළල රුධිරයට සැපයෙන රුධිර ප්‍රමාණය අඩු වී, කළලයේ වැඩිම නතරව, පසුව ගබඩා වීමට ද තුඩු දෙයි. මෙම ලක්ෂණය දැන් මිනිස් ජීවිතයට සහන සැලසෙන උපාය මාර්ගයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. මේ අනුව, ගර්භණී මාතාවන්ගේ ප්‍රසව වේදනා දුරු කොට, පහසුවෙන් දරු ප්‍රසූතිය ගෙන එම සඳහා අර්ගටි වලින් තැනු ඖෂධ භාවිතා කෙරේ.

මිනිසුන්ට වැළඳෙන දෙවැනි රෝගය ඇලිමැන්ටරි වොක්සින් ඇලියුකියා (Alimentary Toxic Aleukia- ATA) නම්, මිනිස් රුධිරය තුළ සුදුවන් දේහාණු නොමැතිවීම හා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ඇතිවන විෂ වීම ඉන් අදහස් කෙරේ. මෙම රෝගය බෙහෙවින්ම වාර්තා වූයේ 19 වැනි සියවසේ රුසියාවෙනි. (ප්‍රසේරියම් විශේෂ වලට අයත්, ප්‍රසේරියම් පෝයේ සහ ප්‍රසේරියම් ස්පොරොට්‍රයිකොයිඩස් නමැති විෂ බෝ වුණු, බොහෝ කල්ගිය තිරිඟු, බාර්ලි හා රයි ආදි ධාන්‍ය අනුභවය සමඟ ඉහත සඳහන් රෝගය බැඳී පවතියි. විෂජනකය බෝවුණු ද්‍රව්‍ය වලින් ස්ටෙරොයිඩ විෂජනක කිහිපයක් හා ප්‍රයිමැටිසින් (trichothecene) වර්ගයේ විෂ ජනක මහා රාශියක් සොයා ගෙන ඇත. දැනට පිළිගෙන ඇති මතය අනුව රෝගය වැළඳීමට වඩාත් ඉඩ ඇත්තේ දෙවැනි වර්ගයේ විෂජනක වලිනි.

විෂ සහිත ආහාර අනුභවයෙන් පසු මුඛයේ, උගුරේ හා ආමාසයේ පටල වල දැවිල්ලක් හටගනී. පසුව එම ප්‍රදේශ ඉදිමී වමනය හා පාවනය, බඩ දැවිල්ල ආදී ලක්ෂණ පහල වේ. උගු අවස්ථාවට එළඹුණු විට නාසයෙන්, උගුරෙන්, වීදුරාමස් වලින්, හා මුත්‍ර මාර්ගයෙන් රුධිරය වහනය වේ. ලේගලන පැල්ලම් සම මතුපිට හට ගනී. සුදු රුධිරාණු අඩුවී ගොස් ඇට මිදුළු සෑය වන නිසා විෂබීජ වලට මුහුණ පෑමේ ශක්තිය හීන වෙයි. වහා පිළියම් නොකළහොත් ආබාධ රැසකට ගොදුරු වන රෝගියා ඉක්මනින් මිය යයි.

ප්‍රථම ලෙස අධ්‍යයනය කර, වාර්තාගත කොට ඇති හේවැනි දිලිට විෂ ව්‍යාධිය වූකල්හි ඇස්ලොවොක්සින් නිසා හට ගන්නා ඇස්ලොවොක්සිකෝසිස් නම් ලද්දකි. ඇස්ලොවොක්සින් නිපදවන පුස්තකය ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට බෝවීම බෙහෙවින් පවත්නා දෙයකි. විශේෂයෙන්ම පිළිකා ඉපදවීමෙහිලා ඇස්ලොවොක්සින් B1 සතුටු වන ප්‍රබල ශක්තිය නිසා මෙම තනි දිලිට විෂ ගණයට ඉතා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලදී. මිනිස් අක්මාවෙහි පිළිකා ඇතිවීමට ප්‍රධාන වශයෙන් සාධක වනුයේ ඇස්ලොවොක්සින් යැයි තරයේ විශ්වාස කරන ලදී. 'ගතවූ දශක තුන තුළ අපිකාවේ හා අන්තර්ගත ආසියාවේ රටවල් රැසක කර ඇති වසංගත රෝග පිළිබඳ අධ්‍යයන අනුසාරයෙන්, පරිභෝජනයට ගන්නා ආහාර වේලේ අන්තර්ගත ඇස්ලොවොක්සින් මට්ටම හා අක්මා පිළිකා අතර සීඝ්‍රණ සබඳතාවක් පවත්නා බව සොයා ගන්නට ලැබීම යට සඳහන් විශ්වාසයට තුඩු දුන් හේතුවයි. ඇත්ත් වශයෙන්ම, ලොව පුරා දහස් සංඛ්‍යාත පුද්ගලයෝ (විශේෂයෙන්ම රටකපු, බඩ ඉරිඟු හා අනෙක් ධාන්‍ය වර්ග වැනි) ස්ථානාත්මකව දිලිට බෝවුණු දෛනික ආහාර ද්‍රව්‍ය සමඟ මාංශාන්තික ලෙස සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක ඇස්ලොවොක්සින්ද අනුභව කරති.

කිසිම ආහාරයක් හෝ ආහාර ද්‍රව්‍යයක් හෝ පුස්තකයේ අන්තරාවේන් මිදුණු එකක් සේ නොසැලකිය හැක්කේ සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය වල උත්පත්ති මොහොතේ සිට මිනිස් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා වේලාව තෙක් කිසියම් අවස්ථාවකදී හෝ ඒවාට පුස්තකය වන්නට ඉඩ කඩ තිබෙන බැවිනි. සැක කටයුතු ද්‍රව්‍ය පිරික්සා බැලූව විෂ ජනක පුස්තකය තිබෙන බව නිතරම පැහැදිලි නොවන්නට ඉඩ ඇත. සිය මාරක යුෂ ඉතිරි කර දමා පුස්තකය මැරී ගොස් තිබෙනු විය හැකිය. බොහෝ අවස්ථාවලදී විෂජනක පුස්තකය එකක් හෝ ගණනාවක් හෝ එක්වරම හෝ එකිනෙක පසු පස හෝ වර්ධනය වෙමින් එකම මාදිලියකට හෝ බෙහෙවින් වෙනස් මාදිලිවලට හෝ අයත් දිලිට විෂ නිපදවයි. ඒවා එම දිලිට වර්ධනය වන ද්‍රව්‍යයට එකතු වෙයි. මේ දිලිට විෂ වර්ග නිසා ඇතැම් විට මිශ්‍ර ප්‍රතිඵල උද්ගත වේ. තවත් අවස්ථාවලදී ඒවා ක්‍රියා කරනුයේ අනෙක් විෂ සහකාරකයන් හැටියටය. සමහර විෂජනක පුස්තකය කෙතෙහිදීම ධාන්‍යයට බෝ විය හැකිය. නිදසුන - බඩ ඉරිඟු, තිරිඟු හා මිලට්; අන් ආහාර ද්‍රව්‍ය වල පුස්තකයේ දැකිය හැකි, පුරාතණ හෝ සැකසුම් අවස්ථාවලදීය. ප්‍රමාණවත් ලෙස ආරක්ෂාකර නොමැත්තේ නම් පාරිභෝගිකයාගේ නිවසේදී වුවද ආහාර වලට පුස්තකයට ප්‍රචාරය, ගබඩා කර තිබෙන හා පසුව ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා තබන ඉතිරි වූ පිසු ආහාරය මේ දෙවර්ගයම ඊට අයත් වෙයි.

දිලිට විෂ අඩංගු වීමට ඉඩ ඇති සේ සලකනු ලබන ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක් වෙයි. සම්පූර්ණ වශයෙන් මෙහි සඳහන් නොවූවද ධාන්‍ය වර්ග (හාල්, බඩ ඉරිඟු, ඉදල් ඉරිඟු, තිරිඟු, බාර්ලි, මිලට්, රයි, මිට්ස්), තෙල් බීජ (රට කපු, කොස්පරා), තෙල් බීජ වලින් සැකසූ ආහාර, පිරිපහදු නොකළ එළවළු තෙල් (රට කපු තෙල්, පොල් තෙල්, ඔලීව් තෙල්, සූර්ය කාන්ත ඇට තෙල්), පළතුරු (ඇපල්), ඇපල් යුෂ, වයින්, බිර, අමු, කෝපි ඇට, කොකෝවා ඇට, අල වර්ග (මයිශොක්කා, බතල) විසුබර වර්ග (කැරට්, රාබු) හා ලුණු ආදිය මෙම ලැයිස්තුවට අයත් වේ. ඇතැම් විට කිරි හා කෝපි වලටද ඇස්ලොවොක්සින් බෝවී තිබූ අවස්ථා

නොමිලේම ව්‍යායාම කළ හැක. මේ වූ කලී, ශ්‍රී ලංකාව වැනි සංවර්ධනය වන රටවලට ඉතාමත් උචිත. පිරිසහය උපක්‍රමයකි.

දිලිර වීෂ සහිත ද්‍රව්‍ය වල වීෂතරණය සඳහා රසායනික උපක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය. මේ සඳහා අකාබනික සහ කාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය මහා රාශියක් අනුසාරයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වා ඇතත් ඒ කිසිවක් දැඩි ඇල්ලවොක්සින්තරණයද, උදෙසා අද උපයෝගී කරගනු ලබන ඉතාමත් ඵලදායී රසායනික ද්‍රව්‍යය ඇමෝනියා වේ. ඇෆ්ලවොක්සින්තරණය සඳහා ඇමෝනියා භාවිතා කළ හැකි පිළිවෙත් කීපයක්ම යුරෝපයෙහි සකස්කොට පේටන්ට් බලපත්‍ර යටතට පත්කර තිබේ. උද්ගරණයක් වශයෙන්, යුරෝපයේ හා ඇමෙරිකාවක්සත් ජනපදයේ මේ සඳහා ඉදිකෙරුණු කුඩා පරිමාවේ නියමු යන්ත්‍රාගාර කීපයක් දැන් ක්‍රියාත්මකව පවතියි. එසේ වුවද කෙතරම් සාර්ථක ලෙස මෙම උපක්‍රමය සංවර්ධනය වන රටවල භාවිතා කළ හැකිද යන්න තවදුරු අධ්‍යයනය කළ යුත්තකි. අධික උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතා තත්ත්වයන් අවශ්‍ය නොවන ක්ලෝරින් වායුව භාවිතයද ඵලදායී වීෂතරණ උපායයක් වෙයි. එමගින් ඇෆ්ලවොක්සින් වලින් 90% ක් පමණ විනාශවන නමුදු ඒ නිසා වීෂතරණ ලද ද්‍රව්‍යයේ ජීවිකෂණ විනාශ වී යයි. ඇෆ්ලවොක්සින් සහිත ද්‍රව්‍යවලින් ඒවා සහමුලින්ම ඉවත්කරලීමට සමත් රසායනික නිස්සාරණ ක්‍රම ඇත්තේය. නිදසුනක් වශයෙන් පලිය ද්‍රාවණ නිස්සාරණ පද්ධතියක් තුළ භාවිතා වන ඵනනෝල්මගින් රටකපු හා කපුඅට පුන්නක්කුවල අඩංගු මුළු ඇෆ්ලවොක්සින් ප්‍රමාණයෙන් 95% කට වඩා ඉවත්ව ඇද ගනී. මෙවැනි ද්‍රාවණ පද්ධති තුළ භාවිතා වන ඇසිටෝන්, ක්ලෝරෝෆෝම් හා පෙට්‍රොලියම් හයිඩ්‍රොකාබන්ද එසේම ඵලදයකය. වීද්‍යාත්මක වශයෙන් ඉතා කාර්යක්ෂම වුවද මේ උපක්‍රම ලාබදයක නොවන්නේ කරුණු දෙකක් නිසාය. පළමුවෙන්ම භාවිතා වන රසායනික ද්‍රාවණ ඉවත්කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන, වීශේෂයෙන් සැලසුම් කළ යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා ගැනීමට ඉතා විශාල වියදමක් දරන්නට සිදුවීමයි. දෙවැන්න, මෙම උපක්‍රම අනුසාරයෙන් ලැබෙන වීෂ රහිත ද්‍රව්‍ය වල පෝෂණ ගුණය සැලකිය යුතු තරමින් හීනවීමයි. ඒවා බොහෝවිට සුදුසු වනුයේ සත්ව ආහාර වශයෙන් පමණකි. වීකිරණයෙන් හෝ රත් කිරීමෙන්ද දිලිර වීෂ සහිත ද්‍රව්‍ය වල වීෂතරණය කර ගත හැකිය. ඇෆ්ලවොක්සින්; අල්ලා වයලට් රශ්මියට සංවේදීතාවක් දක්වයි. මෙහිදී, අන්තර්ගත වීෂ ප්‍රමාණය (සාන්ද්‍රණය), රශ්මියට භාජනය වූ කාලය හා භාවිතා කළ ද්‍රාවණයේ ස්වභාවය යන මේවා අනුව වීෂකරණ ද්‍රව්‍යයේ ඇති වීෂ හායනය වීම පාලනය වේ. කෙසේ වුවද අල්ලා වයලට් රශ්මි මගින් වීෂතරණය ක්‍රියාත්මක හෝ ඵලදායී උපක්‍රමයක් නොවේ.

දිලීර වීඝ්න තාපයට ඔරොත්තු දෙයි. එහෙත්, ඒවායේ දුර්වක
උෂ්ණත්වයට සමාන (අතාංක 250 පමණ) තද තාපයක් යොදවියද,
තාපයෙන් බැඳ ගත හොත් ඇස්පලවෝක්සින් සම්පූර්ණයෙන්ම
හායනය වේ. එබඳු ඉහළ පෙළේ උෂ්ණත්වයන් අවාසිදයක වනුයේ
එසේ සකස් කරන ලද දුර්වක පෝෂණ ශුභය හා පෙනුම හීන වීම
නිසා එය, ආහාරයක් වශයෙන් නාවිතයට නුසුදුසු තත්ත්වයට
පත්වන බැවිනි. එහෙත්, ආර්ද්‍රතාව - තෙතමනය - සතිතව රත් කළ
හොත්, ඊට බෙහෙවින් අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ පවා වීඝ්න දුර්වක
සැළකිය යුතු තරමින් හායනය වෙයි. ප්‍රෙෂර් කුකර්වල පියිමේදි, මුල්
වීඝ්න ප්‍රමාණයෙන් 70% ක් පමණ අඩු වේ. විශේෂයෙන්ම ගෙදරදොර
නාවිතයේදී වය දු කළ ඇස්පලවෝක්සින් අනතුරුවලක් වාලීමේ ඉතා
පහසු වලඳයි පියවරකි. ඇතැම් විට, මික්රෝවේව් උදුන් නාවිතය මේ
සම්බන්ධයෙන් වඩා සඵල පිළිවෙලක් විය හැකිය.

ප්‍රධාන වශයෙන් වැළැක්වීම හෝ කළමනාකරණය කළ හැකි ප්‍රයෝජනවත් උපක්‍රම වශයෙන් පැස්ටරීකරණය, පීචාණුගරණය, වැකුම් ක්‍රමයෙන් ඇඟිලි, චින්තන කිරීම, ශීත කාමරවල ගබඩා

කිරීම හා වියලීම යන මේවා ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන. ඇතැම් අවස්ථාවලදී මෙම උපක්‍රම නිසා ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට සහන දෙනු ලබන්නේ වෙනස් වන නිසාද සමහර උපක්‍රම තාක්ෂණික හා ආර්ථික වශයෙන් නොකළ හැකි නිසාද ඒවායින් බලාපොරොත්තු විය හැක්කේ මිශ්‍ර ප්‍රතිඵල පමණකි.

ධාන්‍ය, බජ, පලතුරු හෝ වර්ධක කොටස් යන මේ ස්වරූප දරන සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය පුස් බැදීමට ගොදුරු වෙයි. එහෙත්, වීෂ නිපදවෙනුයේ ඉන් (පුස් වර්ග) අතලොස්සක් මගින් පමණි. දැනට වීෂ නිපදවීම් අරඹන පුස් ගණන තුනක් ප්‍රමුඛත්වය දරන බව බහුල වශයෙන් අදහනු ලැබේ. අස්පර්ශ්‍ය, පෙනිසිලියම් හා ෆ්‍රසේරියම් යනු එම ගණන තුන වේ. මෙම ගණන වලට අයත් දිලීර විශේෂ වීසිපතක් පමණ තිබෙන බවද ඒවායින් වීඩි අන්දමේ දිලීර වීෂ වර්ග හතළිහකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිපදවෙන බවද සොයා ගෙන ඇත්තේය.

දැනට තොරතුරු සොයා ගෙන තිබෙන ඇස්පලවොක්සින් ගණන 12 ඉක්මවයි. ඒ අතරින් පුළුල් අවධානය යොමු වනුයේ B1, B2, G1, G2 හා M1 යන ස්වරූප පහක කෙරෙහිය. ලොව පුරාම ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ඇස්පලවොක්සින් B1 හා G2 වීශල වශයෙන් හමු වන අතර, ඉතාමත් සියුම් ලෙස අධ්‍යයනය වන පාත්‍ර කෙරෙන ඇස්පලවොක්සින් වර්ගය B1 වේ. පිළිකා සෑදීමේ හැකියාව එය සතුටු ප්‍රභවයකි. ඇස්පර්සිලස් 'ශ්‍රේෂ්ඨ කාණ්ඩයේ පුස් වර්ග ඇස්පලවොක්සින් නිපදවයි. ෆ්‍රසේරියම් විශේෂ කිහිපයකින් 'මි.ල.නොක්' නම් දිලීර වීෂ නිපදවේ. 'මක්ටරොක්සින්ස් A හා B', 'පෙනිසිලින් ඇසිඩ්' හා 'පැටියුලින්' යන නම් වලින් හැඳින්වෙන දිලීර වීෂ නිපදවනුයේ ඇතැම් 'ඇස්පර්සිලස්' හා 'පෙනිසිලියම්' විශේෂ වලිනි. මේ අතර, සමහර වීෂ ජනක ඇස්පර්සිලස් මගින් 'ස්ටෙරිලිසේෂන්' නම් ලත් වීෂ නිපදවේ. එය ගණනකට ආසන්න වූ විශාලතම දිලීර වීෂ සම්භාරය ලෙස සැළකෙන 'ට්‍රයිකොතෙසින්ස්' නම් ලත් රසායනික සංයුක්ත කාණ්ඩය නිපදවෙනුයේ වීෂජනක 'ෂ්‍රේෂ්ටියම්' හා 'ස්ටැක්කොලියස්' විශේෂ මගිනි. කෙසේ වුවද, කෙතේදී උරුරු ගොදුරු වූ බෝගවලින් මිනිසුන්ට හා සතුන්ට බලපාන දිලීර වීෂ වර්ගයන් සම්බන්ධ වූ ප්‍රතිකෞතෙසින්ස් වර්ග සොයා ගෙන ඇත්තේ හයක් පමණකි. මිට අමතරව ක්ලේට්සෙපස් පරිපූර්ණය හා ක්ලේට්සෙපස් පස්පාලි මගින් නිපදවෙන අර්ගව් ඇල්කලොයිඩ් ද දොළහකට වැඩි ගණනක් ඇත.

කිසියම් ද්‍රව්‍යයක දිලීර වීෂ හට ගැනීම ක්ෂේත්‍ර ප්‍රශ්නයක් හෝ ගබඩා ප්‍රශ්නයක් හෝ බොහෝ විට මේ දෙකේම සංකලනයක් හෝ වන්නට පුළුවන. පුස් බැදීම දිලීර වීෂජනකයේ පූර්ව අවශ්‍යතාවකි. එහෙත්, වීෂජනක පුස් වර්ග ඉවත් කළ පමණින් ද්‍රව්‍යයක් මත දිලීර වීෂ නැතැයි නොසිතිය යුතුය. සියලුම ස්වභාවික පරිවෘත්තිකයන් ඉතිරි කර දමා පුස් වර්ග මැරී යන්නට ඉඩ ඇති බැවිනි.

'ශාන්ත අන්තෝනිගේ ගින්න' නම් වූ රෝගය ඇති කළ ෆ්‍රසේරියම් විශේෂය සහ ක්ලේට්සෙපස් පරිපූර්ණය යන දෙක විශේෂයෙන්ම අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ බෙහෙවින් දක්නට ලැබෙන ක්ෂේත්‍ර දිලීර වීෂ නිෂ්පාදනය හා සම්බන්ධ පුස් වර්ගවලට කදිම නිදසුන් වෙයි. අස්වනු නෙලා ගැනීමට පෙර ඉරිඟු හා අවශේෂ ධාන්‍ය වර්ගවලට ෆ්‍රසේරියම් වැළඳේ. ඉදහිට නිරිඟු හා රයි රිගාවන්ට දරුණු ලෙස බෝවනු හැර, 'ක්ලේට්සෙපස්' උරුරු දැන් ඉතා චීලය. 'ගබඩා පුස්' යනුවෙන් නම් පටබැඳුණු 'ඇස්පර්සිලස්' ප්‍රලේඛ 'අස්වනු නෙලීම' බොහෝ කලකට පෙර කෙතේදීම ඉරිඟු වැනි ආහාර ධාන්‍ය ආක්‍රමණය කරයි. මෙබඳු දිලීර වීෂ ප්‍රශ්න ලෙහෙසියෙන් විසඳිය හැකිය. මුලින්ම කළ යුත්තේ පුස් බෝවී තිබෙන ධාන්‍ය තෝරා බේරා ගෙන ඒවා නාවිතා කිරීමෙන් වැළකීමය. ඉන් පසු, ක්‍රමානුකූල, උචිත කාලීන වන උපක්‍රම, සුදුසු දිලීර හා

කාමිනාශක සහ ඒ සියල්ලටමත් වඩා, පුස්වලට ඔරොත්තු දෙන විශේෂ කාලීන වර්ග බෝ කර නාවිතයට ගැනීම ආදිය අනුගමනය කළ යුතුය. මේ සංකල්පය ඔස්සේ ගමන් කරමින් බෝ කරගනු ලැබූ (දිලීරවලට ඔබොත්තු දීමේ ශක්තිය සහිත) කුඩා ඇට සහිත නිරිඟු හා රයි විශේෂ නාවිතයෙන් යුරෝපය පුරා අර්ගව් රෝගය පැන නැගීම බොහෝ දුරට මැඩ පවත්වා ගෙන ඇත්තේය. වැඩිදියුණු කාමී උපක්‍රම අනුගමනය කිරීම, ශීත සෘතු වට පෙර කෙතෙන් අස්වනු ඉවත් කර ගැනීම, සුදුසු පරිදි ධාන්‍ය ගබඩා කිරීම - යන මේ පියවර අනුසාරයෙන්, නිතර නිතර 'ඇලිමන්ටරිවොක්සින් ඇලිඩියා' ව්‍යසන පැන නැගීමේ අන්තරාවද අඩුකර ගෙන තිබේ.

කෙසේ වුවද ගබඩා පුස් නිසා ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට හානි සිදුවීම දැන් පවත්නා විශාලතම ප්‍රශ්නය වේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ෆ්‍රසේරියා, ඇස්පර්සිල හා පෙනිසිලියා යන මේවායින් සිදු වන හානියට අමතරව, ගබඩාගත කර තිබෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය වල වීෂජනකයන් අතර 'ස්ටැක්කොලියස් ඇල්ට්', 'ට්‍රයිකොනිසියම් රෝසියුම්' හා 'ඇල්ටෙන්රියා ඇල්ටෙන්ටා' ආදී තවත් පුස් විශේෂ ගණනාවක්ද බහුල ලෙස මුණ ගැසේ.

ආහාරය සඳහා සුදුසු වනුයේ පුස් නොමැති ආහාරයකට වඩා දිලීර වීෂ රහිත ආහාරයක් වුවද පුස් රහිත ආහාර සපයා ගැනීම වඩාත් පහසුය. ලාබදයකය. ගබඩාගත ආහාර ද්‍රව්‍ය වල පුස් බැදීම හා වර්ධනය වළක්වා ගැනීමෙන් පුස් බෝවීම ව්‍යාප්ත වී, පසුව දිලීර වීෂ ඇතිවීමද වළක්වා ගන්නට පුළුවන. කිසියම් ද්‍රව්‍යයක් මත පුස් බැදීමට හා දිලීර වීෂජනනයට සාධක කිහිපයක් ආධාර වෙයි. ද්‍රව්‍යයේ අඩංගු තෙතමනය, ගබඩා පරිසරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය, පුස් බීජාණු සංඛ්‍යාව, ජලය හා තෙතමනය කාන්දු වීම හෝ ජල වාෂ්ප ස්නිග්ධතාවය වීම, ගබඩාවේ උෂ්ණත්වය හා මියන් වැනි සතුන්ගේ බලපෑම, කාමීන්ගෙන් පැමිණෙන හානි හා ඔවුන් නිසා තෙතමනය සහ පීර විද්‍යාත්මක උෂ්ණත්වය ජනිත වීම යන මේවා වේගවත් ලෙස පුස් වැළඳීමට හේතු වෙයි. එහෙත්, තෙතමනය, උෂ්ණත්වය සහ පුස් බැදීමට පාත්‍ර වීමට ඉඩ ලද කාලය යන මේ තුන පුස් වැඩීම කෙරෙහි බලපාන ඉතාමත් තීරණාත්මක පරිසරීය සාධක ලෙස සැළකිය යුතු වේ. එමෙන්ම, පුස් බෝවීම පාලනය කිරීම සඳහා ඉතාමත් සමීප ලෙස උපයෝගී කර ගත හැක්කේද එම සාධක තුනමය.

ශීත කාමර පරිසරණයෙන් පුස් වැඩීම සමඟ අන්දමින් පාලනය කරගත හැකිය. එහෙත්, කාමී බෝග විශාල පරිමාවෙන් ගබඩා කර තැබීම සඳහා එය ප්‍රායෝගික නැත. පුස් වැඩෙන පරිසරයේ තිබෙන තෙතමනය (පුස් වැඩීම සඳහා ඇති තෙතමනය) පාලනය කිරීම ඉතා ලාබදයක ප්‍රායෝගික පියවර වේ. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වර්ධනය සඳහා තිබෙන ජල ප්‍රමාණය, ජල ක්‍රියාකාරීත්වය (Water activity) q_w නම් වේ. ඉතා අඩු ජල ප්‍රමාණයක් යටතේද පුස් වර්ගවලට වැඩෙන්නට පුළුවන. එබැවින්, ජල ක්‍රියාකාරීත්වය 0.65 මට්ටමට පහත හෙලීමෙන් ඒවායේ වර්ධනය සාර්ථක ලෙස නැවැත්විය හැකිය. මෙහි $q_w = 1$ යනු ද්‍රව්‍යයක් ජලයෙන් සන්තෘප්තව පවත්නා මට්ටමයි.

නොයෙක් අයුරින් ධාන්‍ය වර්ග වේලා ගනු ලබන අතර ඒ ඒ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන වියලන උපකරණද නිපදවා තිබේ. ආරක්ෂා සහිත තෙතමන තත්ත්වයන් යටතේ ගබඩා ගත කර තිබෙන වියලි ද්‍රව්‍ය සඳහා උචිත දුම් ගැසීමේ ක්‍රම නාවිත කළහොත් පුස් බැදීම සාර්ථක ලෙස වළක්වා ගන්නට පුළුවන. වැඩිපුර තෙතමනය ඉවත් කර ඉතා සුදුසු උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයක් යටතේ ගබඩා කිරීම සාමාන්‍ය පිළිවෙත වේ. එහෙත්, අර්ම තෙතමනය හා සුදුසුතම උෂ්ණත්වය යන මේ දෙක ද්‍රව්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යයට වෙනස් වන නිසා ඒවා වෙන් වෙන්ව ගෙන සලකා බැලිය යුතුය. ගබඩා පරිසරය මැනවින් පාලනය වුවද විශේෂයෙන්ම කාමීන්, ලැටිනාන සතුන් හා අවශේෂ පළිබෝධකයන් බෝවීම නිසා ජනිත වන බාහිර සාධක වල බලපෑම යටතේ ස්වාභාවික උෂ්ණත්වය හා තෙතමනය ඉහළ යාමට

ඉඩ ඇත්තේය. ඒ නිසා ඒ ඒ ප්‍රශ්න උද්ගත වන්නාහැම උචිත පියවර මගින් නිරාකරණය කර ගත යුතු වේ.

හානියට පත් ද්‍රව්‍යවල පවත්නා දිලීර වීෂ හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රමාණගත කිරීම සඳහා මූලික වර්ග දෙකකට අයත් පරීක්ෂණ වීඩි උපයෝගී වෙයි. මෙහිලා යොදන රසායනික, වීශ්ලේෂණ හා ජීව වීද්‍යාත්මක ඇගයුම් යන මේ පිරික්සුම් දෙවර්ගය එකිනෙකට පුරක වනු පමණක් නොව, එමගින් දිලීර වීෂ වර්ගය හඳුනා ගැනීම, එහි කේන්ද්‍රගතවීම, වීෂමය බලපෑම්, ප්‍රතිචාර ආදියට අදාළ පූර්ණ විස්තරයක් ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් දිලීර වීෂ සෙවීමේ පරීක්ෂණ කටයුතු පොදු පියවර මාලාවක් අනුගමනය කරයි. අදාළ පියවර ගණන 7 - 8 පමණ වේ. පරීක්ෂණයට භාජනය කෙරෙන ද්‍රව්‍යය ඉතා හොඳින් නියෝජනය කරන සාම්පලයක් ලබා ගත හැකි වන සේ එය මැනවින් මිශ්‍ර කර, උචිත සාම්පල් උපකරණයක් යොදා සාම්පලයක් ගනු ලැබේ. සහ ද්‍රව්‍ය සඳහා කිලෝ ග්‍රෑම් 4 - 5 පමණ සාම්පලයක් සැලේ. මෙය තවදුරටත් කුඩු කර මිශ්‍ර කර, අංක 14 හා 20 ප්‍රමාණයේ පෙරහනවලින් ද පෙරා ඉතා සියුම් ඒකාකාර ග්‍රෑම් 50 වීශ්ලේෂණ සාම්පලවලින් සකස් කෙරේ. වහාම ප්‍රයෝජනීයව නොගන්නේ නම්, මෙම සාම්පල තබන්නේ ශීතකරණ තුළය. සුදුසු ද්‍රාවණයක් භාවිතා කර, සාම්පලයේ ඉතා සුළු වශයෙන් ඇති දිලීර වීෂ ඉවත් කර ගනු ලැබේ. ඊට පසු කරනු ලබන සේදීමේදී පරීක්ෂණයට බාධා පමුණුවන සුළු සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය ඉවත් කෙරෙයි. මෙම අවස්ථාවේදී හෝ නිස්සාරණයට පෙර හෝ සාම්පලය තුළ ඇති තෙල් ඉවත් කිරීමේ කාර්යය සිදු කෙරේ. පටිභූ කිරීම සඳහා යොදා ගනුයේ දියර පෙත් කිරීමේ උපක්‍රමයකි. නැතහොත් තිරු, වණි ලේඛන ශිල්ප ක්‍රම (Column Chromatography) වීඩි භාවිතා කරන්නට පුළුවන. ඉතිරිව තිබෙන ද්‍රව්‍ය වලින් දිලීර වීෂ පෙත් කිරීම සඳහා තුනීස්තර වණි ලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය (Thin Layer Chromatography) යෙදේ. අවස්ථාවේදී තිරව වායු - ද්‍රව වණි ලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය (Gas Liquid Chromatography), ද්‍රව - ද්‍රව වණි ලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය (Liquid - Liquid Chromatography) හා සිහින් තිරු, වණි ලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය (Mini - Column Chromatography) ද භාවිතා වේ. දිලීර වීෂවල ප්‍රතිචාරය සොයා ගෙන එය ප්‍රමාණගත කිරීම ඊළඟ පියවරේ අරමුණයි. Thin Layer Chromatography (T.L.C.) හා Gas - Liquid Chromatography (G.L.C.) ක්‍රම උපයෝගී කර ගැනීමෙන් මෙම කාර්යය ඉටු කෙරේ.

මෙම පියවරේදී වීෂ වර්ගය එහි වීඩි කොටස් වලට බෙදී යයි. T.L.C. ක්‍රමයෙන් වෙන් කිරීමෙන් හෝ සමාන දිලීර වීෂ ද්‍රාවණ සමග සසර බැලීමෙන් ඒවා සනාථ කර ගත යුතුය. දිලීර වීෂ තහවුරු කරනු සඳහා mass spectroscopy නමැති ක්‍රමයද භාවිතා කරන්නට ද ඉඩ ඇත්තේය. දිලීර වීෂ සනාථ කිරීමට මෙන්ම රසායනික වීශ්ලේෂණ ක්‍රමවල ප්‍රශ්න පැන නගින අවස්ථාවලදී ද ජීව වීද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. සැක කටයුතු ද්‍රව්‍යයේ සාරය එක් දිනක් රසායනික තාපාංකවලට එන්නත් කොට, දින 7 කට හෝ සත්වයාගේ මරණයෙන් පසුව හෝ සත්‍යයේ අත්මාවට අත්ලවෙත් සිත් නිසා සිදුවී තිබෙන හානිය නිර්ණය කිරීම එක් සම්මත පරීක්ෂණ ක්‍රමයකි. අනෙක් උපක්‍රමවලදී, සැක කටයුතු ද්‍රව්‍යය නිසා මත්ස්‍ය පැටව්, ඉස්සන්ගේ බත්තර හෝ කුකුළු බත්තර යන මේවා කෙරේ වීද්‍යාමාන වන වීෂමය බලපෑම් අගයනු ලැබේ. රට භාවෝ, වදුරෝ, මියෝ, කුකුළු පැටව් සහ තවත් සත්වයෝද ජීව වීද්‍යාත්මක ඇගයීම් සඳහා භාවිතා වන අනෙක් පිටියෝ වෙත්.

දිලීර වීෂ වීශ්ලේෂණය බෙහෙවින් වැය අධික, සුක්ෂම ක්‍රියාවලියකි. එහිදී විග්‍රහ කරන්නාවූ අන්තරාවර්ත මුණ පෑමට සිදු වේ. දිලීර වීෂ සහිත ද්‍රව්‍ය අතපත ගාමින් ඒවා අලෙවි කරන අයළු හට අන්තරාවර්ත මුණු හා සිටින්නෝ දිලීර වීෂ පිළිබඳ කටයුතු කරන පුද්ගලයෝය. වීද්‍යාත්මක කටයුතුවලදී ඇති වන වීෂ සහිත වායුව ආශ්වාස කිරීම නිසා අනුක්‍රමයෙන් ඔවුන් ද දිලීර වීෂවලට ගොදුරු වන්නට ඉඩ තිබේ. ගතවූ දශක තුනේදී ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් පනතකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් විසින් ආහාර ද්‍රව්‍යවල අඩංගු දිලීර වීෂ පිළිබඳ පුළුල් හෝ සීමිත අධ්‍යයනයක් අරඹා ඇත.

මෙය පොදු වුවද බෙහෙවින් පැතිර පවත්නා ප්‍රශ්නයකි. මේ නිසා සෑම රටකම නිෂ්පාදකයන්ට, වෙළෙඳුන්ට, (මිනිස් හා සත්ව) පාරිභෝගිකයන්ට හා ජාතික භාණ්ඩාගාරයට සිදු වන පාඩුව අති විශාල එකකි. ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ සබඳතා ඔස්සේ එබඳු පාඩු ජාත්‍යන්තර මට්ටමට පැතිරෙයි. මේ නිසා ලෝක ආහාර නිෂ්පාදක වැඩ සටහන්වලට හා ද්‍රව්‍ය සහ ආහාරමය සැලසුම්වලට බාධා පැමිණෙයි. සිය පරිසරය වීෂජනක දිලීරවලින් මුදාගැනීමේ ශක්තිය මිනිසා නොසතු වුවද දිලීර වීෂ රහිත ජාත්‍යන්තර ආහාර නිෂ්පාදන වැඩ සටහනක් නිර්මාණය කර ගැනීම ඔහුගේ දිගුකාලීන අපේක්ෂාවකි.

කාමින් වනයන අලුත් ආයුධ - ආරෝමය

නිලකාන්ති ඊ. ආරච්ඡා
රසායන විද්‍යා අංශය
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය,
හැරින්විල:

කාමිනායක සකස් කරනුයේ මිනිසාට හානි පමුණුවන විවිධ කාමි වසංගත වැළැක්වීම සඳහාය. අවශේෂ ජීවීන්ට හෝ පරිසරයට උවදුරක් නොමැතිව, (විනාශ කිරීමට වුවමනා කරන) කාමි වර්ගය පමණක් නොදැමීමේ හැකියාව යහපත් කාමිනායකයක් තුළ තිබිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණයයි. එහෙත්, අප භාවිතා කරන කාමිනායක බොහොමයක් යහපත් ජීවීන් වේදිකර කිරීමට හුණුවන, මුලින්ම පැරිවිට් කරන ලද පැරිස් ශ්‍රීත හාලෙඩ් ආයුධ වැනි කාමිනායක (IA) කාමින්ට මෙන්ම මිනිසාටද එකසේ අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය විය. අනෙක් අංශය, 19 වැනි සියවසේ සිට භාවිතයට ආ කාමිනායක කාමිනායක රසායන සංයෝග (උදා: ඔගනෝක්ලෝරීන් (2 A) ඔගනෝෆෝස්ෆේට් (2 B) සම්පාදිත සතුන්ට එතරම් වීම ගතියක් නොදැක්වූ අතර, කාමි වර්ග මත රාශියකට අනතුරුදායක විය. නිෂ්පාදන පිරිවැය අධික නොවීය. ඒ නිසා බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වූ එම කාමිනායක වර්ග බහුල වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලදී. දෙවැනි ලෝක යුධ සමයේදී ඇත පෙරදිග රටවල පැවති මාරාන්තික මැලේරියා උවදුරෙන් මිනිසා ගලවා ගන්නා ලද්දේ එම කාමිනායක වලිනි. දහනවවැනි සියවසේදී භාවිතය ඇරඹුණු තැන් පටන් මේ දක්වා කාමිකර්ම අංශයේදී එම කාමිනායක ද්‍රව්‍යවලින් ඉටු වී ඇත්තේ අගනා මෙහෙයකි. කෙසේ වුවද දිගින් දිගටම බහුල ලෙස එම කාමිනායක භාවිතා කිරීම නිසා පැන නැගුණු බරපතල ප්‍රශ්න රාශියක් දැන් අනාර්ථණය වී ඇත්තේය. මේ කාමිනායක මුළුමනින්ම හායනය නොවීම (එනම් සම්පූර්ණයෙන් දිරාපත්ව, අනතුරු රහිත සාමාන්‍ය මූලද්‍රව්‍ය බවට නොපෙරලීම) එක් බරපතල ප්‍රශ්නයකි. ජීවී හායනය වීමේදී ඩී.ඩී.ඩී.වැනි වීම සහිත ද්‍රව්‍ය (2A, X-H) නොනැසී පරිසරය තුළ දිගින් දිගටම පවතියි. පරිසරය තුළ මෙම ද්‍රව්‍ය අඩංගු වී ඇති ප්‍රමාණය හායනය ලෙස වැඩි ඇත. දිගුකලක් සේසේ රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ජීවයින් ඉතිරිවන වීම කොටස්වලට හුරු පුරුදු වීම නිසා කාමින් තුළද ජීවීන්ට මරාගත්ත දිවියේ ශක්තිය ප්‍රබල අන්දමින් වැඩි දියුණු වී තිබේ. එබැවින් ඔවුන් මැඩ පැරැන්වීමට වඩ වඩා වීම සහිත කාමිනායක අවශ්‍ය වෙයි. මේ අනුව කාමිනායක කාමිනායක මිනිසාගේ 'දුෂ්ට මිත්‍රයක්' බවට පත්ව ඇතත් ඒ වෙනුවට යොදා ගත හැකි වෙනත් ද්‍රව්‍යයන් නොමැත්තෙන් ජීවීන්ට හිමිව තිබෙන ප්‍රමුඛ තත්ත්වයට කිසිදු තර්ජනයක් එල්ල වී නැත. කෙසේ වෙතත් ගත වූ වසර කිහිපය තුළදී කාමි පාලනය පිළිබඳව අපේ සංකල්ප වෙනස් කිරීමට එම තත්ත්වය සාධක වී ඇත්තේය.

නව මං

'පරිසරයට හානියක් නොමැති කාමිනායක' යන නාමයෙන් නව සංකල්පය පැහැදිලි වෙයි. සම්ප්‍රදායික කාමිනායක අනුසාරයෙන් කාමින් වද කරන්නට යන්න දරනු වෙනුවට ආර්ථික වශයෙන් හානිකර මට්ටමකට ඔවුන් ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්විය යුතුය යන්න එම සංකල්පය තුළ ගැටළු පළමුවෙනි අදහසයි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, නවතම මැදිලියේ හැකියාව වර්ග දෙකක් පැදි තිබේ. කාමිනායක ලෙස යෙදිය හැකි ද්‍රව්‍ය මත රාශියක් (ස්වාභාවිකව වැඩෙන) ගස්වැල්වලින් ලබාගැනීමට දැන් ප්‍රයත්න දරනු ලැබේ. ක්‍රියාත්මක වී සිටින රසායනික ආලේපන මැති ශාකයෙන් ලබා ගන්නා පයිප්‍රොක්‍රීන් (3) මීට හොඳ නිදසුනකි. එය ශාක සම්භව කාමිනායක අතුරින් ඉතාමත් බහුල ලෙස භාවිතයට යෙදෙන ද්‍රව්‍යය වේ. කාමින්ට ආහාර අනුභවය අරුත් කරවීම හෝ ඔවුන් පලවා හැරවීම සඳහා යොදා ගත හැකි ශාකමය ද්‍රව්‍ය සහ බැසිලස් තුරින් පිත්සිස් වැනි සූක්‍ෂ්‍ය ජීවී කාමිනායක දැනට සලකා බලනු ලබන අනෙක් උපක්‍රම වේ.


කාමින්ගේ ශාරීරික හා වර්ධන ලක්ෂණ මවුන්ගේ විනාශය සඳහා යොදා ගැනීම දෙවැනි මාර්ගයයි. මෑත අවුරුදු තුළදී කාමි හෝර්මෝන (4 A) හෝර්මෝන මිමින් (අනුරූප හෝර්මෝන) (4 B) කෙමොස්ටෙරොල්ස් වේ. කාමි ආරෝමයෙන් යන මේවා සොයා ගෙන ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මෙම නව සංයෝග විශේෂ කාමි වර්ගවලට තදින් අහිතකර වන නමුදු අනෙක් ජීවීන්ට හා පරිසරයට හානි පමුණුවනුයේ අල්ප මාත්‍ර වශයෙනි.

කාමි ආරෝමය

කාමින් සන්නිවේදනය පවත්වා ගනුයේ ඔවුන් සතු තියුණු ස්‍රාණෝන්ධය ඇසුරෙනි. මෙහිදී සුවිශේෂ වාෂ්පශීලී රසායනික සංයෝග 'වචන ලෙස' භාවිතා වේ. මෙය 1960 ගණන් වල මුල් භාගයේදී සොයා ගන්නා ලද්දකි. දර්ශන, ස්පර්ශ හා ශබ්ද වැනි අවශේෂ උපක්‍රම ඇතැම් කාමි විශේෂ වලට වැදගත් වුවද බොහෝ විට බහුල ලෙස උපයෝගී කරගනුයේ ගඳ සුවද මාර්ගයයි. කිසියම් කාමි විශේෂයක් විසින් නිකුත් කරන, එම විශේෂයෙන් පමණක් ප්‍රතිචාර ලැබෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය, හැරින්වීම සඳහා කාමි ආරෝමයෙන් යන පදය භාවිතා වේ. *ලිංගික ආකර්ෂණය සලස්වන ආරෝමය මේ අතරින් සුප්‍රකටය. සිය පිරිමි සගයා ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බොහෝ විට ගැහැණු ජීවියා විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නිකුත් කරයි. අනෙක් අතට සංයුක්ත ආරෝමයෙන් යන අදාළ කාමි වර්ගයේ ගැහැණු පිරිමි දෙපක්‍ෂයටම අයත් කාමින් එකම ගසකට පහර දීම සඳහා විශාල වශයෙන් එක් තැනකට රැස් කරවන්නට සමත්වේ. ආහාර සොයා ගත කුතුහලයක් විසින් නිකුත් කෙරෙන 'මග සලකුණ' ආරෝමයෙන් අන් සගයන්ට ආහාර තිබෙන තැනට යාමට මග පෙන්වයි. මෙය අප හොඳින් දැක පුරුදු දෙයකි. කාමි ජනපදයට එල්ල විය හැකි තර්ජනයක් පිළිබඳව ඉතිරි සැලකීම පිණිස කාමිගා 'අනතුරු හඟවන' ආරෝමයෙන් නිකුත් කරයි. විවිධ කාමි වර්ග විසින් නිකුත් කරන ආරෝමයන් 600 ක් පමණ හඳුනා ගෙන ඇති අතර එයින් 80% ක් පමණ අයත් වනුයේ ලිංගික ආරෝමයන් ගණයටය.

නියත ආරෝමයෙන් යන බලපවත්වන්නේ විශේෂ කාමි වර්ගයකටය. යන කරුණ කාමි පාලනයෙහිදී යොදා ගත හැකි ප්‍රායෝගික විසඳුමකට මග සැලසිය. කාමි ආරෝමයෙන් මගින් කාමින් පාලනය කිරීමේ පදනම එයයි. කාමිනායක රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර නියත කාමි විශේෂයකට අදාළ සංඥාවක් නිර්මාණය කිරීමෙන්, ඒ වර්ගයේ කාමින් උගැන්වූ තුළට ඇද දමා මරා දැමිය හැකිය. මේ අනුව, ආරෝමයෙන් එම වර්ගය අවට ප්‍රදේශයෙහි සිටින බව සොයා ගත හැකිය (රූපය 1). එමෙන්ම, අසූ වූ කාමින් ගණන අනුව, මුළු කාමි සංඛ්‍යාවද ගණන් බැලිය හැකිය. මෙය ගොවියාට වැදගත් වන තොරතුරකි. මේ අනුව ඉතාම හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා (නොකඩවා නිතර නිතර කාමිනායක ඉසිනු වෙනුවට) කාමින් විශාල වශයෙන් සිටින අවස්ථාවලදී පමණක් කාමිනායක යෙදීමෙන් ඔවුන් සාර්ථක ලෙස මර්දනය කළ හැකි පමණක් නොව, කාමිනායක සඳහා වැය වන මුදලද පරිසර දූෂණයද අඩුවේ. ඉපියන්, බෝල් වීටල්, පින්ක් බෝල් පණුවන් ආදීන්ට අදාළ ලෙපිඩොප්ටෙරන් ලිංගික ආරෝමයන් මෙසේ ඉතා සාර්ථක ලෙස භාවිතා කර ඇති ආරෝමයන් වෙයි. විශාල වශයෙන් උගැන්වූ අල්ලා ගැනීම තර්ජන උපක්‍රමයකි. මෙහිදී භාවිතා වනුයේ ඉහත සඳහන් උපක්‍රමයම වුවද

* ලිංගික ආරෝමයන් මෙම නීතියෙන් බැහැර වන අවස්ථා සොයා ගෙන ඇත.




PARIS GREEN (1A)

(1864)

LEAD ARSANATE (1B)

(1892)


മുഖ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ



ORGANO CHLORINES (2A)

X = Cl, DDT (1864)


= H, DDD



ORGANO PHOSPHATES (2B)

Malathion (1950)

പ്രധാനമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ




മൂലകങ്ങൾ

	R ¹	R	
Pyrethrin	1	-CH=CH ₂	-CH ₃
"	"	-CH=CH ₂	-CO ₂ CH ₃
Cinerin	1	-CH ₃	-CH ₃
"	"	-CH ₃	-CO ₂ CH ₃


→ Pyrethrin (3)
(1850)

ഭദ്രാ തരീതികൾ



Cecropia JH (4A)

ആറ്റാ ഭദ്രാ തരീതികൾ



Tuvabione (4B)


തരീതികൾ (5)

ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഭദ്രാ തരീതികൾ

ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഭദ്രാ തരീതികൾ

Periplaneta Americana

(5A)




Periplanone - B + A

ഭദ്രാ തരീതികൾ ;

Papilio japonica


(5B)



ഭദ്രാ തരീതികൾ ;

Bombyx mori


(5C)




ഭദ്രാ തരീതികൾ


ഭദ്രാ തരീതികൾ ;

Dendroctonus brevicornis





A = දෙපැයුරු




A = දළලාපයේ දෑ

A = වෙළෙඳපොළ

B = පැයුරු

C = වෙළෙඳපොළ

වෙළෙඳපොළ, වෙළෙඳපොළ



ආර්ථික වශයෙන් හානිකර මට්ටමෙන් පහත් තත්ත්වයන්ට කාමි සංඛ්‍යාවන් අඩුකර ගැනීම සඳහා උගුල් මහා රාශියක් උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. ගැහැණු පිරිමි කාමීන් අතර තුල්‍යාත්මක සංඥා අවුල් කර දැමීම සඳහා වෛරෝමෝන විශාල වශයෙන් වායු ගෝලයට ඉසීම තවත් උපක්‍රමයකි. මේ අනුව, 'අවුල්කාරී' වෛරෝමෝන දිගින් දිගටම ඉහළ මට්ටමකින් වායුගෝලය තුළ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. කාත්‍රිම රසායනික සංඥා ගණනාවක් තිබීම නිසා ගැහැණු සතුන් සොයා ගැනීමට පිරිමි කාමීන්ට අපහසු වේ. එබැවින්, ලිංගික සංසර්ග අවස්ථා අඩුවීමෙන්, ඊළඟ පරම්පරාවේ කාමීන් ගණන ද හින වියයි.

වෛරෝමෝන භාවිතයේ සාර්වකත්වය රඳා පවත්නේ එය යෙදීමට පෙර ගත යුතු පියවර කිහිපයක් මතය. මීට බෙහෙවින් හේතු වනුයේ නිවැරදි ලෙස පියවි වෛරෝමෝනයට අනුකූලව කාත්‍රිම වෛරෝමෝනය සාදා ගැනීමේ හැකියාව බව පැහැදිලි කර ගැනීමයි. කාමීන් විසින් නිකුත් කරන වෛරෝමෝන සංඛ්‍යාව අල්ප මාත්‍ර වුවද ඒවා වෙන් කර ගෙන ඒවායේ ව්‍යුහය හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි වැඩි දියුණු නව උපක්‍රම නිසා ස්වාභාවික වෛරෝමෝන නිවැරදිව හඳුනා ගන්නට පුළුවන. වණිමාලේප ක්‍රම කිහිපයක් වන Gas liquid chromatography, Electro antennography, FT Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy සහ FT Infra red spectroscopy ආදී තාක්ෂණ විධි දැනට වැඩි දියුණු කර ඇති මෙබඳු ප්‍රයෝජනවත් උපක්‍රම සමහරකි. බහු සංයුති සංයෝජනවල ඵකිනෙක ද්‍රව්‍යයේ පරිමාණයන් සොයා ගනු සඳහා යෙදෙනු ලබන වණිමාලේප ක්‍රමයන් වන Capillary Gas-Liquid Chromatography

වැනි ඉතා සියුම් විශ්ලේෂණ විධි භාවිතා කරනු ලැබේ. ඊට පසු විවිධ කාත්‍රිම උපක්‍රම අනුසාරයෙන් ස්වාභාවික වෛරෝමෝනයට සමාන කාත්‍රිම වෛරෝමෝන සාදා ගනිති. ඉතා පිරිසිදු ලෙස නිවැරදි අයිසෝමර් සෑදීම සාර්වකත්වයේ ප්‍රධාන රහස්‍යයි. නිදසුනක් වශයෙන් (නිබ්බ හැකි අයිසෝමර් හතර අතුරින්) බොම්බක්ස් මොර නම් පට ඉපියා සිට ලිංගික වෛරෝමෝනය සඳහා යොදා ගන්නේ (10E, 12Z) - හෙක්සාඩෙසිකැඩිනොල් (5C) පමණකි.

වමෙන්ම පොපිලා ජාපනිකා නම් ජපන් කුරුමිණියාගේ පිරිමි සතා සිට කාත්‍රිම වෛරෝමෝනයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඇම වශයෙන් 99.95% ක් පිරිසිදු 1 පියුරිතෝන් (5B) යොදා තිබේ නම් පමණි. වෛරෝමෝනය ලබා ගත් පසු, එය නොකඩවා ඇතැම් විට සති 3-4 ක කාලයක් මුළුල්ලේ නියමිත ප්‍රමාණයෙන් නිකුත් කළ හැකි ද්‍රව්‍යවල බහා තබනු ලැබේ. රබර් හෝ පොලිතින් බඳුන් මීට නිදසුනකි. මෙම ඇම සුදුසු ලෙස සකස් කළ උගුලක් තුළ තබනු ලැබේ. එන කාමීන් විනාශ කරනු පිණිස උගුලෙහි ලාචු ගල්වා හෝ කාමිනාශක යොදා හෝ තැබිය හැකිය. නිවැරදි වෛරෝමෝන ප්‍රමාණය, උගුලේ සැකසුම, එය තබන අන්දම හා උස ආදිය එම ක්‍රමයේ සාර්වකත්වයට විශේෂයෙන් වැදගත් කරුණු වෙයි. අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළ හැක්කේ වෛරෝමෝනය සර්ව සම්පූර්ණ වියදමක් නොවන බවය. ඒවා භාවිතය සම්බන්ධව කළ යුතුව ඇති පර්යේෂණ කටයුතු බොහෝය. වෛරෝමෝන භාවිතයෙන් සංවර්ධිත රටවල උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගෙන ඇතත්, මෙබඳු අන් උපක්‍රම බොහෝ ගණනාවක් මෙන් දිළිඳු රටවලට ඒවායේ ප්‍රයෝජන ලැබී තිබෙනුයේ අල්ප වශයෙනි.

අපේ රටට ගැලපෙන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ ඉදිකිරීම් ක්‍රම

වී.වී.එල්. බෝගෙහිපත්ත,
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය,
95/1, ජාත්‍යන්තර පාර,
කොළඹ 5.

ජනතාවට නිවාස සැපයීම සෑම රටකම ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනු ලබන කටයුත්තකි. වැඩිවන ජනගහණය, නාගරීකරණය හා යොබයාදායක අතිරේක වාසස්ථාන බිහිවීම ආදිය නිසා නිවාස ප්‍රශ්නය ඉතා කඩිනමින් විසඳිය යුත්තක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත්තේය. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මුදලින් සියයට 50 ක් පමණ වැය වනුයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය හා අවශේෂ උපාංග සපයා ගැනීම පිණිසය. එබැවින් නිවාස ඉදිකිරීමේ සමාජමය හා ආර්ථික අරමුණු අත්පත් කර ගැනීමේදී ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තයෙන් ඉටු වනුයේ මූලික සේවයකි. නිවාස ප්‍රශ්නය එලෙස අත්දැකීම් විසඳ ගැනීමට නම්, ප්‍රාන්තය හා බලය වැනි විවිධ ජාතික සම්පත් භාවිතය හැකි තාක් දුරට අඩු කිරීම සුදුසු දේශීය ද්‍රව්‍ය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්‍රම යොදා ගත යුතු වේ.

ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා සෂ්ඨික පිළියමක් නොමැති බවත් ඒ පිණිස, ඉංජිනේරුවන්, පර්යේෂකයන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, සැලසුම්කරුවන් හා ඉදිකරන්නන් අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවක් තිබිය යුතු බවත් දේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය විසින් අවබෝධ කරගත යුතුව ඇත. එබැවින් (1) දේශීය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය, තාක්ෂණික දැනුම හා කුසලතා (2) ශ්‍රමාධික තාක්ෂණ විද්‍යා භාවිතය (3) අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා මූල්‍ය සම්පාදන ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය - ආදිය ඇතුළත් විවිධ පැති සහිත ඒකාබද්ධ ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ සඳහා අවශ්‍ය වේ. අවසාන වශයෙන්, මිනිස් ජනාවාස පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ද විසඳිය යුතුය. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය, ස්ථාවර ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්තයක් ඉදිකරගැනීම, ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය හා අඩු මිල නිවාස වලට අදාළ සමාජමය හා සේවමය අංග යන මේවා ඊට ඇතුළු වෙයි.

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම

බැඳීමේ ශක්තිය, ඉක්මනින් දැඩි වීම, කෙළින්ම භාවිතා කළ හැකි ස්ථාවරයෙන් ලබාගන්නට පුළුවන් වීම යන මේ හේතු නිසා ගත වූ දශක කිහිපයක තුළ දී සිමෙන්ති භාවිතය වැඩි ගොස් ඇත්තේය. මේ නිසා මැටි, තුණු හා ගල් කැබලි පාවිච්චිය තදින් හින වී ගොස් ඇත. ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය ඇසුරු කරගත් වානේ කර්මාන්තය ස්ථාවර වීමද මීට තුඩු දුන් තවත් සාධකයකි.

කෙසේ වුවත් නුදුරු අතීතයේ පටන් ගොඩනැගිලි කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නට පොහොසත් තරමින් ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය විකාශනය වූයේ නැත. මේ නිසා අගනා විදේශ විනිමය සම්භාරයක් වැය කරමින් අමු ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන හා අංශෝපාංග යනාදිය ආනයනය කිරීමට සිදු වී තිබේ. තත්ත්වය, ක්‍රියාකාරීත්වය හා භාවිතයට ගැලපේද නැද්ද යන බව ගැන නොසිතා, අවිචාරවත් අත්දැකීම් විදේශීය ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කර ගැනීම දේශීය කර්මාන්තයේ සංවර්ධනයට හරස් කැපු බව සිතන්නට පුළුවන. ඉහත සඳහන් තත්ත්වය යටතේ දේශීය කර්මාන්තය උපරිම අත්දැකීම් වගා දිනා කර ගැනීම අනවශ්‍ය වූ බැවිනි. එතරම් ශක්තියක් වුවමනා නැති අත්තිවාරම් කපරාදු හා කුස්තූර වැඩ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති බහුල ලෙස භාවිතා වේ. මෙසේ පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති සාර්වදේශීය භාවිතයට ගැනීමෙන් ගොඩනැගිලි පිරිවැය අධික වෙයි. මේ අයුරින් අනවශ්‍ය ලෙස පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති පාවිච්චි කිරීම හයානක ලෙස වැඩි ගොස් ඇත.

ලොව පුරා භාවිතා වන සිමෙන්ති ප්‍රමාණයෙන් සත්‍ය ලෙසම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ 20% ක් පමණකැයි ගණන් බලා තිබේ (ජර්නල් ඔෆ් ද නේටිවර්ක් - 1989). ඊටත් වඩා, ඇස්බෙස්ටෝස් හා යකඩ රැළි තහනු වැනි ආනයනික ද්‍රව්‍ය සමහරක් ගම්බඳ ජනතාවගෙන් වැඩි කොටසකට පාවිච්චි නොකළ හැකි තරමට මිල අධිකය.

දැව භාවිතය ප්‍රශ්නයේ තවත් පැත්තකි. අපේ රටක සම්පත් තැනි ගන්නවන තරම් වේගයෙන් හීන වී ගියද ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා තවමත් ප්‍රමුඛ ස්ථානය දී ඇත්තේ උසස් තම ගණයේ දැව වර්ගවලටයි. එබැවින්, ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ගැලපෙන දෙවැනි ගණයේ දැව තෝරා භාවිතයට ගැනීම ඉතා වැදගත් කටයුත්තකි. මේ අනුව, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම කෙතරම් දුරට උචිතද යන ප්‍රශ්නය මෙහිදී පැන නගියි.

විසදුමක් සොයා

සිමෙන්ති හා අනෙකුත් ආනයනික ද්‍රව්‍ය මත ධුරමනාවට වැඩියෙන් එල්ල ගෙන සිටීම උළුක් වනු සඳහා, අපේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට හා භාවිතයට අදාළ උපක්‍රම යළි සංස්කරණය කළ යුතුව ඇත. මෙහිලා විකල්ප ගණනාවක් වෙයි. ඉන් ඇතැම් ක්‍රී ලංකාවට එතරම් නොවෙනස් සමාජ - ආර්ථික තත්ත්වයන් සහිත අන් සංවර්ධනය වන රටවල භාවිතයට ගෙන ඇත. ඒවා මෙසේ ලුහුබිත් වර්ග කර දක්වන්නට පුළුවන.

1. සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය හා භාවිතය අර්ථවත් අයුරින් ඉටු කිරීම.
2. මැටි හා කෘෂිකාර්මික සහ කාර්මික අපද්‍රව්‍ය වැනි අනෙකුත් 'බැඳෙන සුළු ද්‍රව්‍ය' සහ (ඕ පී සී නමැති ද්‍රව්‍යය) යොදා, තනන මිශ්‍ර සිමෙන්ති වර්ග නිෂ්පාදනය.
3. අවශේෂ උචිත ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ ක්‍රම භාවිතය.
නිදසුන - ගඩොල් හා බිලොක් ගල්
- කෙඳිවලින් ශක්තිමත් කළ කොන්ක්‍රීට්
4. තුණු බඳම හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන.

සම්ප්‍රදයික ද්‍රව්‍ය

ජාතික ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය විසින් 1984 දී ගම්බඳ නිවාස පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන් පරික්ෂණය ලදී. මෙම සම්පූර්ණය අනුව, ගම්බඳ නිවාසවල බිත්ති සඳහා යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය මෙසේය. මැටි (61.8%), පිළිස්සු ගඩොල් (16.2%), ගල් කැබලි (8.1%), සිමෙන්ති නිෂ්පාදන (4.8%), කබොක් (4.1%), දැව හා අන් ද්‍රව්‍ය (4.8%), ගෙබිම බොහෝ විට (50.4%) මැටියෙන් තනන ලදී. තලන ලද මැටි (8.4%) සහ ඇතැම් පළාත් වල මෝඩගල් (4.6%) ද භාවිතා විය.

පියස සෙවිලි කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදන ලද්දේ පොල් අතුය. මෙම ජනප්‍රිය ද්‍රව්‍යය නිවාස අතරින් 42.6% ක මූලික දෙය හැටියට භාවිතා විය. පිළිවෙලින් නිවාස 4.1% හා 1.6% ක පියුරු හා තල් අතු භාවිතා වී තිබිණ. නිවාස වලින් 33.8% ක පියස සඳහා උච්ඡ 10.8% ක රැලි ගැසු ගැල්වනයිස් තහනු යොදා තිබිණ (ගම්බඳ නිවාස සම්පූර්ණය 1984).

නගරබද නිලේස්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක බිත්ති ගඩොලින්ද (62%), පියස උළුවලින්ද (47.7%), ගෙබිම සිමෙන්තියෙන්ද (78%) නිම කර තිබිණ (ශ්‍රී ලංකාවේ නිරායු සැපයුම 1978).

උච්ඡ්‍රාවය - පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය

සම්ප්‍රදායික ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරවනු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය, කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය, ජාතික නිරායු අධිකාරිය සහ වීදේශවල ආයතන ගණනාවක් විසින් සැලකිය යුතු තරම් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු රැසක් කර තිබේ. පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිවීම හා ඉතා සරල ලෙස, පහසු ලෙස සකස් කර ගෙන, භාවිතයට ගැනීමේ ඉඩකඩ පැවතීම යන කරුණු නිසා (එම ද්‍රව්‍ය අතරින්) ශ්‍රී ලංකාවේ වීදේශයෙන් ගැලපෙන ඒවා සමහරක් පහත විස්තර වේ.

හුණු ආශ්‍රිත සිමෙන්ති නිෂ්පාදන

පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති වෙනුවට තරමක් දුරට හුණු - අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණ සාදන්නට පුළුවන. මේ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට අදාළ තාක්ෂණය සරලය. ඉතා කුඩා පරිමාවෙන් ඒවා නිපදවන්නට ද පුළුවන. හුණු ආශ්‍රිත සිමෙන්ති නිෂ්පාදන සඳහා යොදන පෝසොලේනා (pozzolana) ස්වාභාවික හෝ කෘත්‍රිම ඒවා විය හැක. පිලිකාමය සහ මිප්ලවලින් සැදි ඇති (opaline) ගඩොල් මෙයින් මුල් ගණයට වැටේ. එබඳු ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබෙනු විය හැකිය. කෘත්‍රිම අපද්‍රව්‍ය අතරින් ඉතාමත් බහුල ද්‍රව්‍යය පිලිස්සු මැටිය, දහඩියා අළු, වියළි කෙහෙල් කොළ හා උක්දඬු අළු ඉතා යහපත් පෝසොලේනා (pozzolana) ලක්ෂණ සහිත ද්‍රව්‍ය බව පෙනී ගොස් ඇත්තේය. කෘත්‍රිම පෝසොලේනා සැදීමේදී භාවිතා වන ඉතාමත් සරල උපක්‍රමය නම් අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට මැටි රත්කර, හුණු මුසුකර කුඩු කිරීමය. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිය සංවර්ධනයෝජනා ක්‍රම සමග ඉතා මැනවින් ගැලපෙන්නකි.

2. බ්ලොක් ගඩොල් (මැටි)

සිමෙන්ති හෝ හුණු මිශ්‍රිත මැටිවලින් බ්ලොක් ගඩොල් සැදීම

සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතින් ක්‍රියාකාරීතාවයන් තුළින් නිපදවා ඇත. (ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය හා ජාතික නිරායු අධිකාරිය විසින්). එකක මිල රු. 7500 ක් පමණ වේ. පිළිස්සු ගල්වල ශක්තිය (2.8 N mm^2) බොහොමයක් තනි මහල් නිවෙස් සඳහා සෑහේ. එහෙත්, ගල් සැදීමට ගන්නා මැටි තෝරා ගැනීම පුළුල්වීමෙන් කළ යුත්තකි.

3. සිමෙන්ති මිශ්‍රණ

ඉතා සියුම් ලෙස කුඩුකර ගත් ද්‍රව්‍ය සමග මුසු කර ගත් පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති මිශ්‍රණ ලෙස හැඳින්වේ. මෙවැනි සිමෙන්ති මිශ්‍රණ ලෝකයේ බොහෝ රටවල නිපදවෙයි. වැලි, දහඩියා අළු, යබොර හා කාර්මික අපද්‍රව්‍ය යනාදිය සිමෙන්තිවලට මිශ්‍ර කරන ද්‍රව්‍ය අතරට වැටේ. මේ පිළිබඳ පර්යේෂණ දැන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් කර ගෙන යනු ලැබේ.

4. බාල වර්ගවල දැව

සුදුසු අයුරින් පදම් කර, රසායනික ද්‍රව්‍ය ගැල්වීමෙන් බාල ලී වර්ගවල ආයුෂ කාලය දිවිය කර ගැනීමේ පර්යේෂණ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් අරඹා ඇත. වාෂ්පයෙන් පදම් කිරීමේදී අවශ්‍ය වන ඉන්ධන භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා ඉරු එළියෙන් වැඩ කරන පෝරණුවක්ද දැන් සකස් කර ගෙන තිබේ.

5. කොහුවලින් පියසි ආවරණ

කොහු සමග මුසු කළ සිමෙන්තිවලින් පියසි ආවරණ සඳහා භාවිතා කළ හැකි තහඩු සැදීමේ ක්‍රමය ඉතා සාර්වකලෙස දේශීය ආයතන ගණනාවක් විසින් වැඩි දියුණු කර ඇත. (ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය). තහඩුවල ලාබදයකත්වය රු. පවත්නේ නිෂ්පාදන උපක්‍රමය මතය. මේ තහඩුද ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති තහඩු මෙන්ම පියසි සඳහා යොදා ගන්නට පුළුවන. ගොඩනැගිලි බිමේදීම අනෙකුත් ආධාර මත් තහඩු සාදා ගැනීම ඒවායේ පිරිවැය අඩු කරවන උපක්‍රමයක් වේ.

වගාවට අත දෙන මි මැස්සෝ.*

රොකන් එච්, වික්‍රමසිංහ

'රෝමනාරා' 41 පළවර රෝඩ්, කොළඹ 7.

විජයගේ කාලයට පෙර සිටම මෙරට සිටි සාදේශිකයන්ට සහ ඉන් පසුව ආ පදිංචිකරුවන්ට ද මිමැස්සන්ගෙන් ප්‍රයෝජන සැලසුණු බව පැහැදිලිය. මි පැණි පවුන්ට පෝෂණය සැපයූ අගනා ආහාරයක් වූ බැවිනි. පැණි සපයන මැසි වර්ග කිහිපයක් ලංකාවේ දක්නට ලැබේ. රංචුවකින් රාත්තල් බාගයක් පමණ පැණි සපයන දඬුවල මැස්සෝ හා ගැලුම් 10 - 20 දක්වා විශාල ප්‍රමාණයක පැණි සහිත වද සෑදූ බඹර මැස්සෝ ඊට නිදසුනි. එහෙත් ඇති කිරීම සඳහා මි මැස්සන් කෙරේ වැඩි උනන්දුවක් දක්වනුයේ මි පැණිවල උසස් තත්ත්වය (ගුණය) හා ඇති කිරීමේ පහසුව, යන මේ ප්‍රධාන දෙකරණ මතය.

ඉතා පැරණි යුගයේදී සාමාන්‍යයෙන් කරන ලද්දේ කැලැව්ල තිබූ මි වද (පැණි හා පිළවුන් සමග) හපා සුපුසු කර ඉවි කොටස ඉවතට දැමීමයි. මෙයින් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් ලැබුණද එය ඉතාමත් විනාශකාරී පිළිවෙතක් විය. ඊළඟ වදය සොයා ගන්නට ලැබෙන්නේ අහම්බෙන් බැවිනි. පසුව, මි මැස්සන් ඇති කිරීම සඳහා කළ ගෙඩි හා විතා වන්නට විය. අල්ලා ගත් මි මැසි රංචුවක් කළය තුළට දමන ලදී. සමහර විට සුදුසු තැනක කළ ගෙඩියක් තැබූ විට මි මැස්සෝ නිතැතිත්ම එහි පදිංචියට ආහ. සතුන්ගෙන් හා පැණි සොරකම් කරන අයගෙන් ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා කළගෙඩි තබන ලද්දේ නිවෙස් අසලය. මෙම මිවලින් ලබාගත් වද මිරිකා පැණි ලබා ගන්නා ලදී.

දැන් හා විතා වන මි මැසි පෙට්ටිය (ලියෙන් තැබූ) ඉවත් කළ හැකි ලි රාමුවලින් යුක්තය. මි මැස්සන් වද බදින්නේ ඒවා තුළය. මුලින්ම මෙම රාමුවල ප්‍රමාණය හා හැඩය ආදිය සකස් වූයේ යුරෝපයේ හා උතුරු ඇමෙරිකාවේ මි මැසි පෙට්ටි අනුව වුවද පසුව, ශ්‍රී ලංකා මි මැස්සන්ගේ ප්‍රමාණය හා වර්ගය ආදියට ගැලපෙන සේ එම රාමු වැඩි දියුණු කර තිබේ. ඉවත් කළ හැකි රාමු නිසා මි මැස්සන් පාලනය පහසු වේ. වදය සහිත රාමුව වේගයෙන් කරකවා වදයට තුවාල සිදු නොවන සේ පැණි ලබා ගෙන යාමට පැණි පිරිවීම විශිෂ්ට නිසි වදය සහිත රාමුව ආපසු පෙට්ටියට දමන්නට පුළුවන.

මි මැස්සන් ඇති කිරීමේ ප්‍රයෝජන

මි මැසි පාලනය ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයෙන් ගැලපෙන්නකි. මි පැණි පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් වනු පමණක් නොව අමතර ආදායම් මාර්ගයක්ද වෙයි. එමගින් පරිසර දූෂණයක් සිදු නොවේ. එපමණක් නොව, අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මෙන්ම, මි මැසි පාලනය පිළිබඳව යම් තරමක හෝ පුරුද්දක් ඇති අයවලුන් ද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් සොයා ගන්නට පුළුවන. පළතුරු හා අනෙක් වගාවල පරාග පෝෂණය කිරීමේ ලා මි මැසි පාලනයෙන් ඉටුවන වැදගත් සේවය අත් රටවල අය මැනවින් අවබෝධ කර ගෙන සිටිති. ඇත්ත වශයෙන්ම මි මැස්සන් ඇති කරන අය වගාවන්හි මල් හට ගන්නා කාලයේදී එම මල්වල පරාග පෝෂණය කරනු සඳහා තම මි මැසි පෙට්ටි ගොවියන්ට කුලියට දී අමතර ආදායමක්ද ලබා ගනිති. එබඳු කටයුතු බොහෝ විට සිදු වනුයේ දෙපාර්ශ්වයම ආරක්ෂා කෙරෙන වගන්හි ඇතුළත් නිත්‍යානුකූල ගිවිසුම් මතය. මි මැසි පාලනයෙන් (පරාග පෝෂණය මගින්) බෝග වගාවන්හි අස්වනු වැඩි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ ගැන බලන විට, රජය විසින් සහනදායී පදනමක් යටතේ නොකඩවා මි මැසි පෙට්ටි සැපයීමේ ක්‍රමයක් දියත් කිරීම මැනවැඩි හැරේ.

මි පැණි, රජ මැස්සියන්ගේ ආහාර, පරාග හා මි විෂ යන මේවා පෝෂණ (ශක්ති ජනක) හා ඖෂධීය කටයුතු සඳහා මෙරට මෙන්ම පිටරටවලද බහුල ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනු ලැබේ.

විශ්වාසදායක ලෙස මි මැසි රංචු, පෙට්ටි හා අන් උපකරණ ආදිය සැපයීම මි මැසි පාලනය මගින් ව්‍යාපාරිකයන්ට ආදායම් ලබා ගත හැකි තරම් මාර්ගයන් වේ. මෙම ද්‍රව්‍ය සැපයුම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මි මැස්සන් ඇති කරන්නන්ගේ සංගමය වෙත යොමු කෙරෙන විමසුම් මහාරාශියකින් හෙළිවනුයේ ඉහත සඳහන් ආකාරයේ ව්‍යාපාරයකට ඉතා හොඳ ඉඩකඩ පවත්නා බවය.

අවශ්‍ය මූලික ද්‍රව්‍ය (ශස්වල් හැර)

1. මි මැස්සෝ

පළපුරුදු අයකු ලවා මි මැස්සන් රංචුවක් අල්ලා ගන්නට හෝ මි මැසි පෙට්ටියකින් බෝවන රංචුවක් ලබා ගන්නට හෝ පුළුවන. මිලදී ගන්නේ නම් ඒ සඳහා රු. 75 - 100 ක් පමණ වැය වේ. විවිධ මි මැස්සන් ගති ගුණ අතින් වෙනස් වන බව මෙහිදී සැලකිය යුත්තකි. ඇතැම් මි මැස්සෝ වැඩියෙන් පැණි සෑදති. ඇතැම්හු ඉක්මනින් ඇවිස්සී පහර දෙන සුලු වෙති. ලෙහෙසියෙන් කුඩු ගැසෙන ඇතැම් මි මැස්සෝද වෙත්.

2. මි මැසි පෙට්ටිය

මෙය සෑදිය යුත්තේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නියමිත ආකාරයටය. දැන් මි මැසි පෙට්ටියක මිළ ඉතා විශාල එකක් වන්නට පුළුවන. එබැවින්, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අඩු වැය ද්‍රව්‍ය යොදා පහසු මිලකින් මි මැසි පෙට්ටි සෑද ගැනීමේ උපක්‍රම පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ. කුහුඹුන්, වේයන් හා අන් සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වන අන්දමට මි මැසි පෙට්ටිය තැබිය යුතුය.

3. කපොළු ආරමභය

මි මැස්සන් පෙට්ටිය තුළ පැළ පදියම් වීමට පෙර අවස්ථාවේදී රජ මැස්සිය ඉන් පැන යාම වැළැක්වීම සඳහා මෙම ආරමභය හා විතා වේ. මෙය සාමාන්‍යයෙන් මිලට ගන්නා පෙට්ටිය සමග සැපයෙන්නකි.

4. මුහුණු ආරමභය හා අත්වැසුම්

මි මැස්සන් ඇති කරන බොහෝ දෙනා මේවා හා විතා නොකරති. එහෙත් එමගින් ආයු කිසියම් ආත්ම ශක්තියක් ලැබේ. හුරු පුරුදු වන තුරු මෙම උපකරණ පැළදීමෙන් තමන්ගේ කටයුතු නිසංසල්ල කරගෙන යාමට ඉඩ සැලසෙයි. දහඩිය ගඳ නිසා මි මැස්සන් ඇවිස්සීමට ඉඩ ඇති බැවින්, ආරක්ෂා ඇදුම් ඇඳීමද ප්‍රයෝජනවත්ය. මෙම ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ විස්තර මි මැසි පාලනය පිළිබඳව කටයුතු කරන ආප්ප නිලධාරීන්ගෙන් සපයා ගත හැක.

5. දුම්ගස්වන උපකරණය

මි මැසි පෙට්ටිය විවෘත කරන, හෝ මි මැස්සන් වෙත තැනකට ගෙන යාම ආදිය කළ යුතු අවස්ථා වලදී ඔවුන් සන්සුන් කරවීම සඳහා දුම්ගස්වන ප්‍රයෝජනවත් වේ.

මේවා මිලදී ගැනීමට හෝ අඩු වැයෙන් සාද ගැනීමට හෝ පුළුවන.

6. වද කරකවනය (සෙන්ට්‍රිපිසියම්)

නිකේන් හෝ මි මැසි පෙට්ටි කිහිපයක් පමණක් නම්, වද නොතලා පැණි ඉවත් කිරීමට හා විතා වන මෙම උපකරණය ඉල්ලා ගන්නට හැකිය. නැතහොත් රුපියල් හාර පන්සියයක වැයෙන් සුදුසු

*මෙම ලිපිය ජාතික වගා කළමණාකරණ ආයතනයේ දෙවැනි වෙළුමේ පළමුවෙනි කලාපයෙන් උපුටා සිංහල පරිවර්තනය කරන ලද්දකි. මුලින්ම පළවූයේ 1982 දී වුවද ලිපියේ අඩංගු කරුණු අදටත් ගැලපේ.

උපකරණයක් සාදා ගැනීම පුළුල් දුෂ්කර නොවේ.

7. රාජකාරි

මේ මාසි පාලනයට ඇදල තොරතුරු සපුරා කිරීමේ ලේඛන

8. අමතර දේවල්

රජ මාස්සිය සඳහා වූ විශේෂ කඩා පෙට්ටිය මෙවැන්නකි. එමෙන්ම ආහාර හින කාලපද්ධි දිය කළ සිති හෝ පැණි වැනි ද්‍රව්‍ය සැපයීමද අවශ්‍ය විය හැකිය.

පැණි

සිති දියර හෝ පැණි ආදිය සැපයූ විට, ඉන් කොටසක් මි මාස්සන් විසින් ද තුළ ගබඩා කරන්නට ඉඩ තිබෙන්නමුත්, සත්‍ය වශයෙන්ම මෙය 'පැණි' ලෙස හැඳින්විය යුතු නොවේ. පැළුට්ලින් ලැබෙන යුෂ සමගමල් පැණි මදක් මුදු කරගත් පැණි නොවන තරන් දියරයක්ද මි මාස්සන් විසින් සාදනු ලැබේ. රබර් ගස්වල (මල් පැණි නොවන) යුෂ වලින් ශ්‍රී ලංකාවේ මි මාස්සන් සාදන 'රබර් පැණි' මිට කදිම නිදසුනකි. අනෙක් පළාත්වලට වඩා රත්තපුරය වැනි තෙත් පෙදෙස්වල රබර් ගස්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක පැණි ලබාගන්නේ යයි විශ්වාස කෙරේ. අධික තෙතමනය හා වැඩි වාෂ්පීකරණය මිට හේතුව එන්නට ඉඩ ඇත.

සැබෑ මි පැණි නිපදවනුයේ මි මාස්සන් විසින් මල්වලින් ලබා ගන්නා පැණිවලිනි. එකම වර්ගයක ගස් (හෝ වැල්) වලින් ලැබෙන පැණි 'කේවල පැණි' යනුවෙන්ද විවිධ වර්ගවලින් ලැබෙන මිශ්‍ර පැණි 'බහු පැණි' යනුවෙන්ද හැඳින්වෙයි. මි පැණිවල තිබෙන පරාග පරික්ෂා කිරීමෙන් ඒ බර තහවුරු කර ගන්නට පුළුවන් වනු පමණක් නොව, ඇදල ගස් හෝ වැල් වර්ගය හඳුනා ගන්නට ද පුළුවන.

පරාග

මි මාස්සෝ තම ආහාර වශයෙන් මල් පැණි මෙන්ම පරාගද එකතු කරති. සුදුන්ද අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන ලැබෙනුයේ පරාගවලිනි. 'සත්‍ය වශයෙන්ම මි මාස්සන් මල්වලට යන්නේ පැණිවලට වඩා, පරාග සපයා ගනු විනිසය. පැණිවලට වඩා පරාග සපයන මල් වර්ගයකට ඉතා හොඳ නිදසුන පොල් මල්ය. මි රාජව බදින පොල් හා අනෙක් තාල වර්ගයේ ගස්වල මල්වලට ඇඳි එන මි මාසි සංඛ්‍යාව දෙස බලන විට එය ප්‍රදානයේ තවත් ආහාර සැපයුම් මාර්ගයක් වන බව පෙනේ.

මි මාස්සන් එන මල්

තමන්ට අවශ්‍ය පරාග, මල් පැණි හා අනෙක් යුෂ ලබා ගැනීම සඳහා ආවේක වශයෙන් හෝ වෙනත් අයුරින් ප්‍රයෝජනවත් ගස් වැල් මහා වාසියකට මි මාස්සෝ පැමිණෙති. මෙබඳු ගස් වැල් වර්ග සමහරක නම් පළමුවැනි වගුවේ සඳහන් වේ. මිශ්‍ර බෝග වශයෙන් වගා කෙරෙන පොල්, කෝටි හා ගම්මිරිස් වැනි ගස් වැල්වලින් මි මාස්සන්ටද ආහාර සැපයෙන බව වගුවෙන් පෙනේ. ඒ නිසා මි මාසි පාලනය මෙබඳු වගාවල තරන් විශ්වාසයක ආදායම් මාර්ගයක් සේ පවත්වා ගෙන යා හැකි බව පැහැදිලි වේ. (එතෙත් මෙහිදී ප්‍රමාණයට වඩා කාමිනාශක භාවිතා නොකළ යුතු බව සිති තබා ගත යුත්තකි). ඇතැම් විසිතුරු පැළුට් මෙන්ම, ආවේක ඇතින් වැදගත් කමක් නොසලකන නිදිකුම්බා වැනි ගස් වැල් පවා මි මාස්සන්ට ආහාර සපයන බව සිති තබා ගැනීම වටහේය.

පුෂ්ප දින දර්ශනය

පොල් වැනි ශාක හැර අන් බොහෝ ගස් වැල්වල අපුරුද්ද පුරාම මල් හට නොගනී. ඒවා මල් දරන්නේ නියත සෘතු වලදීය. මෙබඳු දින දර්ශනයක් පළමුවැනි සටහනේ දක්වා ඇත. මි මාස්සන් ආහාර සපයා ගනුයේ ඔවුන් වෙසෙන ස්ථානයේ සිට සැතපුම් 1/2 - 1 ක් අතර විෂ්කම්භයෙන් යුත් ප්‍රදේශයකිනි. මි මාසි පාලනයේදී මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. එබැවින්, රටේ කාමිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු ද සැලකිල්ලට ගනිමින් දිවයිනේ විවිධ කොටස්වලට ඇදල පුෂ්ප දින දර්ශන සකස් කර, නිතිපතා සංශෝධනය කරමින්,

ප්‍රයෝජනවත් ලෙස භාවිතා කළ හැකි තොරතුරු මාර්ගයක් ලෙස පවත්වා ගෙන යාම විශේෂයෙන් වැදගත්ය.

වාණිජ වගාවල මි මාසි පාලනය

වාණිජ වගා බිම් වල මි මාස්සන් ඇති කිරීමේදී සූදුන්ව බිමට ජලය සැපයීම අවශ්‍යය. එහෙත්, (වැඩි වැයක් දරන්නට සිදු වන නිසා) පුළුමනාවට වඩා සිති දියර දීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. නියත බිම් ප්‍රමාණයක් තුළ (අමතර ආහාර නොසපයා) නඩත්තු කළ හැකි මි මාසි පෙට්ටි ගණන තීරණය වනුයේ (වෙනස් විය හැකි) වර්ෂාපතන රටාව සහ ලබා ගත හැකි මල් පැණි හා පරාග ප්‍රමාණය අනුවය. උදාහරණයක් වශයෙන්, 'මල් පැණි සහිත කාලයේදී රබර් හෝ යුකලිප්ටස් අක්කරයක මි මාසි පෙට්ටි දුසිම දෙක තුනක් බැගින් පවත්වා ගෙන යා හැකි නමුදු එක් පොල් අක්කරයක නඩත්තු කළ හැකි මි මාසි පෙට්ටි ගණන තුනකට වැඩි නොවේ. නයිල් නදිය මත පාලේන පහුරුවල මි මාසි පෙට්ටි තබා දෙගම්බඩ පළතුරු හා අන් වගාවල මල් දරන කාලය අනුව එම පහුරු ගත දිනේ ඉහළට හා පහළට යාත්‍රා කරවන ලදැයි පැරසෙන විස්තරයෙන් පෙන්නුම් වන්නේ ආච්ඡිත් කාලයක පවත් ගොවිතැන හා මි මාසි පාලනය අතර පවත්නා සම්බන්ධතාව කිමක්දැයි මිනිසා විසින් දැන සිටි බවය.

තැනින් තැන ගෙන යන මි මාසි පෙට්ටි

අපුරුද්ද මුළුල්ලේම තනි වගාවක මි මාසි පෙට්ටි එකක් හෝ කිහිපයක් දිගින් දිගටම පවත්වා ගෙන යාමෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රයෝජන ඇතැයි, උඩරට පෙදෙස්වල සාමාන්‍යයෙන් එක මි මාසි පෙට්ටියකින් අපුරුද්දකට පැණි රාත්තල් 6 ක් පමණ ලබා ගත හැක. එහෙත් ඇතැම් විශේෂ තත්ත්වයන් යටතේ අපුරුද්දකට පැණි රාත්තල් 66 ක් පමණ ලබා ගත් බවට වාර්තා ඇත (දොරන්ත 1968). එසේ වුවද, වෘත්තීය පරිමාවෙන් මි මාසි පාලනය කිරීමේදී, එකිනෙක වගාවල මල් දරන කාලය අනුව (සමහර විට වර්ධක පෙට්ටි සියලුන්ම ගණනක්), මි මාසි පෙට්ටි මල් සහිත පෙදෙස්වලට රැගෙන ගොස් තැබීමෙන් ඉතා උසස් ප්‍රතිඵල අත්පත් කර ගනු ලැබේ. මේ අනුව, පුෂ්ප දින දර්ශනයේ සඳහන් පරිදි, අප්‍රේල් මාසයේදී රබර් වතු වලින් ඉවත් කෙරෙන මි මාසි පෙට්ටි මැයි මාසයේදී තල වගා බිම් වලට ගෙන යා යුතු වෙයි.

අපනයනය සඳහා විශාල වශයෙන් මි පැණි ලබා ගන්නට නම් ඉහත සඳහන් අන්දමේ වෘත්තීයය වියටර ගැනීම අවශ්‍යය.

මි පැණි හා මි ඉටි වෙළඳපල

ආහාර හා ඖෂධ කටයුතු සඳහා යොදන මි පැණි ශ්‍රී ලංකාව තුළ පහසුවෙන් අලෙවි කළ හැක. ලිඛ්‍ය ලෙස දැමීම හා බත්කි වැසි සඳහා අවශ්‍ය මි ඉටි (හා ඊට අයු මිලට බෙර ඉටි) ද එසේම විකිණිය හැකිය. එහෙත්, මි මාසි පාලනයේදී මි ඉටි අලෙවිය ලාබාල නොවන්නේ, නැවත වද සෑදීමට අවශ්‍ය ඉටි සාදා ගැනීම විනිස මි මාස්සන්ට මල් පැණි ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් පුළුමනා වන බැවිනි (මි මාස්සන් ඉටි සාදන්නේද මල් පැණි වලින්මය). මේ නිසා වදය කරකැවීමේ ක්‍රමයෙන් පැණි ඉවතට ගෙන, නැවත පිරවීම සඳහා හිස් මි වදය සහිත රාමුව ආපසු පෙට්ටියට දැමීම මි මාසි පාලනයට වාසිදායකය. පැණි අලෙවියට ඇදල තොරතුරු මි මාස්සන් ඇති කරන්නන්ගේ සංගමය විසින් සිය සාමාජිකයන්ට සපයනු ලැබේ. මි පැණි හා ඉටි වෙළෙඳෝද කොළඹ නගරයේ වෙති. කාලය, පැණිවල තත්ත්වය ආදි කරුණු අනුව මි පැණිවල මිල ගණන්ද වෙනස් වේ. වෙළඳ පලෙහි පිටරටින් ගෙන්වන මි පැණි ද අලෙවි කෙරේ. එහෙත්, ඒවායේ මිල ගණන් දේශීය පැණි වල මිලට වඩා ඉතා අධිකය.

ස්ථානාවිකා යොබ්‍ය සම්පන්න ආහාර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් පවත්නා බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ මි පැණි අපනයනයටද ඉඩකඩ ඇත්තේය. මේ සඳහා ස්ථිර ලෙස, නොකඩවා, උසස් තත්ත්වයේ මි පැණි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයෙන් පිටරට යැවීමේ

පුළුන්කම අපනයන කරුවා (හෝ අපනයන කණ්ඩායම) සතු විය යුතුය.

පිරිසිදු බර තහවුරු කෙරෙන විද්‍යාත්මක තත්ත්ව පාලන ප්‍රමිතීන්ට අමතරව, පැණි අපනයනය කරන රටෙහි පවත්නා අදාළ කොන්දේසිවලටද අපනයනය කෙරෙන මි පැණි අනුකූල විය යුතු වේ. මෙම කොන්දේසි ඉතා තදින් රටින් රටට වෙනස් විය හැකිය. මි පැණි අපනයනයට අදාළ වැඩි වියදම ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ලබා ගත හැකිය.

එහි ලිපිනය මෙසේය.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය,

රමාඩා රෙනෙසිසාන්ස් ගොඩනැගිල්ල,

115, සර් වින්තප්පලම් ඒ ගාඩනර් මාර්ග,

කොළඹ 2.

තත්ත්ව පාලනය

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිල්ලරට අලෙවි වන මි පැණිවලින් වැඩි කොටස, විද්‍යාත්මක තත්ත්ව පාලන විධිනට භාජනය කර නොමැත්තේය. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් මි පැණිවලට අදාළ ප්‍රමිතින් ප්‍රකාශයට පත්වූවා ඇතත්, ලේඛයක් හෝ වෙළඳ නාමයක් රහිතව, වසරකට බෝතල් කිහිපයක් බැගින් විකුණන නිෂ්පාදකයන් මහා රාශියක් සිටීම නිසා, එම ප්‍රමිතින් ක්‍රියාත්මක කිරීම අසීරු කරගන්නක් බවට පත්ව තිබේ. තමන් නොදන්නා පුද්ගලයන් විසින් සැපයෙන මි පැණි කුඩා තොග පිළිගැනීමට සුළු වෙළඳුන් පුරුදු වී සිටීම ප්‍රශ්නය තවදුරටත් බරපතල කරවනුසුලු සාධකයකි. තමන් ඉතා හොඳින් දන්නා, විශ්වාසය තැබිය හැකි අයගෙන් පමණක් මි පැණි මිලට ගැනීම මේ සඳහා ගත හැකි එක් ආරක්‍ෂාකාරී පියවරකි. ශ්‍රී ලංකා මි මැසි සංගමයට මේ සම්බන්ධයෙන් ආධාර වීමට පුළුවන.

දේශීය වශයෙන් අලෙවි කරන ඇතැම් මි පැණිබඳුන්වල වියලි වී හෝ ගම්මිරිස් ඇට දක්නා ලැබේ. ඒ වූ කලී මි පැණි කල් තබා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කෙරෙන සම්ප්‍රදායික පියවරකි.

විවිධ ලක්ෂණ අනුව, මි පැණි 'බාල' යයි වර්ග කරන්නට ඉඩ ඇතත්, පිරිසිදු මි පැණි වුවද 'හකුරු බැස' ලා පැහැයක් ගැනීමට ඉඩ තිබෙන බව සඳහන් කර ගැනීම සුදුසු වේ. ශ්‍රී ලාංකීය පාරිභෝගිකයන් වැඩි රාශියක් දක්වන්නේ දිශාරූ, පැහැදිලි පැණිවලටය. එහෙත් බොහෝ විට, විශේෂයෙන් විදේශීය ගැණුම්කරුවන් හකුරු බැසුණු පැණි ඉල්ලා සිටිනු දක්නට ලැබේ. යම් තම් රත් කිරීමෙන් (උදා: උණු දිය බඳුනක මි පැණි බෝතලය බහා තැබීමෙන්,) හකුරු බැස තිබෙන පැණි ලෙහෙසියෙන් දියර කරගත හැකිය.

අපනයනය කරනු ලබන පැණිවල පෙනුම, රසය ආදී ලක්ෂණ පරීක්ෂාවට අමතරව, සියුම් රසායනාගාර පරීක්ෂණවලටද ඒවා භාජනය කළ යුතුවේ. (උදා: තෙතමන ප්‍රමාණය, බයස්ටාස් ක්‍රියාකාරීත්වය, ගබ්බොක්සිමිතයිල් පර්ෆරමල් ප්‍රමාණය ආදිය.) මි පැණි පිටරට යවන රටවලින් අවුරුදු පතා පැණි ටොන් දහස් ගණනක් අපනයනය කරන්නට ඉඩ ඇත්තේය. ඉදිරිපත් කළ පැණි සැම්පල සර්වප්‍රකාරයෙන්ම තොගයේ ලක්ෂණවලට අනුකූල විය යුතු බව මෙහිලා අවධානයක් කෙරේ.

මි මැස්සන්ට වැළඳෙන රෝග නිසා අන් රටවල මි පැණි නිපැයුමට වරින් වර බාධා පැමිණේ. එබැවින් මෙබඳු රෝගාබාධ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා පිටරටවලින් මි මැස්සන්ගෙන් වීම පුළුවන් තරම් සීමා කළ යුතු වේ.

රෝගාබාධ

මි මැස්සන්ට වැළඳෙන රෝග ගණනාවක් ඇතත් සාමාන්‍යයෙන් මෙරට මි මැස්සෝ නිරෝගී උන් වෙත් (මෝර්ස් 1978). මි මැසි

පෙට්ටිවල කුහුඹුරන්, කටුස්සන්, මකුළුවන් හා තුණන් වැනි 'ආගන්තුකයින්' ඉදහිට දක්නා ලැබේ (ගුණවර්ධන 1975). එහෙත්, විශාලතම ප්‍රශ්නය වනුයේ 'ඉටි ඉටියා' ය. සතිපතා මි මැසි පෙට්ටියේ පතුල අද්ධ පටිකු කිරීම මෙම උවදුර මග හැර ගැනීමේ එක් උපායකි.

තුනි

මේ ලිපිය සකස් කිරීමේදී කොළඹ කෞතුකාගාරයේ ආචාර්ය තෙල්මා ගුණවර්ධන මහත්මිය හා කාමිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කේ. එච්. දයාරත්න හා එස් සිරිවර්ධන යන මහතුන්ගෙන් හා ශ්‍රී ලංකා මි මැසි සංගමයේ සාමාජිකයන්ගෙන්ද අභාවප්‍රාප්ත ඩී. සී. ආර්. ගුණවර්ධන සහ ක්‍රෝයිසර් යන මහතුන්ගෙන්ද ලද සහාය ස්තූති පූර්වකව සඳහන් කෙරේ.

රතුර 1

මල් පැණි, මල් පරාග හෝ දියර ලබා ගැනීම සඳහා මි මැස්සන් පැමිණෙන ආවර්ත වශයෙන් හෝ අන් අයුරින් වැදගත් ගස්වැල් සමහරක් (සාමාන්‍යයෙන් මි මැස්සෙකු එක් වරකට පැණි හෝ පරාග ලබා ගන්නේ එකම වර්ගයේ ගස්වල මල්වලිනි.)

අඹරුල්ල	ඉරිතු	පාර්ස්ලි
අලිගැටපේර	ජම්බු	පැණිපාටි
උණ	කතුරු මුරුංගා	රටකපු
බණ්ඩක්කා	කිතුල්	පෙයාර්ස්
බෙලි	කුඹුක්	ගම්මිරිස්
වම්බදු	දෙති	කෙසෙල්ගෙඩි
බ්‍රොකොලි ගෝවා	අඹ	වට්ටක්කා
බුසල් ස්පුට්ස්	මැංගුස්	රාබු
ගෝවා	මාර	රඹුරන්
කරවේ	මි	රේප්
කැරට්	මිල්ල	රාස්බෙරි
කපු	මිංටි	රබර්
මල්ගෝවා	මොර	සැප්පල්වර්
පොල්	මුකුණුවැන්න	සෝගම්
කෝපි	මුං	සෝයා බෝංචි
කොත්තමල්ලි	මුරුංගා	ස්ට්‍රෝබෙරි
කපු	අබ	සූරියකාන්ත
පිපිස්සා	නා	සියඹලා
උළුනාල්	නැදුන්	තේ
යුකැලිප්ටස්	නෙල්ලි	තේක්ක
රටඇදුරු	ලුණු	තම්පලා
තල	දොඩම්	තිප්පිලි
ගොරකා	තල්	තක්කාලි
පේර	ගස්ලබු	වෙරළ

රතුර 2

බාක හා වාසළ විශේෂ සහිත කල්පිත ප්‍රදේශයකට අදාළ පුෂ්ප දින දර්ශනය

ජනවාරි	පෙබ.	මාර්.	අප්‍රේ.	මැයි	ජූනි
පොල් අඹ	පොල් අඹ රබර් තේක්ක	පොල් රබර්	පොල් තල	පොල් තල කෝපි දෙති දොඩම්	පොල් මුරුංගා
ජූලි	අගෝ.	සැප්.	ඔක්.	නොවැ.	දෙසැ.
පොල් මුරුංගා	පොල් මුරුංගා	පොල් දෙති දොඩම්	පොල් දෙති දොඩම් කෝපි	පොල් ඉරිතු කපු කෝපි	පොල් කෝපි
තේක්ක					

පාරිසරික ගොවිතැන

8. කේ. උපරංශ
ගන්නෝරා
ඉරානලා

කාර්මික විප්ලවය, නවීන විද්‍යාවේ පර්යේෂණ හා සොයා ගැනීම්, බටහිර ආර්ථික විද්‍යාවේ විකාශනය සහ මේවා අනුරූප ද්‍රව්‍ය ගණනක් ඒ ඒ රටවලට ආවේණිකව පැතිරී යාම හේතුකාරක වන බව පෙනී යයි. එහෙත් ආර්ථිකයේ වැඩි වීමේ වේගයට අනුකූලව ආහාර නිෂ්පාදනය නොවන බවට මැලිකයන් ඉදිරිපත් කළ මතය තරමක් දුරට හෝ ආහාර නිෂ්පාදන වේගය වැඩි කිරීමේ නව ක්‍රම සෙවීමට තුඩු දෙන්නට ඇත. මේ සියල්ලටම වඩා, මිනිස් කම්මනොට මුදල් ඉපයීමට නොහොත් ලාභය උපරිම මට්ටමට ගෙන ඒමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ආර්ථික න්‍යාය කෘෂි තාක්ෂණය වෙනස් කිරීමට හේතු වූ බව පෙනේ.

කාර්මික නිෂ්පාදනවලදී යෙදවුම්, නිපැයුම්, ඉල්ලුම හා සැපයුම යොදාගත හැක. තාක්ෂණ කළමනාකරණය යුගය සහ ලාභය මත පදනම් වී ඇත. මෙහි කළමනාකරණය සහ යුගය හැර අන් සියල්ලම ගොතී කිය. ජීවය (මිනිසා) සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේදී සහ යුග උපයෝගීතාවයේදී, එහි ක්‍රමය කෘෂිකර්මයේදී සහ සත්ත්ව පාලනයේදී ද යොදා ගැනීමට මෙය යොදා ගත හැක. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ නවීන යන්ත්‍ර සූත්‍ර, රසායනික පොහොර සහ පොහොර සංයෝග, කෘමිනාශක, දිලීරනාශක, වල් නාශක සහ යන්ත්‍ර සූත්‍රවලට ගැලපෙන ශක්‍ය ක්‍රම බිහිවීමය. මේ සියල්ලම බිහි වූයේ සංවර්ධිත රටවලය. ඒවා සියල්ලම පිහිටා ඇත්තේ සමූහානුකූල කලාපයේය. ඒවායේ පවතින දේශගුණය, කාලගුණය, පස හා මිනිස් ආහාර රටාවට එම ක්‍රම ගැලපුණත් ඒ සියල්ල ඒ අයුරින් ලංකාවට වැනි සර්ව කලාපීය රටවලට ගැලපේද යනු ප්‍රමාදව හෝ අප විසින් සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතුය. එය දැනට පසෙක තබා, දියුණු යැයි පිළිගත් එම ක්‍රමවල ආදිනව ස්වල්පයක් සැලකිල්ලට හාස්තය කරමු. පළමුව අප පොහොර භාවිතය ගැන සාකච්ඡා කරමු.

පැලැව්කඩ වැඩිමට ප්‍රධාන වශයෙන් ජීවත්වන, ප්‍රකාශය සහ යටිතල (N, P, K.) යන ධාතු තුනේ ඉතා අල්ප වශයෙන් වූවකි. යකඩ, තුත්තනාගම් හා මොලිබ්ඩිනම් ආදී අංශු මාත්‍ර මූලධාතු දහයක් සහ කාබනික සංයෝග ද අවශ්‍ය බව නවීන විද්‍යා පර්යේෂණ අනුව සොයාගෙන තිබේ. ඉදිරියේදී මෙම අවශ්‍යතාවන් මෙයටත් වඩා පුළුල් විය හැකි බව සොයා ගැනීමට ඉඩ තිබේ. තත්ත්වය මෙසේ වුවත් බොහෝ පර්යේෂණ පවත්වා තිබෙන්නේ ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය තුන පිළිබඳවය. කලාතුරකින්, ප්‍රශ්න හා නිෂ්පාදන ගැටලු මතුවූ අවස්ථාවල වෙනත් මූලධාතුන්ගේ උානතා සොයා ගෙන ඇත. පර්යේෂණ මගින් ඒ ඒ පසට සුදුසු, බෝගයට සුදුසු, ප්‍රමාණයන් හා සංයෝග නිර්ණය කොට ඇත. ලංකාවේ වී ගොවිතැනේදී එය හොඳින් පැහැදිලි වේ. මේ නිර්දේශ වැරදි සංකල්ප සහ සාර්ථක පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල නිසා යැයි ප්‍රකාශ කිරීම අදවන තෙක් නිරවද්‍යයි සිතිය හැකිය. පසක ඇති අංශු මාත්‍ර මූලධාතු සහ කාබනික සංයෝග නොසලකා ප්‍රධාන මූලධාතු තුන පමණක් සලකා නිර්දේශයන් කිරීම එයට එක් කරුණකි. අනෙක, බොහෝ පර්යේෂණ පවත්වන්නේ ස්වභාවික පසේ නොව කෘත්‍රිම වශයෙන් වෙනස් වූ පර්යේෂණ ගොවිපලවලය. මෙසේ වැරදි සහගත නිර්දේශ භාවිතා කිරීමේදී පසේ ඇති අංශු මාත්‍ර මූලධාතුවල සහ කාබනික සංයෝග වල උානතා ඇති වේ. උානතා පවතිද්දී ජීවත්වන, ප්‍රකාශය හා යටිතල යෙදීමෙන් පසේ පැළෑටි ආහාරවල හෙවත් බෝගවලට උාගත හැකි මූලධාතුවල සමබරතාව විනාශ වේ. මේ නිසා බෝග දුර්වල වේ. පැළෑටි ආහාර අසමබර, අවස්ථාවලදී ජීවත්වනවලින් යහපතක් වෙනුවට

විනාශයක් සිදුවේ. මෙම පොහොර සංයෝග භාවිතයේ අනර්ථකාරී බව පෙන්වීමට හොඳ නිදසුනකි; පරිසර දූෂණය. දුර්වල බෝග ලෙහෙසියෙන් කෘමි හානි සහ රෝගවලට ලක්වේ. කෘමි හානිය වැළැක්වීමට කෘමිනාශකය යෙදූ විට හානිකර කෘමියා මෙන්ම හිතකර කෘමින්ද අනෙක් සියලුම කෘමින්ද වෙනත් හිතකර ජීවීන්ද විනාශ වී ජෛව තුලනාත්මක බව විනාශ වේ. දිලීර හා වල් නාශක වලින් ද මෙය සිදුවේ. ජෛව තුලනාත්මක භාවය විනාශ වෙමින් තාවකාලිකව කෘමි මර්දනයක් කළත් පසුව එය වීර්ධ හා මහා පරිමාණයෙන් සිදුවේ. පැළෑටි ආහාරවල ඇති වන අසමබරතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වීමට හොඳ නිදසුනකි. පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අද පවතින වී අස්වැන්න. නව වී වර්ගවලින් (හොඳ කාලගුණයක් පවතින) පොලොන්නරුව වැනි සියලු පහසුකම් හා හොඳ පසක් ඇති ප්‍රදේශයකින් අක්කරයකට වී බුසල් දෙසියකට වඩා අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය. එහෙත් දැනට එහි අස්වැන්න අක්කරයකට බුසල් සියයක් පමණය. ඒ සියයට පහතක පමණ අඩු වීමකි.

ලාභ වැඩිකර ගැනීමට කෘෂි යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිපදවීම සහ භාවිතයත් ඒවාට ගැලපෙන අන්දමින් බෝග අතිරේකයත්, මිශ්‍ර බෝග වෙනුවට ඒක බෝග වගාවත් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් කෘෂි ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණය විය. මෙම කෘෂි තාක්ෂණය, කෘෂි රසායනික හා පොහොර යෙදීම දියුණු හා සාමාන්‍ය කෘෂිකර්මය වශයෙන් දියුණු හා දියුණු වන රටවල් විසින් පිළිගනු ලැබේ. පාරම්පරික කෘෂි තාක්ෂණය, පහත් හා ගන්නාගතික ක්‍රම වශයෙන් පහත් කොට සැලකෙයි. ඒවායින් ගොවීන් මුදු ගෙන නවීන ක්‍රමවලින් වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමට නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති ඇති විය. මහත් පරිශ්‍රමයකින් බොහෝ දුරට අපේක්ෂිත පරිවර්තනය සිදු විය. ඉන්ධන භාවිතයද ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඉහළ නැගුණි. ඒ බව පහත දැක්වෙන වක්‍රයෙන් පැහැදිලි වේ.

මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ගොවිපලක ශක්ති අයවැය (වසර 1976)

යෙදවුම් ඒකක	නිපැයුම් ඒකක
ඉන්ධන (දර, තෙල් හා වීදුලිය) 122.2	ආහාර බෝග 84.4
පොහොර 83.5	පළතුරු හා එළවළු 3.2
යන්ත්‍ර සූත්‍ර 103.3	සත්ව නිෂ්පාදන 80.6
රසායනික ද්‍රව්‍ය 8.5	මුළු ගණන 168.2
ගොඩනැගිලි 22.8	
ප්‍රවාහන සේවා 16.3	
පිටින් ගන්නා ලද සත්වාහාර 53.2	
මුළු ගණන 414.1	
යෙදවුම්, නිපැයුම්, අනුපාතය -	168.2 = 0.4 = 40%

414.1

මෙම අනුපාතය අප්‍රිකාවේ මිනිසා සතුන් යොදා ගැනීමේදී, ධාන්‍ය වාගාවේදී 18.5 ක් වන අතර අනෙක් බෝග සඳහා 29.5 වේ. (ක්ලාක් සහ හැස්ට්ස් 1970).

මෙම ක්‍රම පළමුවෙන් පටන්ගත් රටවල අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන් දෘෂ්මාන වීමට පටන් ගැනිණ. අක්කර දහය ගණනින් නිසරුවීම ආරම්භ විය. අනාගත අත්තරාව අතලොස්සක් විසින් දක්නා ලද නමුදු, ඔවුන් උම්මත්තකයන් ලෙස හඟවනු ලැබිණ. ඒ

සමහර අන්තරායකාරී තත්ත්වය වර්ධනය විය. කෘෂිකර්මයද මහා පරිමාණයෙන් පරිසර දූෂණයට පත්විණි. පරිසර දූෂණය පාවිච්ඡියේ පීඩයට තර්ජනයක් වන බව පවතී. ගැතිම සහ නවීන තාක්ෂණයේ භාවිතය හා කෙටි කාලීන බව තේරුම් ගැනීම නිසා විද්වතුන්, පරිසරවේදීන් හා කෘෂි විද්‍යාඥයින්ගේ අර්ථාන්තර කෘෂිකර්මය දෙසට නැඹුරුවිණි. විකල්ප කෘෂි තාක්ෂණයන් සෙවීමට හා වර්ධනය කිරීමට ප්‍රවෘත්ති ලෙස සිටියහ. නොයෙක් නම් වලින් විකල්ප ඉදිරිපත් කළහ. කාබනික ගොවිතැන, ජෛව ගතික ගොවිතැන (biodynamic) ස්වාභාවික, කෘෂි වන වගාව, බලශක්ති ගොවිතැන, යථා ජීව (Sustainable) ගොවිතැන ඉන් සමහරකි. මෙම ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයන්, සංවිධාන, හා ආයතන සමග අත්වැල් බැඳ ගන්නා සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතී. ඒ පිළිබඳ හැඟීම හා අර්ථාන්තර වේගයෙන් වර්ධනය වේ. මේ නිසාම අපරිදිග රටවල 'සෞඛ්‍ය ආහාර' (health food) නිෂ්පාදනය හා අලෙවිය ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. මේ විකල්ප පිළිබඳ පොත පතද දැන් පළවේ. මේ අනුසාරයෙන්, එම විද්‍යාඥයෝ සහ පරිසරවේදීන්ද ආයතනද ප්‍රධාන අරමුණු තුනක් ඉටුකර ගැනීමට යුතුකම වෙතී. පළමුවැන්න - පරිසරය, ඒ කියන්නේ, ගස්වැල් හා සතුන්ට ජීවත්විය හැකි වස විෂේෂ තොර පසක් ජලයක් හා වායුගෝලයක් මිනිසාට පවත්වා ගැනීමය. දෙවැන්න - නවීන කෘෂි තාක්ෂණය නිසා විනාශ වී ගිය කෘෂි ඉඩම් යථා තත්ත්වයට පත්කර ගෙන දිසිකාලීනව අපුරුද්දක් අපුරුද්දක් පාසා භූමියේ අස්වැන්න වැඩිවන කෘෂි තාක්ෂණයක් යොදවා ගැනීමය. තුන්වැන්න - ඉහත කී අරමුණු ඉටු කරගත හැකි, ක්‍රම හා විධි ප්‍රචාරය කළ හැකි සහ ජාතික මට්ටමේ පාවිච්ඡි තලයේ පීඩා ඇරඹෙන කර්මයක් ගැනීමය. බොහෝ රටවල් සහ ප්‍රදේශ නවීන විනාශකාරී තාක්ෂණයන්ට ඇබ්බැහිවී ඇති හෙයින් එය ලෙහෙසි පහසු නොවන අතර එබඳු භානිකර නොවන තාක්ෂණයන් සොයා ගැනීමද අපහසුය.

පර්යේෂණ මගින් විකල්ප සෙවීමට දිරිස කාලයක් ගතවේ. මේ නිසා සමහර විශේෂඥයින්ගේ මතය වන්නේ අපුරුද්ද හස්තයෙන් අත්දැකීම සහිත දිරිස ඉතිහාසයක් ඇති රටවල්වල තවමත් විනාශ නොවී පැවතෙන ක්‍රම ඒකරාශීකරණයෙන් තොරව තාක්ෂණයන් වෙන් වෙන් යොදා ගැනීමෙන් මනා විසඳුම සොයා ගත හැකි බවයි. අපුරුද්ද හස්තයෙන් පත්සියයකට වැඩි කාලයක් කෘෂිකර්මයෙන් පෝෂණය ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවේදී එබඳු ක්‍රම බොහෝය. ඒවා තවමත් අප අතර ජීවත්වන වස්තූන් ගොවිතැන තුනෙන් සහ වඩාත් පිටිසර ප්‍රදේශවල ගොවීන්ගෙන් උගත හැක. එසේ ලබා ගන්නා කරුණු එක්කොට සිතන කළ 'පුරාණ ලංකාවේ කෘෂි නිෂ්පාදනය පරිසර පෝෂණය තුළින් දිරිස කාලීනව පවත්වාගෙන ඇත' යන නිගමනයට බැසීමට පුළුවනැයි සිතේ.

එදා කෘෂිකර්මය පරිසරය, සමාජය, ආගම හා රාජ්‍යයන්ගේ එකිනෙකට බැඳී පද්ධතියක උප පද්ධතියක් මිස අද මෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් පමණක් නොවන බව විශේෂයෙන් දැනගත හැකි වේ. එදා පැවති හේන් ගොවිතැන අද මෙන් විනාශකාරී නොවූ අතර වර්තමානයේ යෝග්‍ය ක්‍රමයකැයි විද්‍යා දත්ත කෘෂි වන වගා ක්‍රමයකි. ලොකු ගස් කපා පුළුස්සා නැත. කර ඇත්තේ බෝග වලට අවශ්‍ය තරම් ආලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා පහතින් තිබූ ගස්වැල් හා අතු ඉවත් කිරීමය. 'කැළෑ එළි කරනවා', කැතිගානවා යන වචන භාවිතයෙන් ඒ වග වටහා ගත හැක. එමෙන්ම, කාලයට අනුව ගොවිතැන් කිරීම නොහොත් කල් යල් බලා ගොවිතැන් කිරීම, පස සැකසීම, බෝග වගා රටාව, මිශ්‍ර බෝග වගාව ආදිය තුළ උසස් භූමි කළමනාකරණයක්, පස සහ පසේ සාරවත්වය පවත්වා ගැනීමක් හා මනා ජල සංරක්ෂණයක් පැවතී බව පැහැදිලිව පෙනේ.

යට සඳහන් පරිදි බලන විට දිරිස කෘෂි ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල්ව තිබූ ක්‍රම නව කෘෂි විද්‍යාඥයන් මච්ඡිත කරනු ඇත.

අතින් ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්මයේ තිබූ ගුණාංග නම් උචිත භූමි භාවිතය තුළින් පරිසර පද්ධතිය (eco - system) පවත්වා ගැනීම, විධිමත් ජල කළමනාකරණය (water management), ප්‍රශස්ත මට්ටමින් ස්වාභාවික වන සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම, පැළෑටි ආහාර ප්‍රතිපත්තිකාරව භාවිතය සහ යෝග්‍ය ශෂ්‍ය ක්‍රම උපයෝගිතාව, වේ. දේශගුණික හා කාලගුණික විපර්යාසයන් හේතු කොට ගෙන ඇති වන බෝගවලට හානිදයක කෘෂි වර්ගයන් වැඩිවන විට, කෙමිමල් ආදේශ කරන ලද යාන්ත්‍රික ක්‍රම, ගස්වැල්වල කොළ පොතු ආදී පීඩා රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් හා ශෂ්‍ය ක්‍රම මගින් එම හානිදයක කෘෂිමත් සංඛ්‍යාව පාලනය කොට ඇත.

මධ්‍යම කළකරයෙන් පවත්ගෙන විකිණෙන ගංගා පද්ධතිය වියළි කලාපයට අපුරුද්ද පුරාම ජලය සපයයි. එක් කුඩා වැවකින් උතුරා යන ජලය හා කුඹුරුවලින් කාන්දුවන ජලය පහතින් ඇති තරන් වැවකට වශයෙන් පත්වී එක දිනට වැව් මාලාවක් සෑදේ. මේ ක්‍රමය ජලය රැස්කිරීම ඉටු කරනු (සංරක්ෂණය) මෙන්ම පස සෝදා ගෑමද වළක්වයි. භූගත ජල තත්ත්වයද දියුණු කරයි. තෙත් කලාපයේ සහ වනාන්තර ද වම්බරේ ලැබෙන ජලය පසට උරා ගැනීමට සලස්වා රඳවාගෙන වැව් මෙන් ගොවිතැන්ට ජලය සපයයි. ජනප්‍රවාදය මෙම කැළැව් 'පොළොව යට ඇති වැව්' වශයෙන් හඳුන්වයි.

හේන්වලින් සහ කැළයෙන් සෝදගෙන එන පස් සහ පැළෑටි ආහාර පළමු වැඩේද, ඉන්පසු සෝදා ගත පස් ආදිය එයට පහතින් ඇති වැව්වලද රැඳේ. වාර්ෂිකව කට්ටි කැපීමෙන් මෙම පොහොර සහිත පස අනුක්‍රමයෙන් වගා බිමට ලැබේ. මේ මගින් කුඹුරු වල සාරවත් බව රඳවා ගැනීමට ඉවහල් වේ. ලියදි පද්ධති පස සංරක්ෂණය උපරිම මට්ටමකින් පවත්වා ගනී. අපුරුද්ද හස්තයෙන් පැරණි වැව් ගොඩ නොවී තිබීම එය පැහැදිලිව විදහාපායි. එදා ගොවියෙකුට කැළයෙන් හේන්කද, වැව් අසබඩ කොස්, පළතුරු, පොල්, එළවළු සැපයෙන තුරු ලොවේදීම හෙබි ගෙවත්තක්ද, ගොඩ, මැද, මඩ වශයෙන් කොටස් කීපයකින් යුත් කුඹුරුද තිබිණි. දැන් හේන් ගොවිතැන විනාශකාරී ක්‍රියාවක් වුවද ක්‍රමවත්ව හේන් කැපීම නිසා වන පෙන් ආරක්ෂාවීම, හේන් ආහාර, දර, දැව, සතුන්ට තාණ හා වඩා තිබූ ගොවිතැන් කළ කුඹුරුවලට පොහොර ද සැපයීය. ඇත්තෙන්ම එය මනා සම්පත් උපයෝගිතාවයක් විය.

ගම අද්දට කැළැව් හා හේන්, වැව් අද්දට හේන් හා ගෙවත්ත, වැව් හා නැව් නවල්ල සහ කුඹුරු ගොවිතැන, සත්ව පාලනය විධිමත් ජල කළමනාකරණය (Water/Shed Management) සහ විශිෂ්ට භූමි පරිශීලනය මගින් පරිසරය හා එම තුළනාත්මක බව ආරක්ෂා වන අන්දමින් එකට බැඳී තිබුණි. ගොම මුත්‍රා ගාලෙන්, අළු හා කසල ගෙවත්තෙන් ගොඩගසා, කන්නේන් කන්න කුඹුරට ගෙන ගොස් දමන ලදී. මෙම පොහොර හා උස්බිම්වලින් සෝදා ආ පැළෑටි ආහාරය, විධිමත් ශෂ්‍ය ක්‍රමයන් නිසා කුඹුරු ගත වර්ෂ ගණනක් සාරවත්ව පැවැත්විණ. දිප්තිමත් සුර්යාලෝකය, තෝරා ගන්නා ලද බිජු, නිසිබෝග මිශ්‍රණ, කල් යල් බලා බිජු වැසිරීම ආදිය හේතුකොට ගෙන ශක්ති සම්පන්න බෝග වගා වශයෙන් අස්වැන්නද ලැබුණ අතර, බෝගවලට කෘෂි උපද්‍රව හා රෝගද නොවැළදුණි.

බෝග රටාවක් කාලගුණ (වර්ෂා) රිද්මයට අනුව සකසා ගැනීමද මෙයට හේතුවිය. ශ්‍රී ලංකාවේ බිම් සැකසුමද ඉතා වැදගත් මෙහෙයක් ඉටුකරයි. වනාන්ත ශුද්ධ කිරීමෙන් අරක්කු බිම් සැකසීමට සෙමෙන් සති කීපයක් ගනී. මේ නිසා කෘෂි හා රෝග හානි අඩු වේ. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි ස්වභාව ධර්මයට හා පරිසරයට හානියක් නොවන අන්දමින් ගොවිතැන් කිරීම නිසා, කෘෂි පාලනයක් හෝ මර්දනයක් මෙන්ම රෝගවලින් බෝග ආරක්ෂා කිරීමත් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය නොවීය. එහෙත් කාලගුණ විපර්යාස නිසා හෝ වෙනත් හේතූන් නිසා විටින් විට අතින් යෙදී කෘෂි හානි තිබූ බව පෙනේ. ඒ අර්ස්ථාවලදී කෘෂි හානි වළක්වා ගැනීමට විවිධ ක්‍රම

උපයෝගී කරගෙන තිබේ. එහෙත් කිසිම ක්‍රමයක් පරිසරයට හානියක් හෝ මිනිසාට විෂවීමක් හෝ නොවීය. ඇතැම් කෘෂි පාලන ක්‍රම, ආගමික වතාවත්වලට හෝ ආගමට බැඳී තිබීම විශේෂ ලක්ෂණයකි. ඒ අනුව සමාජීය හා ආගමික ආකල්ප ඇතැන්විතව පුද්ගලයන් විසින් උපයෝගී කරගන්නා යැයි සිතිය හැක. එසේම දේවතාවන් පිළිබඳ නිවූ විශ්වාස තුළින් කෘෂි පාලන ක්‍රම ගොවීන්ගේ සිත් තුළට කාර්ද්ද ඇත.

හාමට පෙර සති ගණනක් පුරා ලියදිවල වතුර බැඳී තිබීමෙන් වල් පැලැව් මර්දනය විය. ගිගුරුම් වැසි ජලය සමග එන පීචාන්තක ද පසට ලැබුණේය. අද අප විසින් කළ යුත්තේ එම ක්‍රමවල ගැබ්ව ඇති විද්‍යාත්මක හරය විස්තර කොට නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීමයි. කෙමි බොහෝ ඇත. ඉන් කීපයක් පහත සඳහන් වේ.

ගොඩවෙල්ලන්ගේ හානිය දක්නට ලැබුණ විට හැන්දෑවේ හිරු බසින වේලාවේ කෙසෙල් කඳන් රවුම් පෙතිවලට කපා ඉන් කිපයක් කුණුබේ තැනින් තැන ඉතිවල ගසා, එම රවුම්මත පලතුරු සහ පුළුටු තබා පහතක් දල්වනු ලැබේ. දින දෙක තුනකදී ගොඩවෙල්ල හානිය දුරුවේ. ඇත්තෙන්ම සිදු වන්නේ හැන්දෑවේ පහත් වළියට කුරුල්ලන් ඇඳ ගැනීමයි. ඔවුන් එහි පැමිණි විට කෑම පෙන්නේ. කෑම ඇතිවීමට කෙසෙල් පෙත්තේ වැසූ විට එය කුණුරට කඩා වැටේ. කෑම ඇතිවීමට බිමට බසින කුරුල්ලෝ ගොඩවෙල්ලන් දකිති. පුළුටුවලට වඩා ගොඩවෙල්ලන් හොඳ කෑමක් නිසා එදින හැන්දෑවේ ඇතිතරම් කා පසු දිනවලද පැමිණ ඉතා ඉක්මනින් ගොඩවෙල්ල හානිය පාලනය කරති. කුණුරු, මියත් කෑමෙන් වළක්වා ගැනීමට පොල්පිති සිටුවීම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ බහුලව දැකිය හැකිය. එයින් සිදුවන්නේද නිශාචර බකමුණන් හා බස්සන් වැනි පක්ෂීන් ඇඳ ගැනීමයි. කැළෑ නැති තැන මෙම සතුන් නැත. එවිට එම ක්‍රමයේ පලක් නැත. වන පෙත්වල ඇති වැදගත්කම මෙයින් තහවුරු වේ.

කිරි සෙම්බුවක් හා වැලි සෙම්බුවක් බෝ මැඩකට දමා එනතින් වැලි සෙම්බුවක් ගෙන ගොස් කෘෂිකර්මාන්තකාරකයාට සට වැලි තදින් ගැසීම තවත් කෙමකි. මෙයින් සිදුවන්නේ කෘෂිකර්ම වතුරට වැටීමයි. එවිට එහි පීචාන්තක ගෙම්බන්, දියබරයන් හා මාලුන්ට ඔවුහු ගොදුරු වෙති. කෘෂිකර්ම ඉස ගෙම්බන් හා වෙනත් ජලජීවීන් විනාශ කොට ඇති කුණුරක මෙම කෙම ක්‍රියාත්මක නොවේ.

රාත්‍රියේ සිටුවකින් සැදූ පහන් තිරයක් මි තෙලේ ඔබා දැල්වීමද කෙමකි. ඇත්තෙන්ම මෙය අද භාවිතා කරන ආලෝක උග්‍රලකි. කෙමිවලට අමතරව කටුමානාර ඇඳීම, කොහොල්ලා ගැලනු ඇඳීම ද, කුල්ලේ පිටුපස කොහොල්ලා ගා පවත් කිරීම ආදියාන්ත්‍රික ක්‍රමද භාවිතා කොට තිබේ. එයට අමතරව පීචාන්තක දුරුද යොදා ගෙන ඇත. දලක් පෙති, කළුවැල් හා මහපට්ටා තුලා වත්කඩවල තැබීම හෝ ඉසීම තවමත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල කරගෙන යනු ලැබේ.

මෙම කෙමි විස්තරයෙන් විදහා දැක්වෙන්නේ පැරණි ක්‍රම පරිසරයට හෝ මිනිසාට හානිකර නොවූ බවයි. එහෙත් නවීන විද්‍යාත්මක යන්ත්‍රණයක් ලෙස පිළිගෙන මුලාවීම හා වෙළඳ ආර්ථිකයේ

ගුණාංගය ලක්වීමේ හේතුවෙන් අපත්, අප පරිසරයත්, පසේ සරු බවත්, විනාශවෙමින් පවතී. එහෙයින් ප්‍රමාද නොවී අපට ආවේණික වූ පැරණි ක්‍රම සොයා ඉන් අදට ගැලපෙන ක්‍රම භාවිතා කිරීමටත් අපගේ සහෝදර ගොවි මහතුන්ට හදුන්වා දීමටත් අද්වන් කර ගනිමු.

එමෙන්ම යෝග්‍ය නව කෘෂි තාක්ෂණයන් මෙන්ම වෙනත් රටවල උපයෝගී කර ගන්නා ක්‍රම යොදා ගැනීමෙන්ද ඉහත සඳහන් වූ පරමාර්ථ සපුරා ගත හැක. උදාහරණයක් වශයෙන් තායිලන්තයේ භාවිතා කරන හෝග සංරක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රම දෙකක් පහත සඳහන් වේ.

තිත්ත කිඳු අඩියක පමණ කැබලි වලට කපා උණ බම්බුවලින් ඉතිමඟක් සාදන්නා සේ උනින් බැඳ වතුර එන වත්කඩේ තැබීමෙන්ද, තිත්ත කිඳු කැබලිවලට කපාගෙන කුඩාවට රෝල් කර කුණුබේ සෑම තැනකම එකාකාරව ඉසීමෙන්ද කෘෂි හානි වලක්වා ගනිති. තවද කිලෝ දෙකක් පමණ කුඩා කැබලිවලට කපා වතුර ලිට් දහයක දිනක් පමණ පොහවා ලබා ගන්නා දියරයේ (සිටුවීමට ඇති පැල) පැය 12 ක් තැබීමෙන්, පැල සිටුවීමෙන් පසු කෘෂි හානි වලක්වා ගත හැක.

කොහොඹ තවත් ද්‍රව්‍යයකි. අක්කරයකට කොහොඹ ඇට කුඩු කිලෝ 15 - 20 ක් පමණ වැඳුන සේ වැපිරීමෙන්ද 10 - 14 කදි හා බිම් පුරා කැඳින් අරිද්දා වේදියේදීමෙන්ද කොහොඹ ඇට කිලෝ දෙකක් පිම්බර වතුර ලිට් 16 - 20 ක රැයක් දෙකක් තබා පෙරා ගන්නා ලද එම සාරය ලිට් රයක් වතුර ගැලුම් 10 - 20 දක්වා මිශ්‍ර කර දින හතෙන් හතට ගොයමට ඉසීමෙන් දුණුරු පැල කීඩවා, කොළ හකුලන දළබුවා, කියත් පණුවා සහ කොකු පණුවා ආදි හානිකර කෘෂිකර්ම ගෝල ගොයම ආරක්ෂා කර ගත හැක. එපමණක් නොව, ගොයමේ වර්ධනයද වී වල තත්ත්වයේ දියුණුවක්ද ගොවීන් දැක ඇත. එය කොහොඹවල ඇති දිලිට පාලන හැකියාව සහ පසේ පීචාන්තක ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව නිසාය.

මෙම ලිපියේ අවධානය බෝග සංරක්ෂණයට ලක් කළේ කෘෂි රසායන නොමැතිව ගොවීන්ගේ නොකළ හැකිය යනු බොහෝ ගොවීන්ගේ ආකල්පයක් වන නිසාය. ශාස්තෘ මාරුව, කොළ පොහොර භාවිතය, සජීවී සහ අජීවී ආවරණ භාවිතය, කොම්පෝස් භාවිතය, බෝග මාරුව, පීච වායු තාක්ෂණය හා එම පොහොර යොදා ගැනීම, මිශ්‍ර හෝග යල් කල් බලා වගා කිරීම, බහුස්තර බහුබෝග වගාව ආදියෙන් පසේ සාරවත් බව හා කෘෂි නිෂ්පාදනය වැඩිවන ජනගහනයට සරිලන සේ වර්ධනය කර ගැනීමට හා දිර්ඝ කාලීනව පවත්වා ගැනීමටද පරිසරය සංරක්ෂණය හා සංවර්ධනය කොට පාරිථිපීයව තර්ජනය අඩුකර ගැනීමටද ඉහතින් විස්තර කළ ක්‍රම හා තවත් එවැනි ක්‍රම යොදා ගැනීම, යොදා ගැනීමට පෙළඹවීම හා එම තාක්ෂණ සොයා ගැනීම අප හැමගේ අභිප්‍රාය විය යුතුය.