

සුවසේන සඳනා පවුලේ සහයෝගය

ප්‍රියානි ඊ. සොයිසා

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ස්වභාවික සම්පත්, බලශක්ති හා විද්‍යා අධිකාරිය

ජන සමූහයක් තුළ වෛද්‍ය වෘත්තියෙහි නියැලීමේදී, පවුල, ඒකකයක් වශයෙන් සලකා කටයුතු කිරීමට, උපාධි අපේක්ෂකයා පුහුණු කරනු ලැබේ.

අපගේ අවධානය ලබන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් පවුලට පොදුවේ බලපායි. එනම් ආරය සහ පරිසරයයි. එහෙයින් පවුලේ සෞඛ්‍යය මේ දෙඅංශයට අදාළව පිළිබිඹු වෙයි.

ලුහුඬින් පවසනොත් ආරය බලපාන්නේ ඇදුම, මධුමේහය නොහොත් දියවැඩියාව සහ අධික රුධිරපීඩනය වැනි සුලභව වැළඳෙන රෝගයන්ට අදාළවය. ආවේණිකව, හෙවත් පරම්පරාවෙන් උරුම විය හැකි මෙම රෝගයන් කෙරෙහි පරිසරය ද විශාල වශයෙන් බලපායි. ඇදුම රෝගයට නිවාස තත්වය ද, ඇදුම රෝගය මධුමේහය සහ අන්‍යාතනිය (hypertension) යන රෝගයන්ට ආහාරයද යනාදී වශයෙනි.

නිවසෙහි පීඩාකාරී පරිසරය මගින්, විශාද අවපීඩනය (manic depression) වැනි මානසික ආබාධයන්ටද මගපෑදීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු සංස්කෘතික පසුබිමක, විවාහ සැලසුම් කිරීමේදී හඳුන් සහ නක්ෂත්‍රකරුවන් වැදගත් තැනක් ගනී. එහෙත් අප බොහෝ දෙනා නොදන්නා නමුදු, බුන්තොල (hare lip) බුන්තල්ල

(cleft palate) මුගුරුපාද (club foot), වැනි සුලභව දක්නට ලැබෙන සහජ විකෘතීන් කෙරෙහිද, මලබද්ධය, ආවෘත ගුදය, ඇති කරවන Hirschsprun's රෝගය, ආමාශයීය බැහැරවීම් වලට අදාළව වමනය හා සමග ඇතිවන 'pyloric sterosis' නමින් හැඳින්වෙන රෝගය, යනාදී ජර්මක ආන්ත්‍රික (gastro intestinal) ගැටළු කෙරෙහිද ආරය බෙහෙවින් බලපායි.

ඇති සොසුරු සොසුරියන් අතර විවාහයන් හේතුකොට ගෙන පවුල්වල පරම්පරානුගතව එන, එතරම් සුලභ නොවන රෝග වැළඳේ. උාණ මානසික වර්ධනයට තුඩු දෙන ඇතැම් ජෛව රසායනික ව්‍යාකූලතාවන්ද, වයඹ සහ උතුරුමැද පළාත්වල බොහෝවිට දක්නට ලැබෙන තැලයිමියා නමින් හැඳින්වෙන නිරක්ෂතාවද වෙනත් බොහෝ විරල රෝග ද මේ ආකාරයට වැළඳේ.

ආරයට වැළඳෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ ආබාධ දක්නට ලැබෙන්නේ වඩා විරල වශයෙනි. සර්කස් කණ්ඩායම් වලට අයත් කුරුමිටන් කෙරෙහි දක්නට ලැබෙන මිටි බව මෙවැන්නකි.

පවුලක් තුළ මෙවැනි තත්වයක් හට ගැනීමෙන් පවුලක මානසික, සමාජයීය සහ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට බාධා පැමිණිය හැකි බැවින්, පවුල තුළ මෙබදු

රෝගයන් හැකි සෑම විටකදීම වැළැක්වීම පිණිස, ඒවාට අදාළවන කරුණු පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය.

පවුලක පාරිසරික පසුබිම එම පවුලට පොදුවේ වැළඳෙන ආසාදනයන් කෙරෙහි බලපායි. ලමා වියේදී සුලභව වැළඳෙන බෝවන රෝග දැත් ප්‍රතිශක්තිකරණය මගින් වැළැක්විය හැකිය. මෙමගින් පවුල්වල ජීවිතයට, එම රෝගයන් නොවැළඳීමෙන් ලැබෙන සහනයට අමතරව ඒවායේ ප්‍රථිපල වශයෙන් ඇතිවන ආබාධිත තත්වයන්ගෙන් ද අත්මිදීමටද හැකි වෙයි.

එසේ වුවද, පාවතය, යකෘත ප්‍රදාහය (hepatitis) සහ උණ සන්නිපාතය (typhoid) වැනි රෝග තවමත් ශ්‍රී ලංකාවේ නිවෙස්වල සුලභව හටගන්නා රෝග වෙති. බොහෝ විට ලේ සහ ශ්ලේෂ්මල සහිත පාවතයෙන් පෙළෙන දරුවන් දෙදෙනෙක් එක් වර වෛද්‍ය වරයෙකු වෙත ගෙන එනු ලබති. මොවුන්ගෙන් ඇතැම් අය පැමිණෙන්නේ දුප්පත් නිවෙස් වලින්ම නොවේ. සුපිරි වෙළඳසැල් යනුවෙන් හැඳින්වෙන, ප්‍රමාණවත් ශීතකරණ ගබඩා පහසුකම් වලින් තොර, ඇතැම් වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගන්නා මාළු සහ මස් අනුභවය, ෂීගෙල්ලා නිසා වැළඳෙන පාවතය හා රෝග රාශියකට හේතු වේ.



ලමාවියේදී සුළඟට වැළඳෙන බෝවෙන රෝග ප්‍රතිශක්තිකරණය මගින් වැළැක්විය හැක.

යකාන ප්‍රදාහය සහ උණ සන්නිපාතය බොහෝදුරට අපිරිසිදු පානීය ජලය සහ දූෂිත කිරි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හේතුකොටගෙන හටගනී. එක්සත් රාජධානිය සහ ඇමරිකාව යන රටවල බිත්තරවල සැල්මනෙල්ලා විෂබීජය නිසා පාවන වසංගත හටගෙන ඇත. මෑතක සිට කුකුල් ආහාරවල සංයුතිය නිසා බිත්තර ඇතුළත බැක්ටීරියා පිවිත් වෙනස්වීමෙන්, අධික පිසිනලද බිත්තර ආහාරයට ගැනීම ආරක්ෂාදායී නොවන තත්වයක් හටගෙන ඇත.

ආහාර පිළිබඳ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්ද, ජලය උණුකර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳවද, මහජනයා තුළ දැනුවත්භාවය ඇතිවිය යුතුය. නිවෙසක ආසාදනයක් හටගත් පසු සාමාන්‍ය මට්ටමේ පරිසරයක වුවද කිසියම් ආකාරයක රෝධක(barrier) සාත්තු සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. විෂබීජ නාශනය සැමවිටම කළ නොහැකි වුවත් රෝගියා වෙනුවෙන් වෙන් කරන ලද භාජන පාවිච්චිය සහ අඩු වශයෙන් අත් සෝදා පිරිසිදු කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පවුලක් රැකබලා ගැනීමේදී එක් එක් සාමාජිකයා සුරැකීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කෙරෙයි. පවුලේ වැඩිහිටි සාමාජිකයන් තුළ, කන්තුක (cardiac) සහ වෙනත් රෝගද, පිළිකා ආශ්‍රිත ගැටළුද, සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වීමට අත්‍යාවශ්‍ය වේද වරුන් සුහුණු කරනු ලැබේ. මානසික රෝගද නොසලකා හැරිය නොහැක. මේ අතර, වෘත්තීය කෙරෙත් හට ගන්නා උපද්‍රව කෙරෙහිද අවධානය යොමු කළ යුතුව ඇත.

මුළු පවුලේම පෝෂණය පිළිබඳව සැලකිල්ල යොමුවිය යුතුය. ආහාර සම්පෘෂ්ණ, සාමාන්‍යයෙන් පැය 72 කට අදාළව කරනු ලැබේ. ඇත්තෙන්ම අඩු ආදායම් ලබන කණ්ඩායම් වලට ආහාර ඇති නැති බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිවෙස් වලට යා යුතුය. නිවෙස් වලින් 40% කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක අවශ්‍ය කැලරි ප්‍රමාණය පරිභෝජනය නොකෙරෙන රටක, අඩු වියදමකින් ලබා ගත හැකි කැලරි බහුල ආහාර වර්ග පිළිබඳව දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍යය. අවශ්‍ය කැලරි ප්‍රමාණය සපිරෙන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන්, අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයද සැපයෙන බැව්

පැවසේ. සාමාන්‍ය පවුලකට අවශ්‍ය සත්ව ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයට සමාන එළවළු ප්‍රෝටීන් අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා ධාන්‍ය වර්ග සහ රනිල වර්ග සම්මිශ්‍රණය කරගත හැකිය. මේවා 1:2/3 අනුපාතයට මිශ්‍ර කර ගැනීමෙන් සත්ව ප්‍රෝටීන් වලට ආසන්න ප්‍රෝටීන් අගයන් ලබා ගැනීමට සාමාන්‍ය මට්ටමේ පවුලකට හැකි වෙයි. අපගේ ප්‍රධාන ආහාරය වන බත්, හුදෙක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ගයක් පමණක්ම නොවේ. එහි අගනා ප්‍රෝටීන් පදාර්ථ ද අන්තර්ගතව ඇත. අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග වලින් එහි අන්තර්ගත නොවන්නේ ලයිසීන් පමණකි. මෙය රනිලයන්ගෙන් ලැබේ. එහෙයින් මුදල් හිඟ අවස්ථාවන්හිදී, ඕනෑම වර්ගයක පරිපූර්ණ සමග බත් ආහාරයට ගැනීම ප්‍රමාණවත් වනු ඇත.

මෙසේ සංරචකය වූ ආහාරයන්හි විටමින් වර්ගද අන්තර්ගත වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නම්, කහ සහ කොළ පැහැති පළතුරු වර්ග, එළවළු වර්ග සහ පලා වර්ග වලින්, විටමින් ඒ ලබාගත හැකිය.

මෝසම් සුළං ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ගලපටලය ආවේනික රෝගයක් කොටගත් රටක, අයඩින් මිශ්‍ර දුනු සැමට නිරන්තරයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය.

බොහෝ කාන්තාවන් නිරන්තරයෙන් පෙළෙන තැන්හි ආහාරයෙහි යකඩ පදාර්ථය ඇතුළත්වීම පිළිබඳව සැලකිල්ල යොමුවිය යුතුය. නිරන්තරය නම් දරුණු ප්‍රතිපලය යකඩ උරාණතාව කෙරෙත් ඇතිවන අයහපත් ප්‍රතිපල මාලාවේ එක් අන්තයක් වන අතර, මේ හැරුණු කොට ශරීරයේ සහ මොළයේ ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහාද යකඩ පදාර්ථය අවශ්‍ය වන්නේය.

අත්‍යවශ්‍යක සෞඛ්‍ය දර්ශකයන්ගෙන් වැඩි කොටස යහපත් තත්වයක් පෙන්නුම් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසමූහය තුළ පෝෂණ තත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තේ තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට බෙහෙවින් අඩු මට්ටමකි. පවුලක මෙම තත්වයට වඩාත් පහසුවෙන් ගොදුරුවන සාමාජිකයින් වන්නේ කාන්තාවන් සහ පාසල් යාමට පෙර වයසේ දරුවන්ය. මොවුන් කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් යොමුවිය යුතු වන අතර මානස හා දරක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන මගින් මෙකී කොටස් රැක බලා ගනු ලබන්නේ මේ නිසාය.



සුවසෙන සඳහා පියාගේ අනුග්‍රහය

මවුවරුන්ගේ පෝෂණයෙහි අසතුටුදායක බව විශේෂයෙන් පෙන්නුම් කළ යුතුව ඇත. උත්පත්තියේ සිට මහලු විය ඉක්මවන තෙක් කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ ඇය කෙරෙහි යොමු වන්නේ මඳ අවධානයකි. පිරිමින් හා සැසඳීමේදී මෙසේ අසතුටුදායක තත්වයක් පැවතීමට එක් හේතුවක් වන්නේ දරු ප්‍රසූතියේදී සහ ඔසප් වීමේදී රුධිරය පහවීම සහ ගර්භනී අවස්ථාවෙහි හටගන්නා අතිරේක අවශ්‍යතාවයන්ය. පිරිමින්ට මෙවැනි තානියක් සිදු නොවේ. තවද, නිවසෙහි ආහාර හිඟවන විට, තිබෙන ආහාර ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කොටස මුදල් උපයන තැනැත්තාට ඒ සඳහා අතිරේක ශක්තිය ලබාදීම පිණිස එම තැනැත්තා වෙත යොමු කරනු ලබයි. පෙර පාසල් වියේ දුරුවන් සමගත් වඩාත් දැඩිවූ පාසල්වියේ ලුණු සමගත් බෙදාහදා ගැනීමට ඉතිරි වන්නේ ආහාර යුළු ප්‍රමාණයකි. විශේෂයෙන්ම පෙර යොවුන් වියේ දරුවන්ට එයින් තුන් වැඩි කොටස හිමි වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් අතර විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන වයසේ දී පෝෂණ තත්වය නිවැරදි බවට පත්වී උසට සරිලන ශරීර බර ඇතිවේ. මෙහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් එම වියේදී දරුවන් මිටි තරබාරු හැඩයෙන් යුක්ත වෙති.

පවුලේ සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් පවුල් සැලසුම්කරණය පිළිබඳව අවධාරණය කළ යුතුය. පවුලක් කුඩාවීමෙන් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සම්පත් සංරක්ෂණය වෙයි. මෙහිදී අවධාරණය වන්නේ හුදෙක් ආර්ථික පක්ෂයම නොවේ. මවගේ සෞඛ්‍යය, දරුවන්ගේ උපතෙහිදී බර, ඔවුන්ගේ පෝෂණය සහ පොදුවේ

ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ යහපත් පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් එය වඩාත් වැදගත් වේ.

දැන් අපි පවුලෙහි සෞඛ්‍යය රැක - වරණය කරා ප්‍රවීණය වන ආකාරය සලකා බලමු. තව ප්‍රවේශය යොමුවී ඇත්තේ මෙතෙක් සෞඛ්‍යය සේවා ලබා නොවූවන් කෙරෙහිය. මක්නිසාද යත්, සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු ඇතිවන්නේ තිබෙන සම්පත් ප්‍රමාණය අඩුවීම සහ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ ක්‍රම කරා ලඟාවීමේ අපහසුතාව හේතුකොටගෙන බැවිනි. සෑම රටක්ම මිනිස් සම්පත් වලින් පොහොසත්ය. මෙම සම්පතෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට කටයුතු කළ හැකිය. මේ සඳහා අවශ්‍ය අධීක්ෂණය සහ ක්‍රමෝපාය ඇත්තේද මිනිසුන් වෙතය.

මූලිකම ආරක්ෂාව සපයන තැනැත්තිය වශයෙන් මවගේ කාර්යභාරයෙහි ඇති වැදගත්කම බොහෝ විට නොසලකා හරිනු ලැබේ. ගමන් වියදම් අධික වීම සහ තිබෙන පහසුකම් පිළිබඳව නොදැනීම නිසා සෞඛ්‍යය පහසුකම් වලින් ප්‍රයෝජන නොගන්නා අවස්ථාවලදී මවගේ මෙම වැදගත් කාර්යභාරය නැවත මතක් කර දිය යුතුය. දරුවාගේ සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් මව තුළ නිතැතින්ම ඇතිවන උනන්දුව පැහැදිලිය. දුප්පත් හෝ වේවා පොහොසත් හෝ වේවා සියළු මවුවරුන් තුළ මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇත. ආර්ථික තත්වයෙන් යහපත් මවුවරුන්ට වුවද පවුලේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳව මෙම ලිපියෙන් අරමුණු කෙරෙන පරිදි වැඩි අවබෝධයක් අත්වනු ඇත. එබඳු දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා මවුවරුන් තුළ ඇති අධික ආශාව වසර ගණනාවක් තුළ ලැබූ පළපුරුද්දෙන් හෙළිවී ඇත. මෙබඳු දැනුමක් ඇතැම් විට පාසැල් වියේදීද ලැබේ. එහෙත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් වන අපට පෙනී යන ආකාරයට එසේ ලැබුණු අධ්‍යාපනය එතරම් ඵලදයී වී නැති බවට සැක පහළ වේ.

එසේ දෙනු ලබන දැනුම නිසැකවම යොමු කර ඇත්තේ පාසැල් යන පිරිසෙන් එක් කොටසකට පමණි. එහිදී දැනුම ඇගයීම පිළිබඳවද වැඩි අවධානයක් යොමු කර නැත.

මවගේ කාර්යභාරය අවධාරණය කෙරෙන නමුදු ඇය පිට පැවරී ඇති බර වැඩිකිරීමට



ලදරුවන්ට මව්කිරි දිය යුතුම වේ.

අදහස් නොකෙරේ. වගකීම දෙමවුපියන් දෙදෙනා අතර බෙදී යයි. නව පරපුරේ පියවරු පවුලේ වගකීම් බෙදාහදා ගැනීමට වැඩි කැමැත්තකින් යොමු වෙති. ඔවුන් තුළ මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇතිවී ඇත්තේ මවුපරු වැඩි දෙනෙක් රැකියාවල

වෙනස් කිරීම කළ හැකිය. එහෙත් එය සිත් ගන්නා ආකාරයට නවතාවයකින් යුතුව කළ යුතුය.

පාසලෙහි සෞඛ්‍ය විද්‍යා විෂය මාලාව ප්‍රමුඛතා පදනමක් මත සකස් කළ යුතුය. එය සෞඛ්‍ය විද්‍යාවෙහි වැදගත් කමකින් තොරවූ අංශයන්ගෙන් පිරී නොපැවතිය යුතුය. ප්‍රමාණයට වඩා විශාල විෂය පථයකින් යුක්ත වුවහොත් අවධානය නුසුදුසු පරිදි බෙදී යනු ඇත. වසරෙන් වසර එකම විෂය කොටස් සුනසුනා ආවරණය නොකළ යුතුය.


මෙහි තවත් පැත්තක් කෙරෙහි සිත් යොමු කිරීමට කාලය පැමිණ තිබේ. එනම් පවුල් ඒකකය පිළිබඳ සංකල්පය ස්ථාවර කිරීම සඳහා පියවරැන්ට නිවාඩු ලබාදීමයි. පළමු දරුවාගේ ප්‍රසූතිය සඳහා අඩු වශයෙන් සති දෙකක් හෝ ඔවුනට නිවාඩු ලබා දිය යුතුය. මවුකිරි දීම සඳහා ආධාරවීම පිණිස පමණක් නොව, පවුලේ වගකීම් බෙදාහදා ගැනීමට ධෛර්ය දීම සඳහාද මෙය කළ යුතුවේ.

සෞඛ්‍යය සුරැකීමට අදාළව තවත් වැදගත් අංශයක් වන්නේ තීරණ ගැනීමයි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ තීරණ මටගේ සහ පියාගේ එකඟත්වයෙන් ගැනීම පවුලේ සෞඛ්‍යය සඳහා වැදගත්ය.

අවසන් වශයෙන්, මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය පිළිබඳ තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සාර්ථක ප්‍රයත්නයක් දැරිය යුතුය. ජනමාධ්‍ය මගින් මෙතෙක් ගෙන ඇති පියවර ප්‍රමාණවත් තරම් තිබුණොවේ. අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සැකසීමේදී ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු අංශ හඳුනාගත යුතුය. මේවා විෂය පිළිබඳ බලධාරීන් වෙතින් නිකුත් විය යුතු නමුදු වටහාගත හැකි සරළ බස් වහරකින් ඉදිරිපත් විය යුතුය.

අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව නැවත අවධානය යොමු කිරීමෙන් පවුල්වල සෞඛ්‍යය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු කටයුතු ප්‍රමාණයක් ඉටු කරගත හැකිය. මේ සඳහා පවුල්වල සෞඛ්‍යය උදෙසා ස්වයං සහාය අරමුණු කොටගත්, එමෙන්ම ප්‍රතිඵල ඵල්ල කොටගත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම සුදුසු යයි මෙහිදී යෝජනා කෙරේ.

පවුලේ වගකීම් දෙමව්පියන් වෙත බෙදී යයි



**ඥාති සොයුරු සොයුරියන්
අතර විවාහයන්
හේතුකොටගෙන පවුල්වල
පරම්පරානුගතව එන,
එතරම් සුලභ නොවන
රෝග වැළඳේ. උාණ
මානසික වර්ධනයට තුඩු
දෙන ඇතැම් ජෛව
රසායනික ව්‍යාකූලතාවන්ද,
වයඹ සහ උතුරුමැද
පළාත්වල බොහෝවිට
දක්නට ලැබෙන තැලසිමියා
නම් හැදින්වෙන
තීරක්ෂතාවද වෙනත්
බොහෝ විරළ රෝග ද මේ
ආකාරයට වැළඳේ.**

යෙදීම නිසා පමණක් නොව, වර්තමානයේ පවුල් වැඩි වශයෙන් න්‍යෂ්ටිගතව ඇති අතර සුළු පවුලේ සහාය ඔවුනට සැමවිටම ලබාගත නොහැකි විමද නිසාය. මෙසේ පිරිමි පක්ෂයේ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ මුල් අවධියේදීම එනම් ඔවුන්ගේ සිත් හැඩගැස්විය හැකි පාසල් වියේදීම ඔවුන්ගේ සිත්හි එය කාවැද්දිය යුතුය. එම වයසේදී වර්ධාවත්

ඔබගේ වර්ධනය

ප්‍රමිලා සේනානායක.

ජාත්‍යන්තර පවුල් සැලසුම් සංවිධානය,
සහකාර ලේකම් ජනරාල්,
රිජන්ට් විද්‍යාලය,
එක්සත් රාජධානිය.

සජීවී සෛලය

ඉතාම කුඩා කාමියාගේ සිට යෝධ තුරු ගස දක්වා වූ ඕනෑම ශාකයක් හෝ වේවා සත්වයෙක් හෝ වේවා, පොළව මත ඇති සෑම සජීවී වස්තුවක්ම සෑදී ඇත්තේ සෛලයන්ගෙනි. මේ අතර මිනිස් සිරුර, දශලක්ෂ සංඛ්‍යාත සෛල ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර ප්‍රොටොසෝවා සහ බැක්ටීරියා වැනි ඇතැම් ජීවී වර්ග සමන්විත වී ඇත්තේ තනි සෛලයකිනි. එහෙත් සෑම මිනිසෙක්ම සිය ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ තනි සෛලයක් වශයෙනි. එනම් ගර්භාශය තුළ යුක්තානුවක් වශයෙනි. ගර්භාශයෙහි තැන්පත් වූ යුක්තාණුවක සිට මිනිස් ජීවිතය, අප සාරගර්භවූන් ඵලදායීවූන් අදියරයන් රාශියක් ඔස්සේ රැගෙන යයි.

තව ජීවයක ආරම්භය



මාසයක් වයස් වීම සංසේචිත ඩිම්බය සිඝ්‍රයෙන් වැඩෙන කලලයක් බවට පත්වේ. දිගින් සෙ.මි. 1/2 ක් පමණ වන එහි හඳුනාගත හැකි හිසක් සහ වලිගයක්ද ඇති අතර මූලික හඳවනද මැනවින් වර්ධනය වී ඇත. මෙම කලලය පෙතණි වැලෙන් මවගේ ශරීරයට සම්බන්ධ වී ඇත. මව කෙරෙහි කලලය වෙත රුධිරය,

අම්ලකර වාතය සහ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගමන් කරන අතර ඉන් බිහිවන අපද්‍රව්‍යයද ඉවත් වේ. සති 8 කට පසු එහි කෙටි ගාත්‍රා, එනම් අත් සහ පාද ද හඳුනාගත හැකිය.

මාස 2 ක් ගතවූ තැන අත්වල සහ පාදවල ඇඟිලි සියල්ල සහිතව, හඳුනාගත හැකි

මිනිස් රුවක් බවට කලලය පත්වේ. සෙ.මි. 2 1/2 ක් පමණ දිගැති මෙය දැන් හඳුන්වනු ලබන්නේ හූණය යනුවෙනි. තුන්වන මාසය ආරම්භ වන විට මෙම හූණයට එය වටා ඇති තරලය තුළ පහසුවෙන් චලනය වීමට හැකිය. එහි මාංශ පේශීන් සහ ස්නායු දිළිඳුමත් ආලෝකයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තරම්

මිනිස් කලලය



වර්ධනය වී ඇත. ශරීරයේ සෑම පද්ධතියක්ම එහි පවතින අතර බාහිර ලිංගෝත්පාදකයන්ගෙන් ගැහැණු පිරිමි බව හඳුනාගත හැකිය. ජලග මාසය තුළ, හූණය දිගින් සෙ.මි. 12 1/2 ක් පමණ දික්ව වැඩෙනු ඇත.

මාස පහේදී හූණය සිය දෑස් විවර කරයි. එහි පා පහරවල් සහ වලනයන් මවට පැහැදිලිව දැනෙයි. සිඝ්‍ර හර්දස්පත්තනය මේ අවස්ථාවේදී වෛද්‍ය නලාව තුළින් දැකිය හැකිය. මව දැන් පැහැදිලිවම ගර්භනී බව පෙන්නුම් කරයි. සියළුම ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් සමන්විත වුවද, හූණයට තවමත් මවගෙන් වෙන්ව පිටත්වීමට නොහැක.

හත් වෙනි මාසය වනවිට මෙම හූණය ඇස් පිහාටු සහ ඇඟිලිවල නියපොතු ඇතුළු සියළුම අංගයන්ගෙන් සම්පූර්ණව

ඇත. මේ අවස්ථාවේ දී හූණය බිහි වුවහොත් එය ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා වනු ඇති අතර බරින් ග්‍රෑ. 1000 ක් ද දිගින් සෙ.මි. 30 ක් පමණද වනු ඇත. එහෙත් එය විශේෂ අරෝග්‍යශාලාවක දැඩි සත්කාර ඒකකයක පිටත් කරවීමට හැකිවනු ඇත.

ගර්භනී භාවයේ අවසාන මාස 2 තුළ හූණය ප්‍රමාණයෙන් තුන්ගුණයක් දක්වා විශාලවන අතර මොළය සහ පෙණහළු වැනි ඉන්ද්‍රියයන් පූර්ණ වශයෙන් වර්ධනය වේ. මාස 9 දී මවගේ ශරීරය තුළ හූණය බෙහෙවින් සිරවී පවතී. ලදරුවා දැන් පරිපූර්ණව ඇති අතර ස්වාධීන ජීවිතයකට සූදානම්ව සිටී. දරුවා උපත ලද වහාම මාස 9 ක් මුළුල්ලේ පිටත්වීමට ආධාරක වූ පෙකණි වැල, මවගෙන් දරුවා කරා රුධිරය ගෙන යාම නවත්වයි. ලදරුවා ස්වාධීන ජීවිතයක් ආරම්භ කරයි.

ලදරුවා






අලුත් උපන් බිලිදා අතාරක්ෂිත බවක් පෙන්නුම් කළද බිහිවන මොහොතෙහි පටන් මෙම අළුත් ලෝකයේ සෑම අභියෝගයකටම මුහුණ පෑමට අවශ්‍ය සියළු දෙයින්ම දරුවා සන්නද්ධව සිටියි.

අලුත් උපන් බිලිදාට මව්කිරි වැදගත් වෙයි. එමගින් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සමබරව ලැබෙන අතර, ආසාදනයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ශක්තියද ලැබෙයි. මව සහ දරුවා අතර බැඳීමද එමගින් තහවුරු වෙයි. අලුත් උපන් බිලිදා වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ නින්දේය. කිසිවක් කරකියාගත නොහැකි සේ පෙනුනත් දැනටමත් තම ඇස් අරමුණක් කරා යොමු කිරීමට සහ හැඩිමෙන් අඳහස් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාව බිලිදාට ඇත.

මිනිස් උපත



කළල අවස්ථාව



අලුත උපත් බිළිඳාට මව්කිරි වැදගත් වෙයි. එමගින් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සමබරව ලැබෙන අතර, ආයාදනයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ශක්තියද ලැබෙයි. මව සහ දරුවා අතර බැඳීමද එමගින් තහවුරු වෙයි. අලුත උපත් බිළිඳා වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ තිත්දේය. කිසිවක් කරකියාගත නොහැකි සේ පෙනුනත් දැනටමත් තම ඇස් අරමුණක් කරා යොමු කිරීමට සහ හැඩමෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාව බිළිඳාට ඇත.

හයමස් වයසැති බිළිඳාට තනිව වාඩිවීමටත් යම්යම් දේ පිරික්සීමට දැන පාවිච්චි කිරීමටත් හැකියාව ඇති අතර සංගීතය වැනි ශබ්ද කෙරෙහි මේ වන විට බිළිඳාගේ අවධානය ඇද ගනියි.

මාස 10 දී දරුවෙක් මුහුණු වැඩි සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලබන අතර මාංශ පේශීන් වර්ධනය වී සමායෝජනය කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබීමෙන් දරුවා දණ ගැමට පටන් ගනී. අවුරුද්දක් වයස වූ විට දරුවා ඇතිලිතුඩින් යම්යම් දේ අහුලා ගැනීමටත් පළමු පියවර තැබීමටත් පටන් ගනී. අවුරුදු දෙකක් වයසැති දරුවා ඇවිදියි. කතා කරයි. තනිවම ආහාර ගනියි. අන් අය හා සෙල්ලම් කරයි.

නව යෞවනය

යොවුනුදාව ගැහැණු හා පිරිමි දරුවන් ප්‍රජනනයට, එනම් දෙමව්පියන් විමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි ලිංගික වර්ධනය හෙවත් පරිණතභාවය ලබන අවස්ථාවයි. ශරීරයේ රසායනික පණිවුඩකරුවන් වන හෝමෝනයන්ගේ වෙනස්වීම් නිසා බාහිර ලිංගික අංග ලක්ෂණ වර්ධනය වෙයි.

ගැහැණු ළමයි වයස අවුරුදු 11 දී පමණ, එනම් පිරිමි ළමයින්ට වඩා අවුරුදු දෙකකට පමණ කලින් මේරීමට පටන් ගනිති. ඔවුහු සෙ.මී. කිහිපයකින් උස් වෙති ඔවුන්ගේ උකුළු රවුම් හැඩයක් ගන්නා අතර, සමට යටින් මේද ස්ථරයක් වර්ධනයවීම නිසා ස්ථන ග්‍රන්ථිත් විශාල වෙයි. යුනික රෝම වර්ධනය වන අතර ඔසප්වීම ආරම්භ වෙයි. පිරිමි ළමුන් වයස 13 න් පසු හදිසි වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරති. ඔවුන්ගේ කටහඬ බිඳී,

ගුක්‍රාණු නිශ්පාදනය ඇරඹේ. වසර කිහිපයක කෙටි කාලයක් තුළදී ඔවුහු ශාරීරික වශයෙන් ළමා විය පසු කොට වැඩිහිටි බවට පත් වෙති. හැගීම් පිළිබඳ වර්ධනය සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මෙයට පසුවය.

සම්ප්‍රදයික සංස්කෘතීන්හි, ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්‍ෂය සම්බන්ධයෙන්ම, යොවුනුදාවෙන් අදහස් වන්නේ, බාලවියේ සිට වැඩිහිටි සමාජය කරා පිවිසීමයි. බොහෝවිට මෙයට අදාලව, පැය කිහිපයක සිට මාස කිහිපයක් දක්වා වූ කාලසීමාවක් තුළ වාරිත්‍රවිධි පැවැත්වෙයි.

වැඩුණු වියට එළඹීම සලකුණු කිරීම සඳහා වන හුරුකිරීම් වලට ඇතැම්විට ශාරීරික පීඩාවන් දැරීමේ ශක්තිය පිළිබඳ වේදනාකාරී පරීක්ෂණ ද ඇතුළත් වෙයි. ඇතැම් ජනසමූහයන්හි, මෙම අවස්ථාවට ලගාවූ තරුණ කොටස්, තම නිවෙස් වලින් බැහැර ගෙන ගොස්, ඒ ඒ සමාජයට අදාළ නීතිරීති සහ ඇදහීම් විශ්වාස උගන්වනු ලැබේ. පුහුණුව අවසානකොට ඔවුන් තම පවුල් හා තැවත එක්වන විට, ඔවුන් වෙත වැඩිහිටියන් හා සමාන බව (විවාහය සහ දරුවන් ලැබීම ඇතුළුව) සියළු බර සහ වගකීම් පැවරෙනු ඇත. ඔවුන් තවදුරටත් නිවසෙහිම රැඳී සිටිනු ඇත. එහෙත් ඒ ළමයින් වශයෙන් නොව, වැඩිහිටි ලොවක සාමාජිකයින් වශයෙනි. සම්ප්‍රදයික සමාජයන්හි යොවුනුදාව ප්‍රමාද වී සිදුවන අතර, වැඩිහිටි භාවය වහා එළඹේ. කාර්මිකරණය වූ සමාජයන් තුළ නව යෞවනය දීර්ග කාලපරිච්ඡේදයක් වෙයි. එය වසර දහයකට වැඩි විය හැකි අතරතුර " කාලපරිච්ඡේදයයි. මෙකී කාලය තුළ, නව යෞවනයන්ටද

වැඩිහිටියන්ටද, ජීවිතය නිරන්තර සටහනක් බවට පත් කරන ආකාරයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේග රාශියක් ක්‍රියාකාරී වෙති. නව යෞවනයේදී හෝමෝනයන්හි ඇතිවන සීඝ්‍ර වෙනස්කම් නිසා පාලනය කරගැනීමට අපහසු උද්වේගයන් එනම් දැඩි උද්යෝගිතාව, ද්වේශය සහ ඒ සියල්ල අහිමවා ලිංගිකත්වයේ උදවත් සමග ඇතිවන සුපුරුදු නව හැගීම් ජනිත කරවයි.

නව යෞවනයින් ශාරීරික වශයෙන් පරිනතවීමේ වෙනසක හැකියාවන් වර්ධනය වන විට ඊට ගැලපෙන ලෙස ආවේගයන්හි පරිනත භාවය ඇතිවේ. ඔවුන්ට තමන්ගේ ස්වාධීනත්වය තහවුරු කර ගැනීමටත් තමන්ගේම තීරණයන්ට එළඹීමටත් තමන්ගේ වැරදි වලින් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමටත් අවශ්‍යතාව ඇතිවේ. ඔවුහු බොහෝවිට තම දෙමාපියන්ගේ ජීවන රටාවට භාත්පසින්ම වෙනස් ජීවන අගයන් තෝරා ගනිති. පොළව මතුපිට සියළුම යන්ත්‍රයන් අතුරින් මූලික වර්ධනය සඳහා වැඩිම කාලයක් ගත වන්නේ මිනිසාටය. මිනිස් දරුවන් උපතෙහිදී ඉතා අසරණ වෙති. ඔවුහු ශාරීරික පරිනත භාවයට ලගාවීමට වසර 13 ක් පමණ ගත වෙයි. ඉන්පසු ජීවිතයේ තුන්වන දශකය දක්වාම නොකඩවා වැඩෙති. එමෙන්ම තර්ක ශක්තිය වැඩිදියුණු කරගැනීමේ අසීමිත ශක්තියක් ඔවුන් තුළ ඇත.

මිනිසා

මිනිසා අයත් වන්නේ ක්ෂීරපායී කාණ්ඩයටය. අනෙකුත් සියළුම ක්ෂීරපායීන් මෙන් මිනිසාද පැවත එන්නේ වසර දශ ලක්ෂ 200 කට පමණ පෙර මිනීමත පහල වූ හික් මියෙක් වැනි කුඩා සත්වයෙකු ගෙනි. කල්යාණේදී ක්ෂීරපායීන් කුඩා මියාගේ සිට යෝධ තල්මත දක්වා විවිධවූ සත්ව වර්ග රාශියක් වශයෙන් විකාශනය වූහ. අද්දර ගණනාවක් ඔස්සේ ප්‍රවර්ධනය වීමෙන් *homo sapiens sapiens* නැමති නූතන මිනිසා බිහිවූ අතර ඔහු මිනිසාට පහළවූ තැන් පටන් එහි සිටි සෙසු සතුන් අහිමවා සිටියේය.


මිනිසාගේ ශාරීරික වර්ධනයේ සඳහා ගත වන්නේ ඔහුගේ ජීවිතයේ පළමු කාර්තුව පමණි. එහෙත් එය මිනිසාගේ වර්ධනයේ එක් අංශයක් පමණි. පරිණත මිනිසෙකුට මනාව වැඩුණු සිරුර හා සමානවම මානසික හා බුද්ධි වර්ධනයද වැදගත් වෙයි.

මිනිස් සිරුර අත්විෂමය සෛල දශලක්ෂ පණස් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවකින් සැදුම්ලත් සංකීර්ණවූ ව්‍යුහයකි. එහි විශිෂ්ට ව්‍යුහය සහ යන්ත්‍රණයන් (සුවිසල් මොළය ඇතුළු) මගින් අපට පෘතුඵිය මත වෙසෙන අනෙක් කවර සත්වයෙකුටත් වඩා පුළුල් කුසලතා සමුදායක් හිමිව ඇත. සියළුම සජීවී වස්තූන් නිර්මාණයවී ඇති මූලික ඒකකය වන සෛලය සැබවින්ම කෙබඳුදැයි සිතා ගැනීම ඉතා දුෂ්කරය. එය තුළ සිදුවන්නේ කුමක්දැයි සිතන්නේ මවා ගැනීම ඊටත් වඩා දුෂ්කරය. බොහෝ සෛල ඉතාමත් කුඩාය. ඒවා පියවි ඇසට නොපෙනෙන තරම් කුඩාය. මිනිස් සෛල අතුරින් විශාලම සෛලය වන ඩිම්බයද, ඉදිකවූ තුඩක් තරම් කුඩා වේ.

පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින්ට සජීවී සෛලයේ සෘදු ව්‍යුහයන් සහ ඒවායේ බිත්ති ඇතුළත සිදුවන දෑ අධ්‍යයනය කිරීමට හැකිවී ඇත්තේ රසායනාගාර තුළදී ප්‍රබල අත්විෂමයන් භාවිතයෙන් පමණකි. සෛලයක් යනු, දවසේ පැය 24 ක් තුළම වැඩ කරන කුඩා කර්මාන්තශාලාවක් බදු, බෙහෙවින් ක්‍රියාශීලී ස්ථානයකි. එයට අයත් "කටයුත්ත" වර්ධනය, අළුත්වැඩියාව සහ ප්‍රජනනය හා සම්බන්ධ වූවකි.

සියළුම සජීවී වස්තූන් අඛණ්ඩව පුනර්වර්ධනය විය යුතුය. ඔවුන් මෙය

ලෝකයේ ජනගහනය, වසරකට බිලියන 90 කට අධික ප්‍රමාණයකින් වැඩිවන අතර, මෙම වර්ධන වේගය යටත් පිරිසෙයින් මෙම ශතවර්ෂය අවසානය වන තෙක් හෝ අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත. සිඳු ජනගහනය වර්ධනයට හේතුවන සාධක රාශියකි. මරණ සංඛ්‍යාව වේගයෙන් පහත වැටෙන අතර, උපත් සංඛ්‍යාවෙහි එතරම් කැපී පෙනෙන පහත වැටීමක් සිදු නොවීම මෙබඳු හේතූන්ට එක් තීරණයකි.



සිදු කර ගන්නේ ගෙවී ගිය කොටස් වෙනුවට වෙනත් කොටස් ආදේශ කර ගැනීමෙනි. මිනිස් සිරුර තුළ සෑම විනාඩියකටම ශාරීරික සෛල දශලක්ෂ 300 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය යති. එහෙත්, ඒවා අවට ඇති සෛල අනුනනය (mitosis) නැමති ක්‍රියාවලිය මගින් ප්‍රජනන වීමෙන් වෙනත් සෛල ඒවායේ ස්ථානය ගනියි. ළමා වියේදී ශරීරය නොතරම් සීඝ්‍රයෙන් සෛල නිපදවන්නේද යත් එමගින් ශරීරය කුමයෙන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙයි. වැඩුණු අවස්ථාවේදී, අනුනන ක්‍රියාවලියේ වේගය බාල වෙයි. ශරීරයේ සියළුම සෛලයන්ගේ ජීවිත කාලය එක සාමාන නොවේ. ඇතැම් සෛල පවතින්නේ සති කිහිපයක් පමණි. මේ අතර ඇතැම් සෛල වසර කිහිපයක් ජීවත් වෙති. අප අවදිව සිටියද, නිදිගතව සිටියද, අපගේ ශරීර පද්ධතිය, ජීවිතය පැවතීමට අත්‍යවශ්‍ය වන සියළු කාර්යයන් ඉටු කරමින් සක්‍රියව පවතියි. වැඩුණු මිනිසකුගේ පෙනහළු, මයින හම් දෙකක් මෙන් පිම්බෙමින් හැකිලෙමින්, දිනකට වාතය ලීටර් 13,000 ක් පමණ පිරි සැකසුම් කරයි. බරින් ග්‍රෑම් 300 ක් පමණ වන වකුගඩුව, දිනකට රුධිරය ලීටර් 15000 ක පමණ අපවිත්‍රතා ඉවත්කර පිරිසිදු කරයි. වඩාත්ම වෙහෙස නොබලා ක්‍රියා කරන්නේ හෘදය වස්තුවයි. ප්‍රමාණයෙන් දළ වශයෙන් එය ගිම්කරුගේ ගුලිකල හස්තය තරම් වූ ප්‍රබල පේශයක් වන මෙය, දිනකට රුධිරය ලීටර් 12,000 ක් පොම්ප කරයි. මිනිස් සිරුරට ආවේනික

හැඩය සහ ස්වරූපය ගෙන දෙන්නේ තනි අස්ථිත් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ සැකිලි පේශීන් 650 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඒකාබද්ධ වීමෙනි. පටක, කාටිලේජ, කණ්ඩරා සහ බන්ධනි මගින් එකට සම්බන්ධවී ඇති මේවා, සාමාන්‍ය ඇවිදීමේ, වාඩිවීමේ සහ සිටගෙන සිටීමේ පටන් මුද්‍රා නාට්‍ය කරුවාගේ ලාලිතයෙන් යුත් චලනයන් හා මලල ක්‍රීඩකයෙකුගේ හෝ කම්කරුවෙකුගේ ප්‍රබල චලනයන් දක්වා අප්‍රමාණ වූ චලනයන් සංඛ්‍යාවකට ඉඩකඩ සලසා දෙයි.

සංසේශිත කේවල සෛලය වසර 20 ක පමණ කාලයක් වර්ධනය වීමෙන් වැඩුණු මිනිසෙකු බවට පත්වී ඇත. එහෙත් මෙම අවස්ථාවෙන් ඔබ්බටද, ඇතැම් ග්‍රන්ථි මෙන්ම ස්නායු පද්ධතියද අඩු වේගයකින් නොකඩවා පරිණත භාවයට පත් වෙයි.

කාර්මිකරණය වූ සමාජයන්හි කාන්තාවකගේ සාමාන්‍ය උස මීටර් 1.6 කි. පිරිමියෙකුට එය 1.77 ක් වේ. එතරම් උසස් පෝෂණ තත්වයක් සහ සෞඛ්‍ය සේවාවක් නොමැති තැන්හි මිනිසුන් එතරම් උසට නොවැඩෙති. සාමාන්‍ය ශරීර බර, කාන්තාවන්ගේ කි.ග්‍රෑ. 54 ක් පමණද, පිරිමින්ගේ කි.ග්‍රෑ. 75 ක් පමණද වේ. විවිධ ප්‍රමාණයෙන් යුත් පුද්ගලයන්ගේ බර කොපමණදැයි අපි සැවොම දකිමු. එහෙත් ශරීරයේ ඒ ඒ කොටසින් එහි සමස්ථ බරට දයක වන බර ප්‍රමාණ පිළිබඳ දැනුම වඩාත් සිත් ඇද ගන්නකි.

බරින් කි.ග්‍රෑ. 73 ක් පමණ වන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ මිනිසෙකුට අදාළ සන්සන්දනාත්මක බර ප්‍රමාණයන් අපට මෙහිදී දැකිය හැකිය.

දියුණු රටවල, වැඩිදියුණු වූ ජීවන තත්වයන් සහ වෛද්‍ය ආරක්‍ෂක ක්‍රම හේතුකොටගෙන මිනිසාගේ ජීවිත කාලය වසර 70 කට අධික වෙයි. අප, ජීවිතය ඉතා කෙටි යයි බොහෝ විට දෙමින් පහළ කළද, ලොව වැඩිම ආයු කාලයක් හුක්ති විදින සත්ත්වයා මිනිසා වෙයි. මිනිසාගේ ආයු කාලය ඉක්මවා ජීවත් වනුයේ වසර 150 ක් ජීවත්වන සුවිශාල ඉබ්බන් පමණකි. සන්සන්දනාත්මකව බලන කළ අලියාට ඇත්තේ වසර 80 ක ජීවිත කාලයකි. සිංහයාට වසර 30 කි. බල්ලාට වසර 20 කි. හාවාට වසර 12 කි. මේ අතර මදුරුවාට එක දිනකි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න වර්ධනය ඉතාම වැදගත් සාධකයක් වුවත් එය යෞවනයේ එක් සංරචකයක් පමණි. තාරුණ්‍යයේ මනා සෞඛ්‍යය රඳ පවත්නේ මැනවින් පෝෂිත වූත්, තුලනාත්මක වශයෙන් බරපතල එමෙන්ම දුබලතාවන්ට තුඩු දෙන ආසාදනයන්ගෙන් සහ ආබාධයන්ගෙන් තොරවූත්, ළමා වියක් මතය.

ඔබගේ සිරුර රැකබලා ගැනීම

භෞතික වශයෙන් අකල් හෝ අනුවිත ජීවාවක් ඇතිවීම, සාමාන්‍ය ආහාර ප්‍රමාණවත් නොවීම, සහ වැඩෙන සිරුරට ශාරීරික වර්ධනය සහ තාරුණ්‍යයේ විකාශනය කෙරෙහි අයහපත් අන්දමින් බලපානු ඇත. මනා සෞඛ්‍යය රැකගැනීම සඳහා ආහාරය ඉතා වැදගත් වෙයි. පැණිරස කැම, අයිස්ක්‍රීම්, කොකා කෝලා සහ අර්තාපල් 'විජ' වැනි සිල්ලර කැවිලි වලින් ශාරීරික ව්‍යුහය, සෛල ප්‍රතිරෝධතාව සහ අවන්වැඩියාව පිළිබඳ පේච්ඡ පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පරිදි පෝෂ්‍ය ගුණයෙන් යුත් ආහාර ප්‍රවාහයක් නොලැබෙයි. ශරීර වර්ධනයට අදාළ ප්‍රකට පෝෂ්‍ය පදාර්ථ " කාණ්ඩ " නම් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ග, ප්‍රෝටීන් හා මේද, විටමින් සහ බහිෂ් පදාර්ථ වැනි අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පුළුල් පරාසය, තත්තු සහ ජලයයි.

ව්‍යායාමය මගින්ද ශරීරයේ මනා තත්වය සුරැකේ. එමගින් ඔබගේ හෘදය වස්තුවෙහි සහ පෙනහළුවල පේශි ශක්තිමත් කරනු ලැබේ. ඔබගේ සෞඛ්‍යය රැක ගැනීම

නව යෞවනයින් ශාරීරික වශයෙන් පරිනතව වෛතසික හැකියාවන් වර්ධනය වන විට

ජීව ගැලපෙන ලෙස
ආවේගයන්හි පරිනත භාවය
ඇතිවේ. ඔවුන්ට තමන්ගේ
ස්වාධීනත්වය තහවුරු කර
ගැනීමටත් තමන්ගේම
තිරණයන්ට එළඹීමටත්
තමන්ගේ වැරදි වලින් පාඩම්
ඉගෙන ගැනීමටත් අවශ්‍යතාව
ඇතිවේ. ඔවුහු බොහෝවිට තම
දෙමාපියන්ගේ ජීවන රටාවට
හාත්පසින්ම වෙනස් ජීවන
අගයන් තෝරා ගනිති.

සඳහා කළ හැකි කාර්යයන් රැසක් වේ. නීතිපතා දත්ත වෛද්‍යවරයකු වෙත යාමෙන් දත් සහ විදුරුමස්වල සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව තහවුරු කරගත හැකිය. අසම් වෛද්‍යවරයකු ලවා ඔබගේ ඇස් පරීක්ෂා කරවා ගන්න. ක්ෂය රෝගය, කක්කල් කැස්ස, පිටගැස්ම, පෝලියෝ වැනි වැළැක්විය හැකි රෝගයන්ට එරෙහිව අවශ්‍ය සියළු එන්නත් නොවරදවා ලබා ගන්න.

දරුවන් දයාවෙන් රැකබලා ගන්නා එමෙන්ම සුදුසු සීමාවන් සහිතව, ක්‍රමයෙන් වැඩි නිදහසකට දිරිදෙන ස්ථාවර ගෘහස්ථ පරිසරයක් තිබීමෙන් ආත්ම ගෞරවයක්ද එමගින් මනා සෞඛ්‍යයද ඇතිවීමෙන්, පාසැලෙහිදීත්, වැඩකරන ස්ථානයේදීත්, ක්‍රීඩාවේදීත්, නව සම්බන්ධතාවයන්හිදීත් වැඩි ජයග්‍රහණයක් අත්වනු ඇත. පවුලෙහි අස්ථායීතාව පරිසරයේ දැඩි සංවිධානාත්මක බලපෑම් ජ්‍යාබද්ධ වීමෙන්, දුම්කොළ, මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය යනාදිය භාවිතයට සහ ජීවාට ඇබ්බැහිවීමටත්, ආහාර ගැනීමේ හා මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ අයහපත් පුරුදු වලටත්, මනාමාර්ගයේ දී, සේවා ස්ථානයේ දී, නිවසේ දී සහ විවේක කටයුතු වලදීත් අධික අතතුරුදයක තත්වයන්ට තමන්ගාජනය කරගැනීමටත්, තමන්ට හෝ අන්‍යයන්ට හිතාමතා

දරුණුකම් කිරීමටත්, මානසික බිඳ වැටීම වලටත් මග පෑදේ.

මිනිස් සංඛ්‍යා

අපගේ ශරීර, වැඩි වර්ධනය වන අතර, මිනිස් ජනගහනයද වැඩි වෙමින් පවතී. ලෝක ජනගහනය බිලියනයක් දක්වා වැඩිවීමට වසර 1830 ක් ගත විය. ඉන්පසු එය බිලියන දෙකක් බවට පත්වීමට වසර 100 ක් (1930 වන විට) ගත විය. තවත් වසර 30 ක් ගත වූ විට 1980 වන විට ජනගහනය තුන්වන බිලියනයට ලඟා විය. වසර 15 කට පසු, 1975 වන විට ජනගහනය බිලියන 4 ක් දක්වා වැඩි වූ අතර, වසර 12 කට පසු 1987 වන විට බිලියන 5 ක් දක්වාද වැඩිවිය. 1998 වන විට ලෝක ජනගහනය බිලියන 6 ක් දක්වා වැඩිවනු ඇති බවට අනාවැකි පළ කෙරේ. ලෝක බැංකුවට අනුව 1995 වන විට වයස 15-19 අතර තරුණ පිරිස දශලක්ෂ 512 ක් වනු ඇත. ඒ අතුරින් දශලක්ෂ 262 ක් පිරිමි ළමුන්ද, දශලක්ෂ 250 ක් ගැහැණු ළමුන්ද වනු ඇති අතර මොවුන්ගෙන් දශලක්ෂ 428 ක් (සියයට 8 ක්) සංවර්ධනය වන්නාවූ රටවල වෙසෙනු ඇත.

ලෝකයේ ජනගහනය, වසරකට බිලියන 90 කට අධික ප්‍රමාණයකින් වැඩිවන අතර, මෙම වර්ධන වේගය යටත් පිරිසෙයින් මෙම ශතවර්ෂය අවසානය වන තෙක් හෝ අබන්ධව පවතිනු ඇත. සීඝ්‍ර ජනගහනය වර්ධනයට හේතුවන සාධක රාශියකි. මරණ සංඛ්‍යාව වේගයෙන් පහත වැටෙන අතර, උපත් සංඛ්‍යාවෙහි එතරම් කැපී පෙනෙන පහත වැටීමක් සිදු නොවීම මෙබඳු හේතුවට එක් නිදර්ශනයකි.

සාප්ලයතාවයෙන් යුත් යුවලක් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි විකල්ප තත්වයන් සලකා බලමු. යුවලකට දරුවන් සතර දෙනෙකු බිහිවී, එම දරුවන්ටද, එම දරුවන්ගේ දරුවන්ටද දරුවන් සතර දෙනෙකු බැගින් සිටියහොත් මුලින් කි යුවලට මී මුණුබුරන් මිනිබිරියන් 64 ($4 \times 4 \times 4 = 64$) ක් වනු ඇත. ඒ වෙනුවට මෙම යුවලට දරුවෝ දෙදෙනෙක් පමණක් සිටියානම්, ඔවුන්ට සිටිනු ඇත්තේ මී මුණුබුරන් 8 ($2 \times 2 \times 2 = 8$) ක් පමණි. මෙසේ සාප්ලයතාව පිළිබඳ සුළු වෙනසක් වූ, දශක කිහිපයක් තුළ විශාල වෙනසක් බවට පත් වෙයි. මූල්‍ය ඉතුරුම් වලට වැල් පොළි එකතු කිරීමේදී මෙන්, අධික

සාප්‍රයතාවය සඳ වර්ධනයවන අනාගත ජනගහනයකට තුඩු දෙයි.



විශාල පවුල් සහ සිඳු ජනගහණ වර්ධනය

මේ අනුව අනාගතය කෙබඳුවේද? සෑම දවසකටම ලෝකයේ ජනගහනය මිනිසුන් 250,000 කින් පමණ වැඩිවෙයි. මේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම ආහාර, නිවහන්, බලශක්තිය සහ ජලය අවශ්‍යතාවන් සඳහා මිනිතලයේ සම්පත් වලින් යම් කොටසක් අවශ්‍ය වෙයි. වසර 31 තරම් කෙටි කාලයකින්, එනම් 2025 වසර වන විට මිනිසුන් සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සංඛ්‍යාව මෙන් 50% කින් වැඩිවනු ඇත. ඒ මෙතෙක්

මෙතරම් කෙටි කාලයක් තුළ දක්නට ලැබී ඇති විශාලතම ජනගහන වර්ධනය වනු ඇත. මෙම දශකයේ අවසානය වන විට, ලෝකයේ සංවර්ධනය වන රටවලින් අඩකට වැඩි සංඛ්‍යාවකට තම රටෙහි ගම්පෝත්තමත්ගේම ජනගහනයට ආහාර සැපයීමට නොහැකි වනු ඇත. ලෝකයේ ජනගහනයෙන් අඩක් පමණ වූ සංඛ්‍යාවකට, ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්ධන දැව නොමැතිවනු ඇත. දශක තුනක් ඇතුළත සංවර්ධනය වන රටවල බලශක්ති භාවිතයෙන් තිකුත්වන කාබන-ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය තුන් ගුණයක් වනු ඇත. දශක හතරක් පමණ තුළ, වහා ලබාගත හැකි තෙල් සැපයුම නිමාවට පත්වනු ඇත. එමගින් සාගර ජල මට්ටම

මීටරයකින් ඉහළ යාමෙන්, දශලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවට උත්තිටිතෑන් අහිමි කරමින් වෙරළන ජලගැලීම් හට ගනු ඇත.

අප වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න වූත් ඵලදායීවූත් වැඩුණු මිනිසුන් බවට පත්වනු පිණිස අපගේ වැඩිම සහ වර්ධනය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. එසේම අද වෙසෙන කරුණ පිරිසටත්, අනාගත පරම්පරාවන්හි තරුණ පිරිස් වලටත් ලෝකය වඩාත් යහපත් ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම පිණිස ලෝක ජනගහන වර්ධනය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.



- මාංශ පේශි කි.ගු. 31.4
- අස්ථි කි.ගු. 10.2
- මේද කි.ගු. 10.2
- ඇතුල් අවයව කි.ගු. 8.7
- සම්බන්ධීකරණ පටක කි.ගු. 6.6
- රුධිරය කි.ගු. 5.9

කිලෝ ග්‍රෑම් 73 ක් බර මිනිසෙකුගේ ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස්වල තිබිය යුතු බර :

අයඩින් උණනාව

- ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු පෝෂණ ගැටළුවක්

දුලිතා එන්. ප්‍රනාන්දු,
වෛද්‍ය පීඨය,
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය.

අයඩින් මිනිසාට වැදගත් වූ සෘජු පෝෂණ පදාර්ථයකි. මිනිස් සිරුරෙහි නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි මෙම ද්‍රව්‍යය ආහාරය සමග සුළු ප්‍රමාණයන්ගෙන් ශරීරයට සැපයිය යුතුය. අයඩින් උණනාවයෙහි ප්‍රතිඵල සහ අයඩින් උණනාවයට ආහාර මගින් ප්‍රතිකර්ම කිරීම පිළිබඳව අතීතයේ සිටම දැන සිටීම නිසා, එය මූලික හඳුනාගත් පෝෂණයට අදාළ රෝගය වෙයි.


අයඩින්වල පරිවෘත්තිය සහ අයඩින් උණනාවයෙහි ප්‍රතිවිපාක

මිනිස් සිරුරට අවශ්‍ය අයඩින් ආහාරය මගින් සැපයිය යුතුය. කුඩා බඩවැල් වලින් අවශෝෂණය කර ගන්නා ආහාරයෙන්, කාබනික අයඩයිඩ් වශයෙන් ලැබෙන අයඩින් වලින් අඩක් පමණ තයිරොසීඩ් ග්‍රන්ථිය උකහාගෙන, එකිනෙක හා සම්බන්ධ හෝමෝන් වර්ග දෙකක් වන ට්‍රයි අයඩොතයිරොනින් (T3) සහ ටෙට්‍රාඅයඩොතයිරොනින් (T4) යන හෝමෝන දෙවර්ගයේ පූර්වගාමිකයින් සෑදීම සඳහා ප්‍රෝටීන් (thyroglobulin) වලට ඇතුළත් කෙරෙන මෙම හෝමෝන, තයිරොසීඩ් උත්තේජනය කරන හෝමෝන (T.S.H) මගින් පාලනය වන විවිධ උත්ප්‍රේරක වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් තයිරොසීඩ් ග්‍රන්ථිය මගින් ලේ වලට නිකුත් කරනු ලබයි. අයඩින් උණනාව ඇතිවූ විට තයිරොසීඩ් හෝමෝන සංස්ලේශනය සහ ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙයි. එහෙයින් තයිරොසීඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරීත්වය මැණීම සඳහා ලේවල T3

සහ T4 මට්ටම් සහ TSH මට්ටම් උපයෝගී කරගනු ලැබේ. තයිරොසීඩ් හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ යන්ත්‍රණය තවමත් මුළුමනින්ම වටහාගෙන නැතත්, තයිරොසීඩ් උණනාවයෙහි ප්‍රතිඵල මැනවින් විස්තර කරනු ලැබ ඇත. උණ හෝමෝන සංලේෂණයෙහි එක් ප්‍රතිඵලයක් නම්, තයිරොසීඩ් ග්‍රන්ථිය විශාල වීමයි. එහෙයින් අයඩින් උණනාව පිළිබඳ ප්‍රධානතම සායනික ලක්ෂණය වන්නේ ගලගණ්ඩය (goitre) නමින් හඳින්වෙන විශාල වූ තයිරොසීඩ් ග්‍රන්ථියක් තිබීමය.

ලෝක අයඩින් උණනාව
පිළිබඳව කරන ලද
සමීක්ෂණයන්ගෙන් සංවර්ධනය
වන රටවල දශ ලක්ෂ 200 ක්
පමණ අයඩින් උණනාවෙන්
පෙළෙන අතර, තවත් දශ ලක්ෂ
800 ක් ඊට ගොදුරුවීමේ
අතතුරට මුහුණ පා සිටින බව
ගණන් බලා ඇත. සංවර්ධනය
වන රටවල අයඩින් උණනාව
නිසා ඇතිවන රෝග ඇති ප්‍රදේශ
1 වන රූප සටහනින් පෙන්වුම්
කර ඇත.

තයිරොසීඩ් හෝමෝන, ශරීරය මුළුල්ලේම පුළුල් ලෙස බලපෑම් ඇති කරයි. ඒවා පරිවෘත්තනික වේගය, ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණය, එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය, සෛල පරිවහනය සහ වෙනත් ගෞතවේදීය ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි. ඒවා තයිරොසීඩ් උණනාව, ශරීර වර්ධනය හිත කරමින් ලමයින්ගේ වැඩිම කෙරෙහි නිශ්චිත බලපෑම් ඇති කරයි. ජීවිතය මුළුල්ලේම මනා බුද්ධිමය ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා තයිරොසීඩ් හෝමෝන සාමාන්‍ය මට්ටමකට පැවතිය යුතුය. මන්ද තයිරොසීඩ්තාව උදසින භාවයට හේතු වේයැයි සැලකේ. සාමාන්‍ය තයිරොසීඩ් ක්‍රියාකාරීත්වය යළි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය නැවත සාමාන්‍ය තත්වයට පත් කළ හැකි බැවින් යටත් පිරිසෙයින් වැඩිහිටියන් තුළ මෙම බලපෑම දුරු කිරීමට හැකි වීමට ඉඩ ඇත. වර්ධනයේ වැදගත් අදියරයන්හිදී අඩු තයිරොසීඩ් ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වීමෙන්, නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි අන්දමට මොළයට හානි සිදු වෙයි. ක්‍රෙටිනිකාව (cretinism) සහ ගොර්බ් (deaf mutism) එහි උපරිම අවස්ථා වෙයි. මෙය හුණය පිළිසිඳගත් වහාම මවක තුළ මන්ද තයිරොසීඩ්තාව ඇති වීමෙන් හට ගන්නා දුබලතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සිදුවිය හැකිය. ඊට වඩා අඩු මට්ටමකට මොළයට සිදුවන හානි, බිහිරි බව මන්දබුද්ධිකත්වය සහ අඩු බුද්ධිමය මට්ටමක් තුළින් පිළිබිඹු විය හැකිය.



කිසියම් ප්‍රදේශයක ගලගණ්ඩය, එනම් තයිරොසිඩ් ග්‍රන්ථිය විශාලවීම, 10% ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට, රෝගය එම ප්‍රදේශයට ආවේනික යයි සලකනු ලැබේ. එබඳු ප්‍රදේශයන්හි අයඩින් පරිභෝජනය සාමාන්‍යයෙන් දිනකට mg. 50 කට අඩුය. පරිභෝජනය සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රමාණය දිනකට mg. 150-300 අතර ප්‍රමාණයකි. ගලගණ්ඩය 30% කට වැඩිවූ විට, ජනගහණයෙන් 5-10% අතර ප්‍රමාණයකට ශාරීරික වර්ධනයේ අසාමාන්‍යතා ආශ්‍රිතව දැඩි එමෙන්ම සුවකළ නොහැකි අන්දමේ මන්ද බුද්ධිකතාව ඇතිවිය හැකිය. මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ ආවේනික ක්‍රෝමනාව යනුවෙනි.

හුණ අවස්ථාවේදී සිදුවන මරණ, අප්ට උපත්, ලදරු හා ළමා අවධියේදී සිදුවන මරණ සහ වර්ධනයේ අසාමාන්‍යතා වැඩිවීම යනාදිය අයඩින් උණ්ණතාවය නිසා සිදුවන බැව් පෙනී ගොස් ඇත. ගොඵ බිහිරියාව හට ගැනීම, අයඩින් උණ්ණතාව නිසා ඇතිවන ආබාධයන්හි දරුණුතාවය පෙන්නුම් කරන දර්ශකයක් ලෙස හඳුන්වා ඇත.

මෑත අවදියේදී, අඩු ප්‍රමාණයක අයඩින් උණ්ණතා මට්ටම් හේතුකොටගෙන ඇතිවන හානි කෙරෙහි අවධානය විශාල වශයෙන් යොමු වී ඇත. ආවේනික ගලගණ්ඩ රෝගයෙන් පෙළෙන ජන සමූහයක සියළුම සාමාජිකයින් ඔවුන්ගේ වර්ධන සමයේදී උප ප්‍රශස්ථ තයිරොසිඩ් හෝමෝන මට්ටම් වලට නිරාවරණය වෙයි. මෙය පොදුවේ සමාජයේ ගුණාත්මක මට්ටම කෙරෙහි බලවත් එහෙත් සියුම් අන්දමින් බලපානු ඇත. වාලකත්වය, ස්වායත්තතාව,

නිර්මාණශීලීත්වය සහ බුද්ධිය එමගින් හිත වන බැව් වාර්තා වී ඇත. මෙසේ අයඩින් උණ්ණතාවය මගින් විවිධ උප සායනික බලපෑම් රාශියකට මග පෑදෙයි. එහෙයින් අයඩින් උණ්ණතාවයෙන් පෙළෙන මට්ටමට උපදින දරුවන් වර්ධනය අතින් අයහපත් තත්වයකට මුහුණපාති. එයින් ඔවුන්ගේ මානසික හා ශාරීරික වර්ධනයට හානි පෑමේ, පුද්ගලයාගේ සහ පුද්ගලයා අයත් ජන සමූහයේ ප්‍රගති වේගය හීන වෙයි.

අයඩින් උණ්ණතාවයට හේතු.

අයඩින් උණ්ණතාවට වඩාත්ම සුලභ හේතු වන්නේ පරිසරයේ මෙම අත්‍යවශ්‍ය පදාර්ථය හීනවීම නිසා. ශරීරයට ඇතුළත් කර ගැනෙන අයඩින් ප්‍රමාණය අඩුවීමයි. මෙය සිදු වන්නේ, විශේෂයෙන්ම කඳුකර ප්‍රදේශවල, අධික වර්ෂාව මගින් පසෙහි අයඩින් ක්ෂරණය වී යාමෙනි. අයඩින් පරිවෘත්තියට බාධා කරන ගොඩිට්‍රල් නැමති ද්‍රව්‍යය, සුලභව හාවිතා වන ඇතුම් ආහාර වර්ගවල අන්තර්ගත වෙයි. මඤ්ඤාකාංගවල ඇති ලිතමරින් මෙබඳු ද්‍රව්‍යයකි. ජලයේ බැක්ටීරියා ද්‍රාවකයන්හිද, කාර්මික දූෂකයන්හි ගොඩිට්‍රල් සහ/හෝ ප්‍රති තයිරොසිඩ් බලපෑම් ඇති කරන ද්‍රව්‍යය කිහිපයක්ම අන්තර්ගතව ඇත.

විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන් ශක්තිය පිළිබඳ මන්දපෝෂණය සහ විටමින් 'A' උණ්ණතාව නිසා වැළඳෙන මන්දපෝෂණයන්ගෙන් අයඩින් පෝෂණ තත්වය කෙරෙහි ද්විතීය බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය. තයිරොසිඩ් ග්‍රන්ථියට ලැබෙන අයඩින් ප්‍රමාණය ආහාර පිළිබඳ හෝ වෙනත් සාධක හේතුකොටගෙන වෙනස් විය හැකිය.


විශේෂයෙන්ම ශරීරයට අයඩින් ආත්තික ප්‍රමාණයක් ගනු ලබන විටත් ආහාර රටාවන්හි විවිධත්වය අඩුවූ විටත් මෙය සිදුවේ.

ගැටළුවේ ප්‍රමාණය

ලෝක අයඩින් උණ්ණතාව පිළිබඳව කරන ලද සමීක්ෂණයන්ගෙන් සංවර්ධනය වන රටවල දශ ලක්ෂ 200 ක් පමණ අයඩින් උණ්ණතාවෙන් පෙළෙන අතර, තවත් දශ ලක්ෂ 800 ක් ඊට ගොදුරුවීමේ අනතුරට මුහුණ පා සිටින බව ගණන් බලා ඇත. සංවර්ධනය වන රටවල අයඩින් උණ්ණතාව නිසා ඇතිවන රෝග ඇති ප්‍රදේශ 1 වන රූප සටහනින් පෙන්නුම් කර ඇත.

ගලගණ්ඩය (පැවැත්ම) පිළිබඳ දත්තයන්ගෙන්, අයඩින් උණ්ණතාව ආශ්‍රිත රෝගයන්ගේ සමස්ථ පරිමාණය අඩුවෙන් පිළිබිඹු විය හැකි වුවද ජනසමූහයන් පිළිබඳව කරන ලද සමීක්ෂණයන්හිදී ආපතන ප්‍රමාණය (occurrence) අයඩින් උණ්ණතාව පිළිබඳ දර්ශකයක් වශයෙන් සලකනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අයඩින් උණ්ණතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මූලික වාර්තා වූයේ 1947 වර්ෂය තරම් ඈතදීය. 1987 දී අවසන් වරට පවත්වන ලද සමීක්ෂණයෙන්, අයඩින් උණ්ණතාව තවදුරටත් රටෙහි ඇතුළු ප්‍රදේශවලට බලපාන වැදගත් කමින් යුත් පෝෂණ උණ්ණතාවක් වන බව පෙන්නුම් කර ඇත. උතුර හා දකුණ හැරුණු කොට ශ්‍රී ලංකාවේ සෙසු සියළු දිස්ත්‍රික්කවල පාසැල් සිසුන් අතර ගලගණ්ඩ ආපතනය (occurrence) පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵල 1 වන වගුවෙහි සාරාංශ කොට දක්වා ඇත.

රූප සටහන 1 - සංවර්ධනය වන රටවල අයඩින් ඌණතාවයේ පැතිරීම



මූලාශ්‍රය ACCISCN 1987

අයඩින් ඌණතාව ආශ්‍රිත රෝග වැළැක්වීම සහ මර්දනය

අයඩින් ඌණතාව මිනිසාගේ වර්ධනයට බාධාවක් කොට සැලකෙන බැවින් එය මර්දනය කිරීම වැදගත් වෙයි. මෙය සෑම වයස් කාණ්ඩයකටම බලපාන ප්‍රධාන පෙළේ පෝෂණ ගැටළුවක් වුවද, එය සාර්ථකව සහ වැඩි විශදමකින් තොරව මර්දනය කිරීමේ හැකියාව ඇත. වඩාත්ම විශදම අඩු වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ක්‍රමය වී ඇත්තේ ලුණු වලට අයඩින් යෙදීමෙන් ජනතාවට ශරීරගත වන අයඩින් ප්‍රමාණ වැඩි කිරීමයි. විශේෂයෙන්ම රෝගය තදබලව පවතින ඇතැම් රටවල මේ සඳහා අනුගමනය කර ඇති තවත් ක්‍රමයක් නම්, කලින් කලට අයඩින් මිශ්‍ර තෙල් පරිභෝජනය කරවීමයි.

පාසැල් සිසුන් අතර ගලගණ්ඩය 5-20% දක්වා වන රටවල, සමස්ත ජනගහනයටම, අයඩින් mg/kg. (හෝ දශ ලක්ෂයට කොටස්) 10-25 දක්වා වූ

සාන්ද්‍රණයන්ගෙන් සුන් අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු ලබාදීමෙන්, සාර්ථක මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. ලුණු වලට අයඩින් යෙදීමේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය එමෙන්ම සරලතම ක්‍රමය වන්නේ වැස්සුමක් (drip) හෝ ඉස්ත්‍රණයක් (spray) වශයෙන් අයඩින් සාන්ද්‍රණයක් යෙදීමයි. එසේ කර හොඳින් විශර්චද ලුණු වල අප ද්‍රව්‍ය නොමැතිව, මද වශයෙන් ක්ෂාරක pH අගයකින් යුක්තව ඇති පොටෑසියම් අයඩයිඩ් ඉතා උචිත මෙන්ම මැනවින් ස්ථාවර වනු ඇත.

ලුණු, අයඩින් වලින් ප්‍රබල කිරීමේ වැඩසටහනක් සාර්ථක වීමට නම්, ජනසමූහයකට සැපයෙන ලුණු සියල්ලටම අයඩින් යෙදීම අවශ්‍ය වෙයි. එසේ ලුණු නිශ්පාදනය කිරීම හා අයඩින් ඌණතාවෙන් පෙළෙන ජනයා වෙත ජීවා බෙද හැරීම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න පැන නැගිය හැකිය. ලුණු වලට අයඩින් මිශ්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන් ශ්‍රී ලංකාවේ වසර කිහිපයක සිටම ක්‍රියාත්මක වී ඇත. එහෙත් නිෂ්පාදනයට සහ බෙද හැරීමට මෙන්ම

පරිභෝජන රටාවට අදාළ හේතු කිහිපයක් තිසා, අයඩින් ඌණතා උවදුරට මුහුණ පා සිටින සියළුම කොටස් විසින් අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු පරිභෝජනය කරන බැව් සහතික කරගැනීමට නොහැකි වී ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධනයන් ඇති කිරීමට, එබඳු වැඩසටහන් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ රටවල අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

ලුණු වලට අයඩින් යෙදීමෙන් ඇතිවී තිබෙන ප්‍රධානතම උපද්‍රවය, නම් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙහි අධික ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා හට ගන්නා විෂ වීමයි. උදා: (thyrotoxicosis) මෙබඳු ප්‍රතිඵල ප්‍රධාන වශයෙන්ම වාර්තා වී ඇත්තේ වයස අවුරුදු 40 ඉක්මවූවන්ට අදාලවය. මෙය හට ගන්නේ දිස් කාලයක් අයඩින් ඌණතාවයෙන් පෙළීම නිසා ඇතිවන autonomous තයිරොයිඩ් හේතුවෙනි.

වරින්වර අයඩින් මිශ්‍ර තෙල් එන්නත් මාර්ගයෙන් ලබාදීමේ අගය මූලික තහවුරු වූයේ පැසුරා නිව්ගිති රටෙහිය. එහෙත් මෙය ලොව පුරා රටවල්

සාපැල් සිසුන් අතර ගලගන්විය පැතිරීමේ ප්‍රමාණය - 1987
(උතුරු සහ කැගෙනහිර පළාත් අත්හැර)

පැතිරුනු ප්‍රදේශ	පැතිරීමේ ප්‍රමාණය	දිස්ත්‍රික්ක
අඩු	10% ට අඩු	කොළඹ, අනුරාධපුර පොළොන්නරුව, මාතලේ
මධ්‍යම	10% - 20%	ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට පුත්තලම, කුරුණෑගල, ගම්පහ
වැඩි	20% ට වැඩි	මහනුවර, කෑගල්ල, බදුල්ල, නුවරඑළිය, රත්නපුර, කළුතර, මොණරාගල


ගණනාවක අනුගමනය කරනු ලැබ ඇත. මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන්ම කළුතර ප්‍රදේශවල තනිවූ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල, ගලගන්විය ආවේණික කොටගත්, එනම් 30% කට වැඩියෙන් පවත්නා ප්‍රදේශ සඳහා මෙම ක්‍රමය යෝග්‍ය වෙයි. ඒ සඳහා සුදුසු ප්‍රදේශයක, අයදුම් උපකරණවලට පහසුවෙන් ගොදුරුවිය හැකි ජන කොටස් වලට, තෙල් එන්නත් කරනු ලැබේ. වසර 3-5 අතර කාලයකින් නැවතත් එබඳු එන්නතක් ලබාදිය යුතුය. මෙබඳු වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ප්‍රධාන ගැටළු නම්, එන්නත සඳහා වියදම සහ වරින්වර, එන්නත නැවත ලබාදීම සඳහා නිපුණ

යෝජකයින් අවශ්‍ය වීමය. අයදුම් මිශ්‍ර තෙල් මුළුයෙන් ගැනීමෙන් වසර 1-2 අතර කාලයක් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනු ඇත.

අයදුම් උපකරණවල වැළැක්වීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි වෙනත් ක්‍රම නම්, රෝගය ආවේණිකව පවත්නා ප්‍රදේශවල සුපුරුදු ආහාරය වෙනස්කම් වලට ගාජනය කිරීම, මිනිසා පරිභෝජනය කරන ආහාර වලට සහ ජලයට අයදුම් අතිරේක වශයෙන් එක් කිරීම සහ රෝගය ආවේණික ප්‍රදේශවල ඖෂධ වශයෙන් අයදුම් ලබා දීමයි.



කිසියම් ප්‍රදේශය ගලගන්විය, එනම් තයිෆොයිඩ් ග්‍රන්ථිය විශාලවීම, 10% ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට, රෝගය එම ප්‍රදේශයට ආවේණික යයි සලකනු ලැබේ. එබඳු ප්‍රදේශයන්හි අයදුම් පරිභෝජනය සාමාන්‍යයෙන් දිනකට mg. 50 කට අඩුය. පරිභෝජනය සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රමාණය දිනකට mg. 150-300 අතර ප්‍රමාණයකි. ගලගන්විය 30% කට වැඩිවූ විට, ජනගහණයේ 5-10% අතර ප්‍රමාණයකට ශාරීරික වර්ධනයේ අසාමාන්‍යතා ආශ්‍රිතව දැඩි එමෙන්ම සුවකළ නොහැකි අන්දමේ මන්ද බුද්ධිකතාව ඇතිවිය හැකිය. මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ ආවේණික ක්‍රෝමිකතාව යනුවෙනි.



නිවසේ ආරක්ෂාව

වි. සබාරත්නම්
කතෘ
කේළි නිපුණ

නම තුන් හැවිරිදි පුත් මංජුල පුෂ්ප කුමාරගේ මරණය පිළිබඳ දුක්මුසු කතාව විස්තර කළ ශ්‍රියාවතී සිහිපුත්තට ඇඳ වැටුණාය. අපි ජීවත් වන්නේ වැල්ලම්පිටියේ මගේ සහෝදරියගේ පවුලත් සමගයි. ඇය අතිරේක නාගරික මරණ පරීක්ෂක එඩ්වඩ් අහංගම මහතා ඉදිරියේදී පැවසුවාය. මුදවාපු කිරී විකුණන මගේ මස්සිනා පසුගිය 1994 පෙබරවාරි 28 වන දින අපි 2 ක් ගැඹුරු කල්දේරමක කිරී උතුරවා කාමරයක තිවේන්තට තබා තිබුණා. ටික වෙලාවකට පසු මගේ දරු දෙදෙනාගෙන් වැඩිමහල් පුතා කැගයන හඬක් ඇසුණා. මා ඇතුළට ගිය විට පුතා කල්දේරමට වැටී සිටිනු දුටුවා. මා ඔහුට එයින් එළියට ඇඳ ගන්නා. ඔහුගේ තම ගැලවී යත්ට පටන් ගන්නා. ඔහුට සෝද මම ඊජ්වේ ලමා රෝහලට ගෙන ගියා. සතියකට පසු ඔහු මිය ගියා.

වසර දෙකක් වයස ඇති ජයන්තියේ දෙමව්පියන් 1984 පෙබරවාරි මස 4 වන දින තවත් ආකාරයක පුවතක් සැල කරමින් ඇයට පුත්තලම රෝහල වෙත ගෙන ගියහ. ලමයා තම පියාගේ බෝල්පොයින්ට් පැන උදුරාගෙන තම මව වෙත දිව යමින් සිටියාය. අතරමගදී ඇය බිම ඇඳ වැටීමෙන් බෝල්පොයින්ට් පැන ඇස තුළට කාගෙන ගියේය.

1994 පෙබරවාරි 5 වන දින. මාතර මූලික රෝහලේදී මාස තවයක් වයසැති බිලිඳෙකු පිළිස්සුම් තුවාල වලින් මිය ගියේය. විජය කුමාරවෙදන් නිද සිටි තොටිල්ල මත කුප්පි ලාම්පුවක් පෙරළීමෙන් එය ගිණි ඇවිලිනි. මීට සති කිහිපයකට පෙර ඉරණවිල ප්‍රදේශයේ ලක්මාලි නම් එක් අවුරුදු දෙදරියක්

බංකුවක් මත තිබූ කුප්පි ලාම්පුවක් පෙරළා ගැනීමෙන් ඇයගේ ඇඳුම් වලට ගිනි ඇවිලිනි.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 25 වන දින පවුලක වැඩිමල් දරුවා පැට්ටෝල් මැක්ස් ලාම්පුවකට සුළං ගසමින් සිටියදී ලාම්පුව පිපිරීමෙන් එම පවුලේ දරුවන් 4 දෙනෙක් තුවාල ලැබූහ. අනෙකුත් ලමයින් වටේට සිට ලාම්පුවට සුළං ගසන දෙය බලා සිට ඇත. මෙය සිදුවූයේ පොළොන්නරුවේ සිලසුර නම් ගමේදීය.

මේ මා මැනදී පළවු පුවත්පත් බැලීමෙන් තෝරා ගත්. ලමා මරණ හා තුවාලවීම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති කිහිපයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ තිවේස් වල අනතුරු වලින් සිදුවන මරණ පිළිබඳව කිසිදු වැදගත් අධ්‍යයනයක් මෙතෙක් සිදු කර නැත. ඇමරිකාවේ අප්තින් කරන ලද අධ්‍යයනයකින්, එක්සත් ජනපදයේ ලමා මරණ වලට ප්‍රධාන හේතුව වශයෙන් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ නිවසේ සිදුවන අනතුරුය. සෑම වසරකම, වයස අවුරුදු 14 ට අඩු ලමයින් 8000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිවසේදී සිදුවන අනතුරු වලින් මියයන අතර, ලමුන් 50,000 ක් පමණ අංගවිපේදනයෙන් (අතපය කැඩීයාමෙන්) මිය යන බව එයින් හෙළිවේ. විෂ ශරීරගතවීම්, වැටීම්, දියේ ගිලීම්, පිළිස්සීම්, ගෙල මිරිකීම් සහ වාහන අනතුරු මේවාට තුඩුදෙන ප්‍රධාන හේතු වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පුවත්පත් වාර්තා විශ්ලේෂණයේදී, මෙහිදී ද ඒ හා සමාන තත්වයක් පවතින බවක් පෙනී යයි. මෙම උවදුරට වඩාත්ම ගොදුරු වන්නේ මාස 9 සහ වසර 5 අතර වයසේ දරුවන් බවද පෙනී යයි. විෂ ශරීරගත වීම වැඩි වශයෙන්ම සිදු වන්නේ වැරදීමෙනි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙමව්පියන්, භාරකරුවන්ගේ

දරුවන් තුළ දැඩි කුතුහලයක් ඇත.

ඔවුන් යම් යම් දේ ඉගෙන ගත්තේ එමගිනි.

දෙමව්පියන් විසින් ආරක්ෂා සහිතව කටයුතු කළ යුතුය.

නොසැලකිලිමත් භාවය නිසා මෙය සිදු වෙයි. දරුවන් සෑම දෙයකම රස බැලීමට කැමති බැව් දෙමාපියන් අවබෝධ කරගත යුතුය. එක් මවක් වැසිකිළිය පිරිසිදු කරමින් සිටියදී දෙරටුවෙහි සිනුව නාද විය. ඇය දෙර කරා ගොස් ආපසු එනවිට තම 18 මස වියැති දියණිය ප්‍රියත්තා, තමා බිම තබාගිය කොස්වික් සෝඩා වලින් මදක් ගෙන රස බලා ඇති බව දක්නට ලැබිණි. ඉන් ඇගේ දිව සහ උගුරේ කොටස් පිළිස්සී තිබිණ. මෙයින් දැරිය සති 8 ක් මුළුල්ලේ රෝහල් ගත කර තැබීමට සිදුවිය.


පරිත්‍යාස කිරීම, සේදීම සහ නිවෙස්වල කෘමීන් මර්ධනය සඳහාත්, විලවුන් වගයෙනුත් යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් වැඩි කොටස, දරුවන්ට භාහිරව වන බැව් දෙමාපියන් විසින් අවබෝධ කරගත යුතුය. සෝදන ද්‍රව්‍ය, විබාදක ද්‍රව්‍ය, දැව ගාණ්ඩ මප දමන පොලිෂ් වර්ග, විෂබීජ නාශක සබන් වර්ග, රූධුල බැමෙන් පසු ගල්වන ආලේප, සුවද විලවුන්, රූපාලංකරණ ද්‍රව්‍ය, කපුරු බෝල, බෙහෙත් වර්ග, කුඩා බැටරි, මදසාර, සිගරට්, ගිනිකුරු, පැට්‍රෝල්, සායම් වර්ග, වල්පැලැටි නාශක, මී නාශක, හුමිනෙල්, පොහොර වර්ග සහ අප නිවෙස්වල භාවිතා කරන වෙනත් බොහෝ දෑ විෂ සහිත වෙයි.

සෑම දෙමව්පියකු විසින්ම, නොවරදවාම පිළිපැදිය යුතු කරුණු තම මෙකී ද්‍රව්‍යය දරුවන්ට ලභාවිය නොහැකි තැන්වල තැබීම සහ ඒවායකුරු ලා ඇති ස්ථානයක තැබීමයි. කිසිම අවස්ථාවක පාවිච්චියට ගත් එබඳු ද්‍රව්‍ය බිම තොදමන්න, ආහාර පිසීමින් සිටි එක් මවක් සියඔලා ඇට කසල බාල්දියට දැමුවාය. දරුවා ඒවා ඇහිද සියඔලා ඇටයක් තාස්සුඩුවී දමා ගති. එය පිටතට නොඑන බැවින් දෙමව්පියෝ දරුවා වහා කළුබෝවිල රෝහලට ගෙනයන ලෙස උපදෙස් දුන්හ. අවුරුදු 3 ක් වයසැති තවත් දරුවෙක් තම මිත්තණිය පාවිච්චි කරන, පැණිරස ආලේපයක් සහිත බෙහෙත් පෙති දුටුවාය. දරුවා එම බෙහෙත් පෙති වලින් 8 ක් අනුගත කිරීම නිසා සෂණිකව රෝහලට ගෙන යාමට සිදු විය.

වැටීම, දරුවන්ට සිදුවන අනතුරු අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගනියි. තහරබද දරුවෝ මප දැමූ පොළොව මතුපිට හැරුණු ජලය මත ලිස්සා වැටීමෙන් ඔවුන්ගේ අත් කැඩෙයි. ගම්බද පෙදෙස්වල ලමයින් ගස්වලින් වැටීමෙන් ඔවුන්ගේ කකුල් කැඩෙයි. සීලා ජේර ගසකින් වැටී කළුගලක් මත පතිතවීමෙන් ඇයගේ කොන්ද සහ හිස්කබලද බිඳිණි. පොල් ගෙඩි හිස මත වැටීම නිසා ලමයින් මිය යන අවස්ථාද ඇත. ගයමස් වයසැති සාචිත්‍ර ප්‍රියංගනිට මෙවැන්නක් සිදුවිය. ඇයගේ දෙමව්පියෝ රුකියාවල යෙදෙති. ඇයගේ මිත්තණිය දැරිය තිටසට ගෙන යද්දී, පොල් ගෙඩියක් දැරියගේ හිස මත වැටී දැරිය මිය ගියාය. මෙය සිදු වූයේ දංකොටුවේදීය. බියගම, තුන්කැව්වර්දි ජාතකී මිදුලේ සෙල්ලම් කරමින් සිටියදී ඇයගේ හිසමතට පොල් ගෙඩියක් වැටීමෙන් ඇය එතැනම මිය ගියාය.

දියේ ගිලීමද ශ්‍රී ලංකාවේ සුලභව සිදුවන්නකි. මේනකාගේ දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉකුත් වසරේ නොවැම්බර් 30 වන දින වැල්ලම්පිටියේ තම ගෙමිදුලෙහි සෙල්ලම් කරමින් සිටියහ. සවස වැඩිමල් දරුවා පෙරලා පැමිණි මුත් අනෙක් දරුවා නොපැමිණියේය. "මම ලමයා සොයන්නට ගියා" මේනකා ඉකී ගැසුවාය. "ලමයා බැමීමක් නැති ලදක වැටී දියෙහි ගිලී සිටියා." ගංගා පොකුණ සහ වැව් වල ගිලීමද සුලභව සිදු වෙයි.

දරුවන් තුළ දැඩි කුතුහලයක් ඇත. ඔවුන් යම් යම් දේ ඉගෙන ගත්තේ එමගිනි. දෙමව්පියන් විසින් ආරක්ෂා සහිතව කටයුතු කළ යුතුය. ඩේවිඩ්ගේ මව මදක් ප්‍රවේශම් වූවා නම් 14 මසක් වයසැති ඔහු විදුලි සැරෙන් මිය නොයනු ඇත. කුඩා දරුවා විදුලි ජේනුව (electric plug) සමග සෙල්ලම් කිරීමට පුරුදුව සිටියේය. එදින උදෑසන ඩේවිඩ් තම කුඩා ඇඟිල්ල සිදුර තුළට ඔබන විට ස්විට්ස් ක්‍රියාත්මකව තිබිණි.



දරුවන් තුළ දැඩි කුතුහලයක් ඇත



ලමා මානසික රෝග හා නිවාරණය

කාන්තා නිලත්ති ගොඩමාන්ත
මහමායා බාලිකා මහා විද්‍යාලය
මහනුවර

යොවුන් ලේඛක තරඟය - 93 සඳහා
ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියකි.

නිරෝගී භාවය ලොකු කුඩා කාටත් ලද හැකි පරම ලාභය බව පුහුණු කීව යුතු නොවේ. මුළු ලොවම අවදියෙන් තබන කායික රෝග නිවාරණයට දෙවන අංකය ලැබිය යුතු වන්නේ මානසික රෝග මගින් කායික සුවයට එක එල්ලේ බලපෑම් ඇති කරන බැවිනි. අනාගත දරු උපතකට මවගේ ගර්භාශයත්, ශාරීරික හා මානසික පසුබිමත්, මව අවට පිරිවරත් සුදුනම් වනුයේ දරු පිළිසිඳ ගැනීමටත් පෙරාතුවය. කුළුල් දරු ප්‍රසූතියකට සුදුනම් වන මවක් නිසිලෙස දැනුවත් කිරීම වෛද්‍ය සායන වලින්ද, සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් විසින්ද අනිවාර්යෙන් කළ යුත්තකි. නමුත් මෙම දැනුවත් කිරීම කායික සෞඛ්‍ය රැක ගැනීම

පිළිබඳ පමණක් වීම යෝග්‍ය නොකරුණකි.

හිරු දුටු මල් කැකුළක් පරිණත පුෂ්පයක් බවට පත් වන්නේ අනන්තවූ විපර්යාස සමුදයකට ලක් වීමෙන් පසුවය. එසේම ලමා වියතුලද නොමේරු ලමයා විසින් ග්‍රහණය කරගනු ලබන අත්දැකීම් සියල්ල තිර ලෙස තැන්පත් වනුයේ ලමා මනස තුළය. අනාගතයේ බිහිවන මිනිසාගේ පෞරුෂය හා අධ්‍යාත්මික වර්ධනය සිදු වන්නේ ලමා අත්දැකීම් පදනම් කරගත් මනක ගබඩාවක් ලෙසිනි.

ලමා මානසික රෝගී තත්වයන් ඇති වන්නේ, දරුවා වෙත එල්ලවන බාහිර බලපෑමෙන්

ඔහු ආරක්ෂා කිරීමට යටිතින මගින් යොදනු ලබන ආරක්ෂක ක්‍රියාවලියක් ලෙසිනි. මෙය සියළුම සත්වයා උදෙසා ස්වභාව ධර්මයා විසින් යොදන ලද ස්වයං විරෝධීතාවයේ එක් එක් පියවරක් ලෙසද හඳුන්වාදිය හැකිය. ලමයා වටා සුරක්ෂිත මානසික වාතාවරණයකින් තොරවූ විටද, ආත්ම විශ්වාසය හීන වූ විටද, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වූ විටද, ලමයා විසින් පෙත්වනු ලබන ව්‍යාකූල හැසිරීම් රටාව මගින් ඔහුගේ මනසේ රෝගී බව හඳුනාගත හැක.

මෙලොව එළිය දුටුද පටන් සත්සත්ව පවතින ලමා මනස පීඩාවට පත්වන මුල්ම අවස්ථාව වන්නේ එම පවුලට බාල

සහෝදරයකු එක් වීමයි. මෙවන් විටෙක වැඩිමහල් දරුවා වෙත යොමු වන අවධානය හීනවීම දෙමාපියන් වෙතින් බොහෝ විට සිදුවන්නකි. අවුරුදු 3 - 7 දක්වා ළමුන් තුළ ඇතිවන අතිසි ගොත ගැසීම, නින්දෙන් ඇඳ තෙමීම, අධිකව කෝපවීම නිගැස්සීම හුදකලාවීම මෙලෙස දෙමාපියන් විසින් ගොඩනැගු අනාරක්ෂිත පරිසරය හේතුවෙන් ඇතිවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන ලදරු පාසල් වියේ හා පාසල් දිවිය අරඹන වයසේ ළමුන්ගෙන් 70% ක් පමණ පාසල් හිනිකාවට ගොදුරු වේ. දෙමාපියන්ගෙන් වෙන්වීමට ඇති අකමැත්ත හා එවිට ඇතිවන අනාරක්ෂිත හැඟීම, සාමූහික පරිසරයට

ගැමි සමාජය තුල
 "ගුහදෝෂ", "තනිකම්
 දෝෂ", "ප්‍රේත බැල්ම",
 "සත්තිය" ආදී, අත්වර්ථ
 තාමයන්ගෙන් හඳුන්වනු
 ලබන්නේද හොල්මන්
 හේතුවෙන් ඇතිවන
 සංසිද්ධිත්ය. මෙම
 තත්වයට බහුලව
 ගොදුරු වනුයේ වැඩිවිය
 පත්වීමට ආසන්න හෝ
 වැඩිවිය පත්වූ
 දැරියන්ය. මෙවැනි
 මානසික
 අසාමාන්‍යතාවන්
 ඇතිවීමට හේතු වන්නේ
 පාරම්පරිකව යටි සිතේ
 මුල්බැස පවතින
 "යක්ෂයින්", "ප්‍රේතයින්"
 මලගිය ආත්ම වැනි
 අතිසි බලවේගයන්ය.
 මනසේ පැන නගින
 හැගීම් අසමතුලිත වූ
 විට මේ අතිසි බලවේග
 මතු වීමෙන් මනස
 විකෘති වේ. මල්වර
 වියේදී ඉහළ යන අධික
 හෝමෝන සාන්ද්‍රණයත්,
 වැඩිහිටි සමාජය
 දැරියක වෙත යොදන
 අභවශ්‍ය රැකවල්
 ආදියත් මෙම මානසික
 අසමතුලිතතාවය ඇති
 කිරීමට හේතුවේ.

නුහුරුවීම, පාසල තුල නිදහස
 අඩුවීම, ලමයා පිඩාවට පත්
 කරයි. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්
 බොහෝ සිසුන් තම යොදුරු
 පාසල් දිවියට හුරු වෙති. නමුත්
 තත්වය බැරෑරුම් වන්නේ,
 මෙවැනි අවස්ථාවකදී ලමා
 මනසේ සමතුලිත තාවය බිඳී
 ගිය විටය. මෙහි ප්‍රථිපලය
 වන්නේ නිරෝගි ලමයා තුල
 අතියම් ආකාරයෙන් කායික
 රෝග ඇතිවීමය. වරින් වර
 ක්ලාන්තවීම, පාවනස හා
 වමනය, අධික හිසරදය වැනි
 රෝග ලක්ෂණ පාසල්
 ගිහිකාවට ගොදුරුවන ලමුන්
 තුල දක්නට ලැබේ. නිසි ප්‍රතිකාර
 නොලදහොත් දරුවාගේ
 අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල්
 වීමටද මෙම රෝග හේතුවිය
 හැකිය.

බාල වියේදී විභාග ගිහිකාවට
 ලක්වන සිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව
 සිසුයෙන් ඉහළ යාම නව
 ප්‍රවණතාවයක් වී තිබේ. එනම්
 5 වසර ගිණිත්වයේදීය. විභාග
 ගිහිකාවට ලක්වන සිසුන්ද
 ඉහතකී අන්දමේ කායික රෝග
 වලට ගොදුරු වේ. අධ්‍යාපනය
 ලදෙසා දෙමාපියන් විසින් ඇති
 කරන දැඩි පෙලඹවීම හා අධික
 තරඟකාරීත්වය හේතුවෙන්
 ලමයා තුල, ඔරොත්තු නොදෙන
 තරමේ මානසික ආතතියක්
 ඇතිවේ. කායික රෝග
 ඇතිවන්නේ මෙම ආතතිය
 හේතුවෙනි. ලමා වියේදී පළමු
 වරට විභාග ගිහිකාවට
 ගොදුරු වන ලමුන්
 නාගතයේදීද සාර්ථක ලෙස
 පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට
 අපොහොසත් වෙති. පාසල්
 ගිහිකාවට හා විභාග
 ගිහිකාවට ගොදුරුවන
 සිසුන්ගෙන් බහුතරයක් දක්ෂ
 සිසුන්වීමද යෝවනිය සිදුවීමකි.

කවුක, එමෙන්ම අප්‍රසන්න
 පරිසරයක හැදී වැඩෙන
 දරුවෝද මෙවැනිම මානසික
 රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරති.
 දෙමාපියන්ගේ අසමගිය,

පියාගේ අධික බිමන්කම,
 මාපියන් නීතියෙන් වෙන්ව සිටීම
 වැනි හේතූන් නිසා ලමුන් තුල
 විකෘති මානසික තත්ව ඇතිවේ.

ගැමි සමාජය තුල "ගුහදෝෂ",
 "තනිකම් දෝෂ", "ප්‍රේත බැල්ම",
 "සත්තිය" ආදී, අත්වර්ථ
 තාමයන්ගෙන් හඳුන්වනු
 ලබන්නේද හොල්මන් හේතුවෙන්
 ඇතිවන සංසිද්ධිත්ය. මෙම
 තත්වයට බහුලව ගොදුරු
 වනුයේ වැඩිවිය පත්වීමට
 ආසන්න හෝ වැඩිවිය පත්වූ
 දැරියන්ය. මෙවැනි මානසික
 අසාමාන්‍යතාවන් ඇතිවීමට
 හේතු වන්නේ පාරම්පරිකව යටි
 සිතේ මුල්බැස පවතින
 "යක්ෂයින්", "ප්‍රේතයින්" මලගිය
 ආත්ම වැනි අතිසි
 බලවේගයන්ය. මනසේ පැන
 නගින හැගීම් අසමතුලිත වූ
 විට මේ අතිසි බලවේග මතු
 වීමෙන් මනස විකෘති වේ.
 මල්වර වියේදී ඉහළ යන අධික
 හෝමෝන සාන්ද්‍රණයත්,
 වැඩිහිටි සමාජය දැරියක වෙත
 යොදන අභවශ්‍ය රැකවල්
 ආදියත් මෙම මානසික
 අසමතුලිතතාවය ඇති කිරීමට
 හේතුවේ.

නිරෝගි එමෙන් යහපත්
 පෞරුෂයකින් යුතු
 පුරවැසියෙකු ලොවට දයාද
 කිරීම මා-පිය දෙපලක විසින්
 සොබා දහමට ඉටුකරනු ලබන
 යුතු කමකි. වැඩෙන දරුවාගේ
 කායික සෞඛ්‍යය පිළිබඳ දැඩි
 අවධානයක් යොමු වන්නේ මේ
 හෙයිනි. සාක්ෂරතාවය
 ඉහළවීමත්, ජන සංඛ්‍යාවේදී
 මාධ්‍යයන්ගේ ව්‍යාප්තියත්,
 රජයේ භාස්වේච්ඡා සංවිධාන
 බහුලවීමත් හේතුවෙන් කායික
 රෝග නිවාරණය පිළිබඳ යම්
 දැනුමක් බහුතර ජනතාව තුල
 පවතී. නමුත් මානසික රෝග
 පිළිබඳ ජනතාවගේ දැනුවත්
 බව ඉතා අඩුය. මානසික
 වෛද්‍යවරු හා රෝහල් හිඟවීම,
 මනෝ වෛද්‍ය සායන නොමැති
 වීම මෙම නොදැනුවත් කමට

හේතු විය හැක.

සරල වර්ෂාන්තක ප්‍රතිකාර
 දමයක් මගින් බොහෝ විට
 ලමා මානසික රෝග මගහරවා
 ගත හැක. රෝගියා මෝහන
 නින්දාවට පත් කර යටි සිත
 අවදි කර ප්‍රතිකාර කිරීමද
 මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී බහුලව
 භාවිතාවන ප්‍රතිකාරක ක්‍රමයකි.
 විදුලිය හා කම්පන තරංග
 භාවිතයේදී මානසික රෝග
 වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සිදුකරයි.

පුද්ගලයෙකුගේ ලමා කාලය
 ඔහුගේ අනාගත වර්ෂා ධර්ම
 හා ගන්නා තීරණවල
 නිරවද්‍යතාව කෙරෙහි බලපාන
 බව වර්ෂ ගණනාවක් තුල
 කරන ලද පරීක්ෂණ වලින්
 සනාථ වී ඇත. ලොව ප්‍රසිද්ධ
 දමර්කයන්, මංකොල්ලකරුවන්
 හා මැර කල්ලි වල
 සාමාජිකයන්ගේ තොරතුරු
 අනුව ඔවුන්ගේ ලමා කාලය
 අප්‍රසන්න සිදුවීම් වලින් ගහණ
 බව ප්‍රකටය. මේ අනුව
 කෙළිලොල් ලමා දිවියේ සුවර්ත
 වර්ධනය සෘජු වශයෙන්
 නොවූවද, ජාතියේ ඉදිරි ගමනේ
 ජයග්‍රහණයකි. මේ අනුව සුමුදු
 මල් කැකුළු බඳු ලමුන්ගේ
 නිරෝගි මනස ආරක්ෂා කිරීම
 පුණ්‍යකර්මයක් බව වැඩිහිටි
 පරපුරට කියා දීමට කාලය
 උදව් ඇතැයි, මම ලොවට පසක්
 කරමි.

ජීවිතයක අවසානය ඒඩ්ස් මාරයා ද?

එම්.ඒ. චන්දිමා සුරංගි අමරසිරි

උසස් පෙළ (විදු)

ඩී.එස්. සේනානායක මධ්‍ය මහා විදුලය

මිරිගම.

යොවුන් ලේඛක තරගය - 1993 සඳහා ඉදිරිපත්
කරන ලද ලිපියකි.

ඒඩ්ස්..... යන වචනය ඇසූ පමණින්ම අප කාගේ වුවද සිත් තුල ගැස්මක් ඇති කරවන අකුරු තුනකි. කුමක්ද.....? මේ හයානක අකුරු තුන ඇති වෛරසය. කෙසේද එය ඇති වන්නේ.....? එසේ නම් සබඳ. මෙම අති හයානක ඒඩ්ස් රෝගය පිළිබඳ කරුණු බිඳක් අප දැන ගත යුතු කාලයයි.

ඒඩ්ස් රෝගය වනාහි අති විශේෂ වූ පරිණාමයකින් යුත් අන්‍යවශ්‍ය ලෝක සෞඛ්‍යය ප්‍රශ්නයකි. එය ලෝකයේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට විශාල අභියෝගයකි. සමාජීය, සංස්කෘතික හා ආර්ථික අංශ වලින් ඒඩ්ස් රෝගයට බලපෑම් අති විශාලය. ඒඩ්ස් රෝගය පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කරමින් ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය ඒඩ්ස් රෝගයට එරෙහිව ලොව පුරා ගෙන යන සටනෙහි ප්‍රමුඛව ක්‍රියා කරයි.

මිනිසා කලින් කලට වසංගත රෝග නිසා දුක් පිඩාවන්ට පත්ව ඇති අතර ඒ හා සමගම මානුෂික වේදනා, මරණය හා හානි වලටද ගොදුරු වූ බව ඉතිහාසයෙන් මොනවට පැහැදිලි වේ. මෙම වසංගත, ඇතැම් ව්‍යාපාර හා යුද්ධ කෙරෙහිද බලපා ඇත්තා සේම, සමාජයේ ආර්ථික හා සාමාජික ව්‍යුහයේ වෙනස්කම්ද ඇති කරමින් ශිෂ්ටාචාරයන්ගේ නැගීමටත් බැසීමටත් වගකිව යුතු ද විය. එසේ වුවත් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුව විශේෂයෙන් මහජන සෞඛ්‍යයෙහි දියුණුව නිසා මෙම රෝග මූළමණින්ම තැනී කල තත්වයකට පත් කරන ලදී. එහෙත් අද මේ තාක් කල් නොවූ විරු ආකාරයේ වඩා විනාශකාරී තවත් වසංගත රෝගයක් මුළු ලෝකයාට තර්ජනයක් වී තිබේ. මෙම

රෝගය ලෝකය පුරා දශ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනයා ආසාදනය කර ඇතුවා පමණක් නොව රෝගය සඳහා තවමත් ප්‍රතිකාරයක් සොයා ගෙන නැත. වඩාත් කනස්සල්ලට හේතු වන සාධකය නම් මෙම රෝගයේ මූලාරම්භය කවදාද.....? කොහේද.....? යන්න කිසිවෙකුත් නිශ්චිත වශයෙන්ම දැනගෙන නොසිටීමයි. ඒඩ්ස් නම් රෝගයක් ඇති බව දැනගැනීමටත් පෙර එම රෝගය මහද්වීපය හරහා පැතිර ගොස් තිබුණි. මෙම රෝගය මූලින්ම හඳුනා ගන්නා ලද්දේ 1981 වර්ෂයේදීය.

ඒඩ්ස් යනු එච්.අයි.වී. නම් වෛරසයකින් බෝවන රෝගයකි. එච්.අයි.වී. යන අකුරු තුන යෙදී ඇත්තේ HUMAN IMMUNIZATION VIRUS නම් වෛරසය හැඳින්වීම සඳහායි. ඊට අරුත් දැක්වීමක් කළ හොත් මානව ප්‍රතිශක්ති ඌණතා වෛරසය යනුවෙන් හැඳින්විය හැකිය.

ඒඩ්ස් යන්නද ඉංග්‍රීසි වචන හතරක එකතුවකි. එම අකුරු හතර යෙදෙන්නේ *Acquired Immune Deficiency Syndrome* හෙවත් "නතු කරගත් ප්‍රතිශක්ති ඌණතා සහ ලක්ෂණය" යන දිගු වදන් කීපය කෙටි කර දැක්වීම සඳහාය. මෙම රෝගය නිසා මිනිස් සිරුරේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියේ කොටසක් විනාශ වෙයි. එවිට ආසාදන රෝග වලට ඔරොත්තු දීමේ හා ඇතැම් පිළිකා රෝග මර්ධනය කිරීමේ ශක්තිය මිනිසා තුලින් නැතිවී යයි. මෙවැනි ප්‍රතිශක්ති ඌණතාවයක් නොමැති පුද්ගලයෙකුට මෙම ආසාදන හා රෝග ඉතා පහසුවෙන් මැඩ පවත්වා ගත හැකිය. එකී තැනැත්තාගේ ප්‍රතිදේහ ඇතිවීමට

අවුරුදු 6 ක පමණ කාලයක් ගත වනු ඇත. ආසාදනයක් සිදු වුවහොත් එක් තැනැත්තාගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම පවතී.

එච්.අයි.වී. වෛරසය යනු එම වෛරසය ආසාදනය වූ සියළුදෙනාටම නියත වශයෙන්ම මරණය එළඹවනු ලබන වෛරසයකි. ප්‍රතිකාර මගින් වේදනාව පමණක් අඩු කළ හැකි වන අතර වෛරසය ශරීර ගත වූ අයට එමගින් පිටු බලයක් ලබාදීමට හැකිය. සුවච්ඡින්නාමැති අතර කිසියම් පුද්ගලයෙකුට මේ රෝගය බෝවීම වැළැක්වීම සඳහා ඇත්තේ එකම ආයුධයක් පමණි. එනම්, එම රෝගය එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් තවත් පුද්ගලයෙකුට සම්ප්‍රේෂණය වීම වළක්වාලීම සඳහා උපක්‍රම සහ උපක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මෙම වසංගතය පැතිරයාම වැළැක්වීමයි. මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ කෙසේද.....? වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය නොවන්නේ කෙසේද.....? යන දැනුම මත පදනම් විය යුතුය. ලේ, ශුක්‍ර තරල, යෝනි ග්‍රාවයන්, කෙළ, කැළළු, මව්කිරි හා මුත්‍රා ආදියෙන් එච්.අයි.වී. වෛරසය වෙන් කරගනු ලැබූවද එමෙන්ම ශාරීරික ද්‍රව්‍යයන්, සුවයන් සහ මල මුත්‍ර ආදියේදී තිබිය හැකි වුවද එය සම්ප්‍රේෂණය වන තුම ඇත්තේ 3 ක් පමණි. එනම්, විෂබීජ ශරීරගත වූ අයකු සමග ලිංගික සේවනයේ යෙදීම, විෂබීජ අන්තර්ගත ලේ සමග එන්නත් කිරීම හා ඉපදීමට පෙර හෝ එම කාලය තුළ හෝ ඉපදීමෙන් පසු විෂබීජ ශරීරගත වූ මවගෙන් ස්වකීය දෑ දැරුවන්ට යනාදී වශයෙන් එය තවත් අයෙකුට සම්ප්‍රේෂණය වේ.

එච්.අයි.වී. වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය වැළැක්වීම සඳහා සියළුම

ප්‍රයත්න නැඹුරු කළ යුතුය. එච්.අයි.වී. වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය සඳහා නිශ්චිත පුද්ගල වර්ග හා පරිචය වගකිව යුතු බැවින් එච්.අයි.වී. වෛරසය ආසාදනය නිවාරණය කිරීමේ පරමාර්ථය මුදුන් පමුණුවා ගත හැකි වෙයි. රෝග සම්ප්‍රේෂණය සහ දෙදෙනෙකුගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගිත්වය අවශ්‍ය වන හෙයින් ආසාදිත වූ ආසාදිත නොවූ යන දෙදෙනාගෙන් එක් අයකුගේ වර්ගය විධිමත් වෙනසක් ඇති වීමෙන් සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාදාමය අඩාල කළ හැකිය.

මෙම පරමාර්ථය සපුරා ගනු වස් ඒකීය රෝගය එහි ව්‍යාප්තිය ගැන මහජනයාට අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒකීය රෝගය පිළිබඳ තොරතුරු පහද එය පුද්ගලයෙකුගේ වර්ගය විධි වල වෙනසක් ඇතිවීමට උපකාර වන අතර ඔවුන්ට එවැනි රෝග සම්ප්‍රේෂණ පුරුදු අත් හැරීමට හෝ වෙනස් කර ගැනීමට උදව්වක් වනු ඇත.

එහෙයින් පොදු ජනයා සඳහාත් විශේෂයෙන් තරුණ කොටස් සඳහාත් සෑම පුද්ගලයෙකුටම දැඩිවූත් ශක්තිමත්වූත් අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් තිබීම අද වැනි කාලයක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වෙයි. ඒකීය රෝගය කෙරෙහි මහජනයා කෙරෙහි අවබෝධයක් ඇති කිරීමට ජන මාධ්‍ය වැදගත් කාරණාරයක් ඉටු කරයි. වග කිවයුතු වර්ගයා ධර්ම වර්ධනය කිරීමෙන් හා ජාත්‍යන්තර සහයෝගිත්වය මගින් අපට එච්.අයි.වී. වෛරසය ආසාදනය පැතිර යාමේ වේගය අඩු කිරීමට හැකි වන සේ ඒ සඳහා අපිද ක්‍රියාත්මක විය යුතු කාලයයි.

මහජනයා දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒකීය රෝගය පිළිබඳ විධියෝ විත්‍රපට නිපදවීම



පරිසර දූෂණය

රිස්වානා රුහුල්ලා
හලා/ආදි වූ බාලිකා මහා විද්‍යාලය
වෙන්තප්පුව

යොවුන් ලේඛක තරගය - 1993 සඳහා
ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියකි.

මිනිසාට මෙන්ම සියළුම ජීවීන්ගේ
අත්‍යවශ්‍ය සාධකය වන ජලයද අද
නොයෙකුත් අයුරින් දූෂණ වී ඇති අතර
එය කොයිතරම් ද කිවහොත් දූෂණය
නොවූ ජල දෝතක් සොයා ගැනීම අද
කිසියෙක් බලාපොරොත්තු විය
නොහැක. අද ලොවේ ඇතැම්
ප්‍රදේශවල ජලය ජීවීන්ගේ
පරිහරණයට නුසුදුසු තත්වයකට
පත්ව ඇත.

මානව පරපුර ඇතුළු සතුන්ගේ, ශාකන්, මුළු ජීවී සංහතියත්, ජීවී
අජීවී සියල්ලේ එකතුවත්, මුළු මහත් ලෝකයත් එහි පැවැත්මත්
යන සියල්ල රද පවතින අමිල වස්තුව වන පරිසරය මිනිසාට
නැතිවම බැරි මහඟු දයාදයයි. එනම් පරිසරය නිසා මුළු
ලෝකයම සුරැකෙන අතර, පරිසරයේ විනාශය යනු අපගේද
විනාශය බව අද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කර ගත යුතුව ඇත. වාතය, ජලය,
ගොඩබිම ලෙස කොටස් තුනකින් යුක්ත අප වටපිටාව අපේ
ඵද්දෙනද ජීවිතයට නැතිවම බැරි අංගයක් වුවේ මිනිසාගේ
පමණක් නොව ජීවයේ සම්භවය සිදුවූ අවධියේ සිටය.

එද දඩයම් යුගයෙන් ජීවිත සටනට පා තැබූ මිනිසා එද පටන්
තම අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම උදෙසා තම ස්වභාවික පරිසරය
තම රූපය අනුව සකස් කිරීමට වෙර දැරුවේය. එයින් තම
ප්‍රගතිය සෙවීමට කැපවූ මිනිසා ක්‍රමයෙන් ගල් යුගයටත්, එබේර
යුගයටත්, ගොවි යුගයටත් පියවර තබමින් අද කොම්පියුටර්
යුගයේ කිරුළ පැළඳගෙන ඇත. එද ඇරඹූ ඵ් දිර්ඝ ගමනේදී
මිනිසා පරිසරය නොයෙකුත් විපර්යාසයන්ට ලක් කළද සරල
අවශ්‍යතාවයන් සහිතව සිටි එද මිනිසාගෙන් සැලකිය යුතු
හානියක් පරිසරයට සිදු නොවූත බව නම් පිළිගත යුතුව ඇත.

එහෙත් ක්‍රමයෙන් දියුණුවේ මුදුන් පෙත්තට සේන්ද්‍රවන මිනිසාගේ
අවශ්‍යතාවයන් සංකීර්ණ වන්නට ගතවූ කාල පරතරය ක්‍රමයෙන්
කෙටි වන්නට පටන් ගනිමින් පරිසරයේ ස්වාභාවිකත්වය තුරන්
වන්නට වූවේය. විශේෂයෙන් දහ අටවැනි සියවසේදී ඇතිවූ
කාර්මික විප්ලවය නිසා පරිසරයට මුහුණ පාන්නට සිදුවූ
බේදවාචකය පෙර කිසිදක නොවූ විරූ ආකාරයෙන් වේගයෙන්
වෙනස් වන්නට විය. පරිසර විපිරියාසය ලෙස හැඳින්වූ නව
තත්වය පරිසර දූෂණය යන අමිහිරි අර්ථයකින් හැඳින්වීමට
සිදු වුවේ ඉන් පසුවය.

පරිසරයේ ඉතා වැදගත් මෙන්ම මූලික තැනද හිමි කරගත්
වාතය, පරිසර දූෂණයේ ප්‍රතිඵලය ලෙස අද ජීවීන්ට අහිතකර
තත්වයට පත්වෙමින් පවතී. මෙසේ වාතය දූෂණය වන්නට
ඇරඹුනේ විද්‍යුත් තාක්‍ෂණයන් දියුණුව හේතුවෙන් යයි කීවොත්
එය සාවද්‍යත්ම නොවේ. තාක්‍ෂණයේ දියුණුව සමග සොයා
ගනු ලැබූ යාන-වාහන මිනිස් භාවිතයට පැමිණ වූ අතර ඵ්
සඳහා භාවිතාවූ ඉන්ධන දහනයෙන් පිටවන අපද්‍රව්‍ය නිසා
වාතය දූෂණය වීම ඇරඹුනි. මිනිස් දිවිය සංකීර්ණ වන්නම තම
අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම උදෙසා විවිධ කර්මාන්තශාලා
බිහිවූ අතර, ඵවායින් පිටකරන දූෂක ද්‍රව්‍ය මගින්ද පරිසරයට
අහිතකර බලපෑම් ඇතිවී ඇත. සුපිරි තාක්‍ෂණයේ දියුණුව
සමගම අභ්‍යවකාශ ගමනද ඇරඹී ඇති අතර ඵ් සඳහා යොදා
ගන්නා "සුපර්සොනික්" ගුවන් යානා හා රොකට් යානා ආදියෙන්
පිටවන අපද්‍රව්‍ය ඕසොන් ස්ථරයට සිදු කරන හානිය සුළුපවූ
එකක් නොවේ. එපමණක් නොව න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ සිදු
කිරීමේදී පිටවන විකිරණශීලී විෂ අළු සමස්ථ ජීවී පරපුරටම
හානිකර වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් සුපිරි බලවතුන්ගේ
න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවීමේ තරගය නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලයකි.

මිනිසාට මෙන්ම සියළුම ජීවීන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය සාධකය වන
ජලයද අද නොයෙකුත් අයුරින් දූෂණ වී ඇති අතර එය
කොයිතරම් ද කිවහොත් දූෂණය නොවූ ජල දෝතක් සොයා
ගැනීම අද කිසියෙක් බලාපොරොත්තු විය නොහැක. අද ලොවේ
ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජලය ජීවීන්ගේ පරිහරණයට නුසුදුසු
තත්වයකට පත්ව ඇත. මෙසේ සිදුවන ජල දූෂණයට හේතු
වන්නේ මිනිස් කටයුතු නිසා නිපදවන, ජීවීන්ට අහිතකර


ද්‍රව්‍ය ජලාශයට එක්වීම නිසාය. එහිදී එම ද්‍රව්‍ය ජලයේ දියවීමෙන්ද ඒ මත පාවීමෙන්ද සමහර ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින්ද ජලය මිනිසාට අහිතකර අන්දමින් දූෂණය විය හැක. බොහෝ විට ජල දූෂණයට හේතුවන සරළ අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය හැකි වන්නේ ජනයාගෙන් පිරුණු තඟරයේ නිවාස වලින් ඉවතලන කැලිකසල ජලාශවල එක්රැස් වීමයි. ඒවා විශාල ප්‍රමාණයෙන් එක් රැස් වෙමින් ජලයේ වර්ණය, රසය හා ගන්ධය වෙනස් කරමින් භාවිතයට නුසුදුසු තත්වයට පත් කරයි. එමෙන්ම බොහෝ කර්මාන්ත ශාලා වලටද භාවිතයෙන් පසු යම් යම් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලීමට සිදුවන අතර, ඒ සඳහා වගකිව යුත්තන් තෝරා ගන්නා ක්‍රමය වන්නේ ඒවා ජලාශ වලට එක් වීමට සැලැස්වීමයි. එසේ ඉවත ලන ද්‍රව්‍ය අතරින් රසදිය සංයෝග, අම්ල වර්ග, සායම් වර්ග සහ තෙල් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා අතර ඒවා නිසැකවම විෂ සහිත වන අතර, පානය කිරීමද මාරක ප්‍රතිඵල ඇති කිරීමට තුඩු දෙන්නක් වේ. නමුත් තවමත් කර්මාන්තශාලා වලින් පිටකරන එවන් ද්‍රව්‍ය ජලාශයට රැස්වී ජලජ ජීවීන්ට තර්ජනයක් එල්ල කරන අතර, අනෙක් ජීවීන්ට ද පානීය ජලය හිඟ කිරීමට අනියම් ලෙස හේතු තබමින් පවතී.

වාතයත්, ජලයත් හැරුණු කළ පරිසරයේ ජීවන තැන හිමි කරගන්නා ගොඩබිමද මිනෑම ජීවියෙකුගේ ජීවිතයේ පැවැත්මට වැඩි බලපෑමක් ඇති කරන සුවිශේෂ අංගයකි. මිනිසාට තම එදිනෙද කටයුතු සිදු කිරීමට මහෝපකාරී වන ගොඩබිම, කෘෂි භෝග වගාවටද, යානවාහන පැදවීමටද, කර්මාන්තශාලා ඉදි කිරීමටද දයක කර ගන්නා අතර එම කටයුතු වල අහිතකර බලපෑම් නිසා දූෂණයට ලක්ව පවතී.

පරිසරයේ අංග වන වාතය, ජලය හා ගොඩබිමට අමතරව ශබ්දයද දූෂණයට ලක්ව ඇත. මෙය හුදෙක් ජනාධික නාගරික

පරිසරයටම ආවේනික වූ තත්වයකි. මන්ද බොහෝ විට සෝෂාකාරී ශබ්දය රැවි පිළි රැවි දෙන්නේ තදයත්ත ප්‍රදේශ වලින්ය. වාහන වලින්ද, යන්ත්‍රෝපකරණ වලින්ද, ගුවන් විදුලියෙන්ද පිට කරන මිහිරි අමිහිරි ශබ්ද සියල්ලම එකතු වේ. ප්‍රතිඵලය අමිහිරි සෝෂාවකි. මෙම ශබ්ද, ශ්‍රවණය දුර්වල කර ක්‍රමයෙන් අමිහිරි තත්වය ඇති කරන අතර, ස්නායු පද්ධතිය කෙරෙහිද බලපායි. වාතය, ජලය, ගොඩබිම යන මෙයින් කුමක් දූෂණය වූවත් එයින් වන එකම ප්‍රතිඵලය ජීවිතයට හානිකර වීමයි. අද පරිසරය, දූෂණයේ ප්‍රතිඵලය නිසා පත් වී ඇත්තේ ඉතාමත් අසරණ තත්වයකටය. වගකිව යුත්තන් සුළු පිරිසකගේ ආත්මාර්ථකාමී හැගීම් මුදුන්පත් කර ගැනීමට සැරසීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස අප අත්විඳින පරිසර දූෂණයට අමතරව අප එක් එක් දෙනාගේ නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන්ද ඉතාමත් අහිතකර බලපෑම් පරිසරය වෙත එල්ලවී ඇත. අද තරුණ පරපුරේ විලාසිතාවන් බවට පත්ව ඇති දුම්වැටියද පරිසර දූෂණයට සහගායීවී ඇති බලවේගයක් බවට පත්වී හමාරය.

විදුවේ හා තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම මිනිසාගේ ජීවන ක්‍රමය වඩාත් පහසු කිරීමට තැත් කිරීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වූ පරිසර දූෂණය නැති කිරීම අද කළ හැකි දෙයක් නොවූවත්, එය යම් තරමක් දුරට පාලනය කිරීමට තම් නොහැකියාවක් නැත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වනුයේ ලොව බුද්ධිමත්ම සත්වයා වන මිනිසාගේ උනන්දුව හා කැප කිරීමයි. පරිසර සංරක්ෂණය ලෙස අප විසින් අද කළ යුත්තේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම නොව පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමයි. මෙය වචනයට පමණක් සීමා නොකර ක්‍රියාවට නැංවීමට වගකිව යුත්තන්ට පමණක් බාරකර තවදුරටත් නිහඬව සිටියහොත් තව නොබෝ දිනකින් රකින්නට පරිසරයක් තබා ජීවය සහිත ලෝකයක් ඉතිරි නොවනු ඇත..



දූෂා නොවූ ජල දෝතක්?