

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික වනාන්තර සහ ඒවායේ සංරක්ෂණය

සී.වී.එස්. ගුණතිලක,
උද්භිද විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය,
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය,
පේරාදෙණිය.

අපි 1989 ජුනි මාසයේ 5 දා ලෝක පරිසර දිනය සැමරුවෙමු. එහෙත් කැහැල්ල, රත්තපුර, තරුණ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ගිල ගත් මහා ජල ගැල්මේ අවාසනාවන්ත ප්‍රතිඵල අප මනසයෙන් තවමත් බැහැර වී ගොස් තැන. මෙම ජල ගැල්ම හිසා තුන් සියයකට වැඩි පිරිසක් මරාමුත්තට පත්වූ බවත්, හෙවල් දොරවල් තිස් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවකට හානි පැමිණි බවත්, දෙලක්ෂ පහස් දහසකට අධික පිරිසකට තාවකාලිකව හෝ උත්තීර්ව තැන් අහිමි වී ගිය බවත් විවිධ සන්නිවේදන මාධ්‍යවලින් අපට දැනගන්නට ලැබුණි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙම ජලගැලීමේ ඇති වූයේ නාය යාමි හිසාය.

භූවිද්‍යාඥයන්ගේ මතය අනුව නාය යාමි බොහෝ විට සිදුවන්නේ කඬතොලු හා අධික බෑවුම් සහිත පෙදෙස්වලට නොවිනාලයන් තුළදී අධික වණිපතනයක් ලැබුණු විටයි. කෙසේ වෙතත්, නාය යාමි සහ පස් තදු කඩා වැටීම් සිදුවන ප්‍රදේශවල, (සම්පූර්ණයෙන්ම තිරාවරණය නොවී තිබුණද) එම ප්‍රදේශයන්ට ලාක්ෂණික වූ ස්වාභාවික වනාන්තර යම් ආකාරයකින් හෝ මිනිස් බලපෑම වලට ලක් වී වෙනස් වීම්වලට භාජනය වී ඇති බැව් දැන ගන්නට ඇත. මෙම වනාන්තර ලදු කැලෑ හෝ කෘත්‍රීම වන හෝ කෘෂි වගා බවට පරිවර්තනය කර ඇත.

නෙටි කාලයක් තුළදී ලැබෙන අධික වණිපතනය අස්වාභාවික සිදුවීමක් නොවේ. ස්වාභාවික වනාන්තර මෙවන් අවස්ථාවලට ඔරොත්තු දෙන පරිදි මනාව සැකසී ඇති බැව් එහි ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කරන්නකුට පැහැදිලි වේ. වැඩි ජීවස්කන්ධයක්, මනා ස්ථරිභවනයක්, වැසුණු වියනක්, කඳුන් වටා එතුණු අපි ශාක හා

නාෂ්ඨාරෝහකයන්, පස මතුපිට ඇති දිරාපත්වන ශාක කොටස් සහිත ගසුමස් ස්ථරයන් සහ පස මතුපිට දිවෙන මුල් පද්ධතියක් ආදියෙන් සමන්විත ස්වාභාවික තෙත් වනාන්තරයක් ශීඝ්‍ර බෑවුම සහිත ප්‍රදේශයක වැඩුණද, එවැන්නක නාය යාමි පිළිබඳව අපට අසන්නට ලැබෙන්නේ කලාතුරකිනි. මෙයට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් විය හැක්කේ වණිපතනයේ වේගය අඩු කිරීම සඳහා මෙම ස්වාභාවික වනාන්තරය මැනවින් හැඩගැසී ඇති අතර, අන් කවර වෘක්ෂලතාදී වැස්මකටත් වඩා කායක්ෂම ලෙසින් වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් එමගින් උරාගෙන ඉතිරිය පොළව සමග ගැටීම තුනී කිරීමේ හැකියාව මේ (අධික වණිපතනයක් ලැබෙන ප්‍රදේශවල ඇති) ස්වාභාවික වැසි වනාන්තර සතුව තිබීමයි.

නාය යාමි සහ පස්තදු කඩා වැටීම් පිළිබඳ විපත් හිතර අසන්නට ලැබෙන පෙදෙස් වන රත්තපුර, කැහැල්ල, බ්‍රලන්තොග්‍රපිටිය, දැරණියගල, යටියන්තොට වැනි ප්‍රදේශවල ස්වාභාවික වනාන්තරවල තිරතුරුව සිදුවන දැව ගෙලීමේ හැඟ පුවත් පත්වලින් අපට දැන ගන්නට ලැබේ. ඉහත සඳහන් පෙදෙස්වලට අමතරව වලපනේ, ගඟරත්තෙන, තීල්දණ්ඩාගින්න, මතුරට වැනි ප්‍රදේශවල තදු බෑවුම්වල ඇති කැළෑ ගෙළි නොට දුම්නොළ සහ එළවළු වගාකර ඇති ආකාරය එම පෙදෙස්වල ගමන් කරන්නකුට පහසුවෙන් දැක ගැනීමට හැකිය. වවන ලද දුම්නොළ වේලා ගැනීම සඳහා ඉතිරිවී ඇති ගස් හෙලා දැරට ගැනීමෙන් මෙම ප්‍රදේශයන්හි ඉතිරිවී ඇති වනාන්තරද ශීඝ්‍රයෙන් හීනවී ගොස් ඇත්තේය. නාය යාමි හා පස් තදු කඩා වැටීමේ විපත්වලට භාජනය වූ තවත් ප්‍රදේශයකි, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තකල්ස් තදු වැටිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය. මෙහිදී දැව

හෙළිවී මෙන්ම ස්වාභාවික ව්‍යාප්තියේ යටිතල පහසුකම් ඉවත් කර එතසාල් වගාව ද බහුලව කර ගෙන යන බව තොරහසනි. උභව දෝෂයේ නිවැරදි (බැවුම් ලෙස) ඇති මධ්‍යම කඳුකරයේ ඉහල පෙදෙස්වල, දැන් ඉතා ජනප්‍රිය වී තිබෙන එළවළු වර්ග වගාවට යට වී ඇති තියුණු බැවුම් සහිත උස්බිම් වලද මෙවන් අහතුරු ඉදිරියේදී ඇති විටට බොහෝ සෙයින් ඉඩ තිබේ.

තාය යාම්, පස් කඳු කඩා වැටීම් ආදිය ස්වාභාවික විපත් ලෙස සැලකිය හැකි නමුදු, ඒවා බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ මිනිසා විසින් ස්වාභාවික ව්‍යාප්තියට පරිවර්තනය කරන ලද පෙදෙස්වලය. ස්වාභාවික තුරු ලතා වැස්ම තවමත් අබන්ධව ඉතිරිවී තිබෙනුයේ ප්‍රදේශයන් ඉතා සුළු ගණනක වන නමුදු, ශ්‍රීපාද සහ සිංහරාජ අඩවිය වැනි ස්වාභාවික ව්‍යාප්තියට මෙවන් තාය යාම් ඉතා විරලය. එම ව්‍යාප්තියට ඇති ස්වාභාවික වන වැස්ම සදා තෙත් දේශගුණික තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන පරිදි පරිණාමය වී ඇත. එවන් ප්‍රදේශවල භූ විද්‍යාත්මක විෂමතා තිබුණද, එහිසා සිදු වන තාය යාම් හෝ පස් කඳු කඩා වැටීම් ගැන අසන්නට ලැබෙන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි.

කඳුකර පෙදෙස්වල අධික වණිජගතය සහිත කාලවලදී කණිකා ජල ගැලීම්වලින් සිදු වන විපත් බහුලය. මෑතක සිට එම ප්‍රදේශ දැඩි තියහයන්ට ලක් වූ කාලයන්හි (විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දේ පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාස වල,) ඒවායේ ඇති ලදු කැලෑ, පතන් තණබිම් සහ වන වගාවන්වලට හිතී තැබීමෙන් සිදුවන හානි ගැන තීව්‍රව පාහේ අසන්නට ලැබේ. විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම කඳුකරයේ ඉහල පෙදෙස්වල වාණිජ වන වගාවන් ලෙස පවත්වා ගෙන යන පයිතස් සහ ඉයුකැලිප්ටස් වගාවන් මෙම හිතී තැබීම්වලට තීව්‍රව හානිය වන බැව් පෙනී ගොස් ඇත. මේ හේතුවෙන් සිදු වන පස තිරාවරණය වීම, අධික වණිජගතය ලැබෙන කාලයන්හි පස සෝදා යෑමට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙයි. එමෙන්ම, තෙතමනය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව අඩු බැවින් වියළි කාලවලදී මෙම ප්‍රදේශවල ජල උල්පත් සිදු යෑමෙන් කර්ෂණ පරිසරයක් ගෙන දේ.

පයිතස්, ඉයුකැලිප්ටස් වැනි වාණිජමය වන වගාවන් ජල ධාරිතා පෙදෙස්වල බහුල ලෙස වගා කිරීම පිළිබඳව සමජනකයාගේ බලවත් විරෝධය ලංකාවේ මෙන්ම අසල් වැසි ඉන්දියාවේ හා තායිලන්තයේද පැන නැගී ඇත. මෙම විරෝධය පිළිගැනීමට ඉතා සාධාරණ හා විද්‍යාත්මකවූත් හේතූන් තිබුණද, වන වගා සැලසුම් කිරීමේදී මෑතක වන තුරුම මහජනතාවගේ අදහස් නොසලකා හැරීම ඉතාමත් අවාසනාත්මක කරුණකි. දේශීය සිතුවීම් පැතූම් මෙන්ම, රටේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් නොමැති විදේශීය උපදේශකයන්ගේ අහිමනයන් පරිදි මෙලෙස වගා කෙරුණු පයිතස් හා ඉයුකැලිප්ටස් වගාවන්වලට හිත්තෙන් සිදුවන හානිය වසරකට රුපියල් දශ ලක්ෂ 30 - 40 පමණ වන බැව් ගණන් බලා ඇත. 1989 අවුරුද්දේ මුල් භාගයේ වන වගාවලට හිත්තෙන් සිදුවූ හානිය ගැන සැලකීමේදී මෙය අවතක්සේරුවක් බව සිතන්නට පුළුවන. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳව 1986 දී ලෝක බැංකුව මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද විශේෂඥ වාර්තාව ලාංකික විද්‍යාඥයින් මෙන්ම පරිසර කටයුතු පිළිබඳ ඇල්මක් දක්වන මහජන සංවිධාන මගින් දැඩි විවේචනයට භාජනය කරනු ලදුව ඒ ගැන කරුණු සොයා බැලීමට තවත් විශේෂඥ කණ්ඩායමක් (මෑතකදී) මෙහි එවනු ලැබීය. ඔවුන් විසින් පිළියෙල කරනු ලබන වාර්තාවේ මෙම වන වගා පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව දරන මතය අනුමත කර ඇත. ඉහළ කඳුකර ජලධාරිතා ප්‍රදේශයන්හි අධික ජල ඉල්ලුමක් ඇති, වේගවත් වැඩිමත් පෙත්තුවී කරන වාණිජමය වන වගා ඇති නොකරන ලෙස රෙකමේදාරු කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින් මෙන්ම පොදු මහජනතාවද මෙම යෝජනාව අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ කරගෙන ගියද, වන වගා සැලසුම්කරුවන් විසින් එය මෙතෙක් සැලකිල්ලට නොගන්නා ලදී. මෙම ප්‍රදේශවල දේශීය වන වගාවන් ඇති කිරීමට අදාළ පර්යේෂණ යළි අරඹා ඒවා වැඩි දියුණු කළ යුතුය යන එබඳුම තවත් යෝජනාවකටද ඉහත වාර්තාවෙන් අනුමතිය ලැබී තිබේ.

යට සඳහන් කරන ලද්දේ ස්වාභාවික ව්‍යාප්තියට හිත්තෙන් ඉටුවන පාරිසරික මෙහෙයයන්

නීතිපදයන් සහ ඒවායේ විභාගයෙන් ලද හැකි අතිවූ විපාක වලින් සමහරකි. අධික බැවුම් සහිත ප්‍රදේශයන්හි සිදුවන වන සංහාරය මුළුමනින්ම තවතා දමා තිරාවරණය වී ඇති පෙදෙස්වල උචිත ඝන වගාවන් තැවත ඇති කළහොත් මෙවැනි විපත් (විශේෂයෙන්ම පස් කඳු කඩා වැටීම් ආදිය) බොහෝ දුරට මැඩලීමට හැකි වන බව පරිසර විද්‍යාඥයින්ගේ මෙන්ම පාංශු විද්‍යාඥයින්ගේද මතයයි. පාරිසරික වෙනස්වීම්වලට ඉමහත් සංවේදීතාවයක් පෙන්වුම් කරන, අධික බැවුම සහිත හෝ කලාපීය පෙදෙස් වල තැවත වන වගාවන් සැළසුම් කිරීමේදී ඒවා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සඳහා වචන වැටිල්ලක් මෙන් තොව පාරිසරික ප්‍රතිලාභ (එනම් පාංශු සහ ජල සංරක්ෂණය) උපරිම ලෙස ලබා දිය හැකි ස්ථිර ඝන වන වගාවක් ලෙස පවත්වා ගෙන යාම වඩා සුදුසුය යනු පරිසර විද්‍යාඥයින්ගේ මතයයි.

ඉහත සඳහන් කරන ලද විශේෂඥ වාර්තාව මෙය එලෙසින්ම අනුමත කර ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන්, තස්දුම්මල්ල, ගිනිගත්තේන වැනි ප්‍රදේශවල හියුණු බැවුම්වල වාණිජ වැටිල්ලක් සේ පවත්වාගෙන යන පසිතස් වගාවන් පරිණත වූ පසු කැපීමෙන් තාවකාලික ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලැබුණද ඉන් සිදුවන්නේ විශිෂ්ට තොහැනි තරමේ පාරිසරික විපතකි. එම දැව කැපීමේදී ඉදිකෙරෙන මාර්ග හා දැව ගෙලීම සහ රැගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරන යෝධ යන්ත්‍රෝපකරණද අතිශයින් පරිසරයට හානිකරය. දැව ගෙලීමෙන් පසු ඉතිරි වූ කොටස් ගිනි තබා තැවත වාණිජ වන වගාව ආරම්භ කිරීම දැනට අනුගමනය කරන පිළිවෙලයි. මෙලෙස අවුරුදු 20 කට පමණ වරක් සිදුවන පස තිරාවරණය තිසා, එම කාලය තුළදී සිදු වන පාංශු සංරක්ෂණය මුළුමනින්ම හැකි වී යයි. ඔහි පටිපිටිපොල ප්‍රදේශවල සිදුවී තිබෙන්නේ මෙවැනි ක්‍රියාවලියකි. තවුන් මෙය ස්ථිර වගාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යමින් ඒවායේ යටිවගාවන් ලෙස දේශීය ශාක ඇතුළු කර ගිනිතැබීමවලින් ආරක්ෂාකර ගතහොත්, කලකදී පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා සුදුසු ඝන වන වගාවක් ඇති කර ගත හැකිය.

දැව සපයන, පරිසරය සංරක්ෂණය කරන, ද්‍රව්‍ය නායකී වගාවක් ලෙස මේ වන වගාවන්ට එන

විට ක්‍රියා කළ හොඳකි. අධික බැවුම් සහිත පෙදෙස්වල ඇති වන වගාවන්ගේ ප්‍රධානතම කායනීය වත්තයේ පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණයයි. එයට හැලපෙන පරිදි, තිරතුරුවම පවත්නා ඝන තුරුලතා වැස්මක් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර ඒවායේ තුමන ආකාරයේ හෝ දැව ගෙලීම් වැනි වන විද්‍යාත්මක කළමනාකරණයන් තොනළ මතය.

පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳ අවබෝධයන් ඇත්තන්ගේ අදහස් මෙසේ වුවද, පුද්ගලයකුට මෙන් 1983 - 86 දත්වා කාලය තුළදී මෙහි පැමිණි තතු පිරික්සූ විදේශීය වන විද්‍යා විශේෂඥයින් පිරිසක් විසින් ලෝක බැංකුවේ ඇරයුම පරිදි පිළියෙල කරන ලද ලංකාවේ මහා පරිමාණයේ වන විද්‍යා සැලැස්මේ (Forestry Master Plan) අන්තර්ගත වූයේ මීට ඉඳුරාම වෙනස් අදහස් උදහස් මාලාවකි. මේ අනුව ඉහල කඳුකර පෙදෙස්වල දැනට වගා කර ඇති හෙක්ටයාර 11,110 ක වන වගාවන් වාණිජමය වැටිල්ලක් ලෙස (අවුරුදු 20 - 25 ක වාරිකයක් තුළ දැව ගෙලා) තැවත වගා කළ යුතු යයි යෝජනා කරන ලදී. මීට අමතරව කඳුකර ප්‍රදේශයේ අලුතින් හෙක්ටයාර 8,000 ක වාණිජ වගාවන්, හෙක්ටයාර 20,000 ක උසුන් දර වගාවන් සහ හෙක්ටයාර 15,000 ක ගොවීන්ගේ දැව වගා (Farmer's Woodlots) සඳහා සිවුවීමට යෝජනා කර ඇත්තේ අධික ජල ඉල්ලුමක් ඇති, අධි වේගයකින් වැවෙන ඉයුනලිප්ටස් සහ පසිතස් වර්ගයි. මෙම වන විද්‍යා සැලැස්ම, පසුගිය කාලයේදී මහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් එකක් වූ අතර එහි අඩංගු සැලසුම් බොහොමයක් අප නලින් දුටු පරිදි පරිසරයට ඉතා අහිතකර ඒවා බව එම සැලැස්ම තරයේ විවේචනය කළ ලාංකික පරිසර විද්‍යාඥයින් සහ පරිසර සංවිධාන මගින් පැහැදිලිවම පෙන්වා දෙනලදී.

මෙම එඩිතර ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ලෝක බැංකුව විසින් ඉබ්බි සහ ඉබ්බි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ඇරයුම පරිදි ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය සඳහා ඇති අන්තර් ජාතික සංගමය (IUCN) වෙත, මෙම මහා පරිමාණයේ වන විද්‍යා සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළහොත් සිදුවිය හැකි පාරිසරික අනවසුතු පිළිබඳ ඇගයීමක් කිරීමට බාර

දෙන ලදී. මේ අනුව මෙරටට ආ දෙවැනි විශේෂඥ තත්ත්වයට අයත් නායකී භාරය වූයේ ලංකාවේ ස්වාභාවික වනාන්තරවල පාරිසරික සහ ජීව විද්‍යාත්මක වටිනාකම නෙරෙහි මෙම යෝජිත වන විද්‍යා කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති බලපාන අන්දම පිරික්සා සුදුසු සංරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙලක් යෝජනා කිරීමයි. ශ්‍රී ලාංකික පරිසර සංරක්ෂණ හිත කාමීන් විසින් ලිඛිතව සහ වාචිකව ඉදිරිපත් කළ කරුණු හා යෝජනා මෙම තත්ත්වයට සැලකිල්ලට භාජනය කරන ඒවායින් බොහොමයක් (1989 අප්‍රේල් මාසයේදී) එම තත්ත්වයට මගින් ලෝක බැංකුවට සහ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවෙහි අන්තර්ගත නොව තිබීම සැලකිය යුතු කරුණකි.

මෙම වාර්තාවෙහි අඩංගු ප්‍රධානතම යෝජනා වන්නේ පෙර සඳහන් කළ මහා පරිමාණ සැලැස්ම මගින් යෝජනා කරන ලද හෙක්ටයාර් 48,000 ක් පමණ වන පහතරට තෙත්කලාපීය වනාන්තරවල දැව නැපීම, එම වනාන්තර වල සංරක්ෂණ වටිනාකම නිර්ණය කරන තුරු අත්හිටුවීමය. මෙය පරිසර හිතකාමී අප හවුරුන් ලද තාවකාලික ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකිය හැකි වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිරිව ඇති ස්වාභාවික වනාන්තර සහ පහත් තණ බිම් සංරක්ෂණය සඳහා තවත් වරමක් අපට ලබා දී ඇත. එහෙයින් මෙම ස්වාභාවික සම්පත්වල අඩංගු පාරිසරික මෙත්ම ජීව විද්‍යාත්මක සංරක්ෂණ වැදගත්කම අදාල සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නන්ට ඒත්තු ගැන්වීම ශ්‍රී ලාංකික අප කාණේ යුතුකමක් වන අතර ඒ සඳහා මෙය ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවක් වී තිබේ. මෙම වනාන්තරවල සංරක්ෂණ වටිනාකම ඇගයීම ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින් තත්ත්වයට භාර දීමට ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ වන සම්පත් සංවර්ධන ඒකකය මගින් කටයුතු යොදා ගෙන යයි. මෙම වනාන්තර ඇගයීම සිදු කරනුයේ ඒවායේ ඇති පාරිසරික වටිනාකම මෙන්ම ජීව විද්‍යාත්මක වැදගත්කම සලකා බැලීමෙන් පසුවය.

මෙම ලිපියේ ඉතිරි කොටසින් අප අදහස් කරනුයේ දැනට අප සතුව ඇති විද්‍යාත්මක තොරතුරු අනුව, ලංකාවේ ස්වාභාවික වනාන්තර වල ඇති උද්භිද විද්‍යාත්මක වැදගත්කම සහ

ඒවායේ පැතිර පවත්නා ජීව විවිද්‍යාත්මක පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමටය.

පහත රට තෙත් කලාපය, කඳුකර තෙත් කලාපය, විශලි කලාපය සහ ගුණ කලාපය යනුවෙන් ප්‍රධාන දේශගුණික කලාප සතරක් ලංකාවේ ඇති නමුදු, ප්‍රාථමික තැවුම් වනාන්තර අද දැනිය හැක්කේ පහත රට සහ කඳුකර තෙත් කලාපයන්හි පමණි. මෙම ප්‍රාථමික තැවුම් වනාන්තර මෙහිදී හඳුන්වන්නේ බාහිර මිනිස් බලපෑම්වලින් තොරව, එහෙත් ස්වාභාවික උපතිවර්තන සහ නිවර්තන දේශගුණික බලපෑම් වලට යටත්ව කාලාන්තරයක් තිස්සේ (එනම් අවුරුදු දසලක්ෂ ගණනක් තිස්සේ) පරිණාමය වී ඇති නිවර්තන සදා හරිත තෙත් වනාන්තර ලෙසිනි. මෙම දිගු කාල පරිච්ඡේදය තුළදී මෙම වනාන්තරවල ස්වභාවය සහ ඒවායේ අන්තර්ගත ජීවී කොට්ඨාශ ආදිය නිරතුරුවම ස්වාභාවික බලපෑම්වලට, එනම් ස්වාභාවික වරණය නමින් හඳුන්වන ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියා දාමයට අනුකූලව වෙනස් වීම්වලට භාජනය වී ඇත්තේය. අද දක්නට ලැබෙන මේ නිවර්තන තෙත් වනාන්තර වුනලී පරිසරයට උචිත අයුරින් ස්වභාව ධර්මයා විසින් උරුම කර දී ඇති මහඟු දායාදයකි. ලංකාව පමණක් තම නිපබ්බ කර ගත්, එනම් ලෝකයේ අත් කවර රටකවත් දක්නට නොලැබෙන, ලංකාවට ආවේණික සපුෂ්පික ශාක විශේෂ 830 ක් මේ වනාන්තරවල ඇත්තේය. මෙය ලංකාවේ ඇති සියලුම සපුෂ්පික ශාක සංඛ්‍යාවෙන් හතරෙන් කොටසක් පමණ වේ. මින් 94% පමණ පහත රට සහ කඳුකර තෙත් කලාපීය වනාන්තරවල දක්නට ලැබෙන ලෝකයේ අත් රටවල වැඩෙන ශාක වර්ග සම්මිශ්‍රණය වී ඇති අවධියක ලංකාවට පමණක් ආවේණික වූ ශාක මෙතරම් සංඛ්‍යාවක් තිබීමට හේතුවත් ඒවායේ සංරක්ෂණයෙහි ඇති වැදගත් කමත් ගැන සමහර විට අප කුතුහලයට පත්වී සිටිමු.

මෙය පැහැදිලි කිරීම සඳහා භූ විද්‍යාත්මක තොරතුරු මෙන්ම සාහර පත්ලේ ඇති අතියම් මුම්භකත්ව ලක්ෂණ විශ්ලේෂණයෙන් ලබා ගත් ප්‍රතිඵල ද ආධාර වී ඇත. මෙමගින් භූ විද්‍යාත්මක කාල පරිච්ඡේදවලදී ලෝකයේ මහාද්වීපවල පිහිටීම සහ ඒවායේ වාරයන්

(Drifts) පිළිබඳව වැදගත් තොරතුරු රැසක් මෑතකාලයේදී අනාවරණය වී තිබේ. මෙම විද්‍යාත්මක තොරතුරු අනුව ලංකාව හා ඉන්දියානු අධිද්වීපය එකම උපමහාද්වීපික තලයක් ලෙස අවුරුදු දශ ලක්ෂ විස්සක පමණ කාලයක් තිස්සේ පැවති බව පෙනේ. අදින් අවුරුදු දශලක්ෂ 65 ටත් 45 ටත් අතර ඉහත කාල පරිච්ඡේදය තුළදී එය අත් මහාද්වීපවලින් වෙන්ව තිරණයට දැමුණු දෙස පැවති උපතිවර්තන තෙත් දේශගුණික තත්ව යටතේ සිට තිරණය හරහා උතුරට පාවී විත් ආසියානු මහාද්වීපයේ දැමුණු ටෙරළ හා ගැටි ඇති බැව් සොයා ගෙන ඇත.

අවුරුදු දශ ලක්ෂ 45 ට පමණ පෙර සිදු වූ මෙම මහාද්වීපික ගැටීමේ හේතුවෙන් ඉන්දියානු උපමහාද්වීපයේ උතුරු ටෙරළ ප්‍රදේශය ආසියානු මහාද්වීපික තලයට යට විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හිමාලය නදු වැටිය ආරම්භ වී ඇති බැව් මෙම භූ විද්‍යාඥයන්ගේ මතයයි. ලංකාව හා ඉන්දියානු අධිද්වීපය මෙම අවුරුදු දශලක්ෂ විස්සක පමණ කාල පරිච්ඡේදය තුල අත් මහාද්වීපවලින් ඇත්ව, අධික ආර්ද්‍රතාවයක් සහ උෂ්ණත්වයක් යටතේ පැවැත්ම තිසා මෙම දෙරටට ආවේණික ශාක හා සත්ව විශේෂ රාශියක් සහිත හිවර්තන තෙත් වනාන්තර ප්‍රජාවන් පරිණාමය වී ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

මහාද්වීපික ගැටීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හිමාලය නදු වැටි ප්‍රාන්ත උස්වීමත් සමඟම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉන්දියාවේ උතුරු ප්‍රදේශයේ මහාද්වීපික වියළි දේශගුණයක් පැතිර ගියේය. එම දේශගුණයන්ට ගැලපෙන ශාක බටහිර ආසියානු ප්‍රදේශවලින් සංක්‍රමණය වීමත් සමඟ, එම ප්‍රදේශයේ තිබූ තෙත් වනාන්තර ප්‍රමාණය හීන වී ගොස් ඇත. තමුත් සාගරයෙන් වට වූ මහාද්වීපික දූපතක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ (විශේෂයෙන්ම නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ) දේශගුණික තත්ත්වයන් එතරම් වෙනස්වීමකට බලපා නොමැති බැව් විද්‍යාත්මක මතයයි. මේ හේතුව තිසා කලක් ඉන්දියාවට සහ ලංකාවට පමණක් ආවේණික වූ ශාක සහ සත්වයින්ගේ අවසන් හිපබීම වශයෙන් අපගේ තෙත් වනාන්තර වැදගත් වේ. ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරය භූ විද්‍යාත්මක බාධකයක් ලෙස ශාක සහ සත්ව පර්යව්‍යය කෙරේ

බලපා ඇති බැවින්, අප රටේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයෙහි ලංකාවට පමණක් ආවේණික වූ ශාක රාශියක් මෙම දීඝ කාල පරිච්ඡේදය තුළදී පරිණාමය වී ඇත.

ලංකාවේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් හතරෙන් තොටයක් පමණ වූ මෙම තෙත් කලාපීය ප්‍රදේශය තුළ වුවද, ශාක වල පැතිරීම ඉතාමත් සංකීර්ණ ආකාරයකට සිදුවී ඇති බැව් පරීක්ෂණවලින් හෙළි වී ඇත්තේය. මෙයට බොහෝදුරට හේතුවී තිබෙන්නේ මෙම කලාපය තුළ දක්නට ලැබෙන නදු බැවුම්, තැනිතලා, ගංගානිම්න සහ වගුරු බිම් ආදියෙන් සමන්විත භූ විෂමතාවන් ශාක විශේෂයන්ගේ පැතිරීම පාලනය කරන භෞමික සහ දේශගුණික බාධක ලෙස පිහිටීමයි. මේ හේතුව තිසා ලංකාවේ තෙත් කලාපීය ශාක විශේෂවල පැතිරීම, වියළි කලාපයේ ඇති ශාක විශේෂවල පැතිරීමට වඩා බොහෝ දුරට අඩු බව දක්නට ලැබේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, සමහර තෙත් කලාපීය ශාක විශේෂ සීමිත පැතිරීමක් පෙන්නුම් කරන අතර ඉතාමත් දුර්ලභ ගණයේ ශාක විශේෂ එක් නදු මුදුනකට පමණක් සීමා වූ අවස්ථාද දක්නට ඇත.

දැනට ලැබී ඇති සපුෂ්පිත ශාක පැතිරීම ආශ්‍රිත උද්භිද විද්‍යාත්මක තොරතුරු අනුව, ලංකාව ප්‍රධාන ශාක සංග්‍රහ කලාප 15 කට බෙදා ඇත. (1 සිතියම) මෙම කලාපයන්ට මූලිකව ඇත්තේ අප කලින් සඳහන් කළ ශාක පැතිරීමේ සීමිත භාවයයි. අවුරුදු 150 කටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ ක්‍රමානුකූලව විවිධ ශාක වහිවල විස්තර තැන්පත් කර ඇති ජාතික ශාකාගාරයේ අඩංගු කරුණු පරිශීලනය කර එම ශාකවල පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් ලබා ගත් තොරතුරු අනුව මෙම මූලික කලාපනය සකස් කර ඇත. ඉදිරියේදී ශාක පිළිබඳ තවදුරටත් ජීව විද්‍යාත්මක තොරතුරු ලැබුණු විට මෙම කලාපනය තවදුරටත් පිරිපහදු කර ගැනීමට අවකාශ ලැබේ. මෙවැනි විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයන් සඳහා ශ්‍රමය, කාලය, හා මුදල් විශාල වශයෙන් අවශ්‍යය. තමුත් වනාන්තර සංභාරය ඉතාමත් අධික වේගයකින් සිදුවන බැවින්, මෙම මූලික අධ්‍යයනය ආශ්‍රයෙන් ලබාගත් තොරතුරු අනුව එක් එක් ශාක සංග්‍රහ කලාපයේ ඉතිරිවී ඇති ස්වාභාවික වනාන්තර සහ

අත් වාක්‍යලතාදී දර්ශයන් සංරක්ෂණය කර ගත යුතු බව පැහැදිලි වේ.

මෙම භාෂා සංග්‍රහ කලාප පිළිබඳව දීඝ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් නොකරන නමුදු ඒවායේ පිහිටීම සහ ඒවායේ අන්තර්ගත ස්වාභාවික ව්‍යාප්තිය ප්‍රමාණයන් 1 වැනි රූප සටහනෙන් දැක්වේ. භාෂා විශේෂවල විවිධත්වයේ ඇති පොහොසත් බව මෙන්ම ඒවායේ පැතිරීමේ සීමිත බව වැඩි වශයෙන්ම පෙන්නුම් කරන ලංකාවේ තිබෙනුයේ නොවේ. කලාපයේ, ජව අනුරූපව වැඩි භාෂා සංග්‍රහ කලාප සංඛ්‍යාවන් දක්නට ලැබේ. එමෙන්ම, ඉතාමත් අඩු ස්වාභාවික ව්‍යාප්තිය ප්‍රමාණයන් ඇත්තේද මෙම ප්‍රදේශයෙහිම බව එම රූප සටහනෙන් පෙනේ. මේ එක් එක් කලාපයේ දක්නට ලැබෙන ව්‍යාප්තිය දර්ශ සහ ප්‍රධාන භාෂා ප්‍රජාවන් 1 වෙනි වගුවෙන් දක්වා ඇත. එක් එක් කලාප තුළ අඩංගු ප්‍රධාන භාෂා ප්‍රජාවන් පුළුල් සමාන කමක් පෙන්වුවද, ඒවායේ අඩංගු දුර්ලභ භාෂා බොහොමයක් පැතිරීම ගැන සැලකූ විට ඒවා එකිනෙකින් වෙනස් බැව් පෙනේ.

උදාහරණයක් වශයෙන් තනල්ස් කඳු වැටි ප්‍රදේශයේ (කලාප අංක 12) මෙන්ම ශ්‍රීපාද අඩවියේ (කලාප අංක 14) ද දක්නට ලැබෙන්නේ නීත සහ ද්‍රාම ප්‍රමුඛ භාෂා ප්‍රජාවන් අඩංගු තිවර්තන කඳුකර හෝ ව්‍යාප්තිය වුවද ඒ එක් එක් ප්‍රදේශවල භාෂා සංග්‍රහ පිරික්සීමේදී එක් එක් කලාපයට සීමිත වූ භාෂා විශේෂයන් බහුල බැව් අනාවරණය වී ඇත. මේ නිසා මෙම විවිධ භාෂා සම්මිශ්‍රණයන් සහිත භාෂා ප්‍රජාවන් නියෝජනය කිරීම සඳහා සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ තෝරා ගැනීම යම්කිසි විද්‍යාත්මක පදනමක් මත සිදුකිරීමට හැකිවී ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන්, දැනට අප වෙත ඇති උද්භිද විද්‍යාත්මක තොරතුරු අනුව ලංකාවේ පමණක් නොව මුළු දකුණු ආසියාවේම ඇති ව්‍යාප්තිය අනුරිත භාෂා විවිධත්වයෙන් සහ භාෂා සංග්‍රහයන්ගෙන් තාමත් පොහොසත් ම ප්‍රදේශ ලෙස සලකනු ලබන්නේ අංක 7 දරන භාෂා සංග්‍රහ කලාපයට අයත් තිබෙනුයේ දකුණු වෙරළ බඩ පහත රට හෝ කලාපීය ව්‍යාප්තියයි. භාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඇති මේ ව්‍යාප්තිය දකුණු ආසියාවේ පොහොසත්ම භාෂා සංග්‍රහයන් අඩංගු ඒවා වේ. මෙලෙසම අංක 9 දරන කලාපයට අයත් (ශ්‍රීපාද අඩවියේ තිබෙනුයේ සහ

දකුණු බැටුම් පෙදෙස් වන) ඉහළ අතුරු මිටියාවත් ප්‍රදේශයන් හා තව සහ වලවේ ගංගාවන්හි මධ්‍යම ජලධාරිත ප්‍රදේශ දකුණු ආසියාවේ අධිකතම වර්ෂාපතනයක් අවුරුද්ද මුළුල්ලේම ලබන ප්‍රදේශ බව හඳුනාගෙන ඇත.

අඹගමුව, නිතුල්ගල, දැරණියගල, තුරුවිට, එරත්ත සහ බබණ්ඩොටුව ආදී පෙදෙස්වල ඇති ව්‍යාප්තිය මෙම කලාපයට ලාක්ෂණික වන අතර, එම ප්‍රදේශයට පමණක් ආවේණික භාෂා රාශියක් ඒවායේ දක්නට ඇත. නමුත් මෙම කලාප දෙකෙහි දැනට ඉතිරිවී ඇත්තේ ඉතා සුළු ව්‍යාප්තිය ප්‍රමාණයකි. ඒවායේ සිදුවී ඇති දැව හෙළිවී තිසා නැටුම් භාවයද තුරත් වී හොස් ඇත. මේ හේතුවෙන් ලංකාවට පමණක් ආවේණික ඉතාමත් දුර්ලභ භාෂා විශේෂ කිහිපයක්ම මෙම ප්‍රදේශවලින් තුරත්වී හොස් ඇති බැව් මැනවි කරන ලද සම්පූර්ණවලින් පෙනී හොස් තිබේ. පමුණු තුලයට අයත් භාෂා සතරක්, අනෝදා තුලයට අයත් භාෂා හයක් හා හොර තුලයට අයත් භාෂා තුනක්ද මෙලෙස අපෙන් සඳහන්ව සමුහගත ඇති භාෂා අතරට වැටේ. මිනිසා විසින් ඒවායේ වාසස්ථාන අත් හැරී භාවිතයට පරිවර්තය කිරීම ජව ප්‍රධාන හේතුවයි.

රූප සටහනේ සහ වගුවේ පෙන්වන පරිදි සිංහරාජ ව්‍යාප්තිය අංක 6 දරන කලාපයටත්, ශ්‍රීපාද අඩවිය අංක 14 දරන කලාපයටත්, තනල්ස් කඳුවැටිය අංක 12 දරන කලාපයටත්, හෝර්ටන් තැන්න අංක 15 දරන කලාපයටත් අයත් වේ. මීට අමතරව භාෂා සංග්‍රහ කලාප කිහිපයක්ම නියෝජනය කරන ව්‍යාප්තිය සඳහා කිසිම සංරක්ෂණ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක වී නොමැත. සිංහරාජ වනය මෙන්ම ශ්‍රීවි විවිධත්වයෙන් ඉහළ තැනක් ගන්නා කන්තේලිය, තානියාදෙහිය, දෙදියගල ව්‍යාප්තිය දැව කැපීමේ ඉහළම අයුරු අද ඉතා අසරණ තත්ත්වයක පවතී. මෙම ව්‍යාප්තිය සංකීර්ණයේ ඇති ශ්‍රීවි විද්‍යාත්මක සංරක්ෂණ වටිනාකම ඉතාමත් අධික බැවින් මෙම තත්ත්ව යටතේ වුවද එය සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගැනීම නොපමාව කඩිනමින් කළ යුතු දෙයකි.

මීට පෙර සඳහන් කළ වන කලමනාකරණය සඳහා තෝරා ගෙන ඇති හෙක්ටෙයාර 48,000 ට

අයත් වන්නේ පීටි විවිධත්වයෙන් ඉහළ මට්ටමක ඇති ව්‍යාප්තියකි. එම නිසා ඒවායේ පූර්ණ සංරක්ෂණය අතිවාර්ධයෙන්ම කළ යුත්තකි. තවුත් පසුගිය දශක කිහිපය තුළදී ඇති කරන ලද වන වගාවලින්, බලාපොරොත්තු වූ අත්දැකීම් දැව සහ උසුන් දර සඳහා ඇති ඉල්ලුම පියවීමට නිසිසේත් හැකි වී නොමැත. මේ නිසා ඉතිරිවී ඇති තෙත් කලාපීය වනාන්තර දැව නැපුම්කරුවන්ගේ උතුසු ඇස්වලට හිතැතිත්ම පහුවී තිබේ. මෙය මැඩ හැකීමට ඉදිරිපත් වීම සංරක්ෂණයේ තාමයෙන් අප විසින් දේශයට කළහැකි අනන්‍ය මෙහෙවරකි.

පසුගිය අවුරුදු දශකයටත් වැඩි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ නොට්ටාව, නත්තලිය, ගිලිමලේ, ගිහිපුම්කන්ද සහ සිංහරාජය වැනි වනාන්තර වල කරන ලද වන විද්‍යාත්මක ගවේෂණ අනුසාරයෙන් පහත සඳහන් සංරක්ෂණ ඇගයීමක් කිරීමට හැකි වී ඇත. ඉහත සඳහන් තැටුම් වනාන්තර පෙදෙස්වල හෙක්ටෙයාර 44 ක භූමිභාගයක වැඩුණු නාෂ්ටීය ඵනියයන් 29,500ක පමණ නියැදියකින් ලබා ගත් තොරතුරු අනුව නාෂ්ටීය වෘක්ෂ හා විශාල වැල් සහිත ශාක විශේෂ 231 ක පැතිරීම පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් කිරීමට හැකිවී ඇත.

මෙම ශාක විශේෂ 231 න් 184 ක්ම ලංකාවට ආවේණික ඵවා වන අතර, ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය සඳහා ඇති ජාත්‍යන්තර සංගමය මගින් පිළියෙල කරන ලද දුර්ලභ ශාක වර්ගීකරණයට අනුව එම ආවේණික ශාක 184 න් 172 ක් ම එනම් 93% ක්ම වඳවී යාමේ තර්ජනයට භාජනය වූ ඵවා බව ඵවායේ ගහනයන් පිළිබඳව පරීක්ෂාකිරීමේදී හෙලිදරව් වී තිබේ. මෙම සම්‍යක්ෂවලදී හඳුනා ගන්නා ලද ශාක වර්ග අතුරින් 23% ක්ම දැව නොවන ආර්ථික හෝ සමාජයීය වටිනාකම් (එනම් ඖෂධීය, ආහාර, තෙල්, මැලියම්, කෙඳි, අලංකාර) සහිත ඵවා බව සොයා ගෙන ඇත. ඉතිරි ශාක විශේෂවල අන් ආර්ථික වටිනාකම දැනට හඳුනාගෙන නොමැති වුවද, ඵවායේ තවමත් සැඟවී ඇති විභව වටිනාකම් තත්පරයක කළ නොහැක. උදාහරණයක් වශයෙන්, වල් දෙල්, ඇටඹ, වල් කුරියන්, වල් පමිබු, වල් කුරුඳු, වල් එතසාල්, වල් සාදින්නා හෙවත් මලබඩ, වල්

ගම්මිරිස් සහ පැතිරී තුලයට අයත් ශාකවල ඇති ව්‍යාධි ප්‍රතිරෝධී ලක්ෂණ ඉදිරි අනාගතයේදී අභිජනන ක්‍රියා මගින් තව මාදිලි බිහි කිරීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් වේ.

තෙත් කලාපයේ මෙන්ම විශලි කලාපීය වනාන්තරවලද මෙවැනි ආර්ථික අතින් වැදගත් කමක් ඇති ශාක මෙන්ම ඵවාට සම්ප සබඳතාවී ඇති වල්දර්ශ මාදිලි සහ විශේෂ ද දන්නට ඇත. මේවා අතර අපගේ ප්‍රධාන ආහාරයන් වන ධාන්‍ය, රතල ශාක, පළතුරු ශාක මෙන්ම ඖෂධීය ශාකද දන්නට ලැබේ.

මෙම ශාක සියල්ලම ස්වාභාවික පරිසරයන් තුළ ස්වාභාවික වරණයට ලක් වී වැඩෙන බැවින් එම පරිසරයට වඩාත් උචිත ජාත දර්ශ පමණක් පිටත්වීම සඳහා ඇති තියුණු තරඟයෙන් ජය ගනී. මේ හේතුව නිසා මෙම ස්වාභාවික ජාත දර්ශ නෘෂිකාර්මික ශාක මාදිලිවලට වැළඳෙන රෝග සඳහා ස්වාභාවික ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්නුම් කරයි. එමෙන්ම අඩු බහිෂ් ලවණ සහිත පසක එම ලවණ සංරක්ෂණය කිරීම මගින් පිටත් වීමට හැකි ශාක විශේෂ ස්වාභාවික වනාන්තරවල දන්නට ලැබේ. මෙවැනි විවිධත්වයකින් යුත් ස්වාභාවික ගහණයන්ගේ විභව වටිනාකම අප තවම හඳුනාගෙන නොමැත. ජෛව තාක්ෂණය සහ ජාත ඉංජිනේරු විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වැනි තව තාක්ෂණ ක්‍රම මගින් මෙම ශාකවල ඇති විවිධ ගුණාංග සහ ලක්ෂණ සඳහා හේතුවන ජාත හඳුනාගෙන ඵවා අන් ශාක විශේෂ වලට ඇතුල් කිරීමට ඇති අවකාශ අති මහත්ය.

මෙම වටිනාකම පැහැදිලිවම හඳුනාගෙන ඇති තියුණු රටවල විද්‍යාඥයින්, එම ශාක වර්ග බහුලව දන්නට ලැබෙන තිරණීය වනාන්තර වැනසි යාමට ප්‍රථමයෙන් ඵවා නෙසේ හෝ තම රටවලට ලබා ගෙන ශාකාහාරවළ හෝ අධි ශීත තත්ත්ව යටතේ හෝ දිගු කලක් තබා හැකීම සඳහා බලවත් උත්තේජවත් දත්වන අතර මේ සඳහා තියුණු තරඟයන්ද උද්ගත වී තිබේ. මෙම ශාක ස්වාභාවිකව දන්නට ලැබෙන රටවල පහවා ඇති තීති උල්ලංඝනය කරමින් පවා ව්‍යාකාරයෙන් වහනිවසුනු බලධාරීන් රටවා, මෙවන් ජාත මංකොල්ලයන් සිදුකරන බව ප්‍රචන් පත්වලින්

අනාවරණය වී ඇත. මෙම භාන සඳහා අනාගතයේදී ඇති විය හැකි අසීමිතඉල්ලුම මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වේ. නිසිදු අමතර වියදමකින් තොරව ස්වාභාවික පරිසර තත්ත්ව යටතේ ලංකාව වැනි තීරක්ෂීය රටවල වැටෙන මෙම භාන, අධික වියදමක් දරා දියුණු රටවල ජාත්‍යන්තර බැංකු තුළ රඳවාගෙන පරීක්ෂණ කටයුතුවලට නිරතුරුව භාජනය කරන අතර, අප තරයුතේ මිට ඉදුරාම වෙතක් ක්‍රියාවකි. සොබා දහම මානාවගෙන් අපට ලැබුණු මහඟුදායාද වන ස්වාභාවික වනාන්තර නිසිම හැඟීමකින් තොරව ඉවත් බවත් නොමැතිව අප විසින් තපා දමයි. මතු පරම්පරාවලට පවා හානි ගෙන දෙන මෙවන් ජාතික අපරාධ වැඩි වශයෙන් සිදුකරන්නේ දුප්පත් හේන් ගොවියන් තොව අදුරදුර්භී තණ්හාධින කුට ජාවාරම් කරුවන් බව තොරහසකි.

පුබල මහජන උද්ඝෝෂණයන් මධ්‍යයේ සිංහරාජ වනාන්තරයේ දැව කැපීම් තහර නිර්මාණය පසු එය අද තිවර්තන ලෝකයේ උසස්ම තත්වයේ තෙත් වනාන්තර රක්ෂිතයක් බවට පත්වී ඇත. පීටි සංරක්ෂණය මෙන්ම වන විද්‍යාත්මක අතින්ද වැදගත්කමක් ඇති දීර්ඝ කාලීන පර්යේෂණ නීතිපයන්ම එහි අරඹා ඇති අතර, වනවහා සඳහා යොදාගත හැකි දේශීය භානවල ගුණාංග පරීක්ෂාවට භාජනය කර තිබේ. දැනට ලැබී ඇති මූලික තොරතුරු අනුව මේ සඳහා භාන වර්ග නීතිපයන්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල පෙන්වා ඇත. සිංහරාජ වනාන්තරය දැනට හෙක්ටෙයාර 8800 ක ප්‍රමාණයෙන් යුතු වන අතර එය ජාතික හා අන්තර්ජාතික උරුම වනාන්තරයක් බවට පත්කර, එහි දැව කැපීම වැනි විනාශකාරී කටයුතු තහනම් කර ඇත. සිංහරාජයට නැගෙනහිරින් පිහිටි කඳුකර වනාන්තර හෙක්ටෙයාර 2450 ක් ද ඉදිරියේදී එයට ඇඳා හැඟීමට තියමිතය. මෙමගින් එම භාන සංග්‍රහ කලාපයේ ඇති පීටි විමිතුවයෙන් සැහෙන තොටසක් සංරක්ෂණය කිරීමට හැකිවේයයි විශ්වාස කෙරේ.


මහවැලි සංවර්ධන කලාපයේ හෙක්ටෙයාර 208,000 පමණ වන වස්තමුව, මාදුරුඔය යෝමාවතිය සහ මහවැලි විල්ලු ප්‍රදේශයන් ජාතික වනෝද්‍යාන රක්ෂිතයන් බවට නීති මගින් ප්‍රකාශ කර ඇත. මේ අතර හෝර්ටන් තැන්න,

තනල්ස් වනාන්තරය, ස්‍රීපාද අඹවිය වැනි තෙත් කලාපීය වනාන්තරය ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමයේ ආධාර සහ උපදෙස් ඇතිව ඉබ්බි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇත්තේය. තමුත් අවාසනාවකට තම් නොතරම් තීර්ථිති සහ වැඩ පිළිවෙලවල් සම්පාදනය කළද ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇති වන දුර්වලතා හිසා වන සංරක්ෂණයට වඩා වේගයකින් වන සංහාරය සිදු වීමයි.

මෑත කාලයේදී මහා පරිමාණයේ වන විද්‍යා සැලැස්මක් මගින්, අප රටේ ඉතිරිවී ඇති 9% ටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් යුත් තෙත් කලාපීය වනාන්තර විනාශ කිරීමට එරෙහිව දැරූ පුබල උද්ඝෝෂණයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එක් එක් වනාන්තරයේ සංරක්ෂණ වටිනාකම තීර්ණය කිරීමෙන් ඒවා සංරක්ෂණයට හේතු පෙන්වා දීමේ අවස්ථාවක් දැන් උදාවී ඇත. අවශ්‍යව ඇත්තේ ප්‍රමාණාත්මක විද්‍යාත්මක තොරතුරු මගින් එක් එක් වනාන්තරයේ ඇති සංරක්ෂණ වටිනාකම ලොවට හෙළි කර දීමයි. මෙය එක් අතකින් කළීම අධ්‍යාපනික අභ්‍යාසයකි. අනෙක් අතින් සමාජ හා වන විද්‍යා පර්යේෂණයකි. මේ සඳහා සංරක්ෂණයට ඇල්ම දක්වන සියලු දෙනාගේම ආධාර උපකාර මෙම සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කරන්නන්ට හා ක්‍රියාත්මක කරන්නන්ට ලැබිය යුතුය.

අද සිංහරාජ වනයට ලැබී ඇති සංරක්ෂණ සැලකිල්ල හෙට එවන් අත් වනාන්තරවලටද ලබා දීමට අප සියලු දෙනාම උත්තේජ විය යුතුය. ජාත්‍යන්තර ආයතනවලින් සිංහරාජ වනයට මෙතරම් සැලකිල්ලක් ලැබී ඇත්තේ එම වනාන්තරයේ විද්‍යාත්මක වටිනාකම ලොවට පෙන්වා දීමට හැකිවීම හා එහි දීර්ඝකාලීන පැහැදිලි පර්යේෂණ පද්ධතියක් ගොඩ නංවා තිබීම හිසාය. එය ආදර්ශයට ගෙන අත් වනාන්තර සඳහාද ජටත් වඩා පුළුල් සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘති අරඹා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා හැඟීමට අප මේ අවස්ථාවේදී වෙහෙසිය යුතුය. ඉදිරියේදී අපට තැවත වරක් මෙවන් මහඟු අවස්ථාවක් ලැබේදැයි සැක සහිත බැවිනි.

1 වැනි වගුව - ස්වාභාවික ව්‍යාප්තියේ පැතිරීම ආශ්‍රයෙන් සහස් තරණ ලද ලංකාවේ භූගෝලීය සංග්‍රහ කලාප



1. වෙරළ බඩ සහ මුහුදු තීරය
2. පහත රට වියළි සහ ගුණිත කලාපය
3. උතුරු පහත රට අතරමැදි කලාපය
4. නැගෙනහිර පහත රට අතරමැදි කලාපය
5. උතුරු පහත රට තෙත් කලාපය
6. සිංහරාජ සහ රත්නපුර නඳු කලාපය
7. දකුණු පහත රට නඳු කලාපය
8. තෙත් කලාපීය මිටිදිය ප්‍රදේශ
9. ශ්‍රීපාද අඩවියේ පහත් බෑවුම් සහ අඩගමුව
10. මධ්‍ය නඳුකර ප්‍රදේශය
11. නත්ද උඩරට සහ ඉහල මහවැලි ප්‍රදේශ
12. තතලස් නඳුපැටිය
13. රම්බොඩ ක්‍රමය එළිය ඇතුළු ප්‍රදේශ
14. ශ්‍රීපාද අඩවිය ඉහල බෑවුම ප්‍රදේශ
15. හෝර්ටන් තැන්න.

සටහන- එක් එක් භූගෝලීය ප්‍රදේශය තුළ ඉතිරිවී තිබෙන වනාන්තරවල විශාලත්වය පෙන්වීම සඳහා සිංහරාජ ස්වාභාවික වනාන්තරවල ව්‍යාප්තිය සහ 2-15 දක්වා භූගෝලීය ප්‍රදේශවල මායිම්.

වියළි කලාපය: භූගෝලීය ප්‍රදේශ 2 ආවරණය වන සේද, අත්තර් කලාපය භූගෝලීය ප්‍රදේශ 3,4 හා 12 ආවරණය වන සේද තෙත් කලාපය භූගෝලීය ප්‍රදේශ 5,6,7,9,11,13,14 සහ 15 ආවරණය වන සේද පැතිරී ඇති බව පෙනේ.

ව්‍යාප්තියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

එල්.සී.ඒ.උ.එස්. විජේසිංහ,
ස්වාභාවික සම්පත් බලගන්ති හා විද්‍යා අධ්‍යයනය,
කොළඹ 7.

හැඳින්වීම

ව්‍යාප්තියෙන් යනු සාමාන්‍යයෙන් උසට හා ඝනව වැඩුණු රුක් ආවරණයකින් යුතු පුළුල් භූමි භාගයක් වශයෙන් හැඳින්විය හැක. වන විද්‍යාව එහි පුළුල්ම අරුතින්, ව්‍යාප්තිය පිහිටුවීම සහ/හෝ කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාව හා කලාව වේ. ව්‍යාප්තියක ගස් අවශ්‍යයෙන්ම ස්වාභාවික මාර්ගයන්ගෙන් පැන නැගී ඒවා විය යුතුම නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අද ලොව ඇති ව්‍යාප්තියවලින් බොහොමයක් එක්තරා සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිසා විසින් පිහිටුවා ඇති ව්‍යාප්තිය (වන වගාවක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන) හෝ මිනිසා විසින් අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් කර ඇති ස්වාභාවික ව්‍යාප්තිය වේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු බොහෝ රටවල, නුදුරු අතීතයේ ව්‍යාප්තිය ආවරණයක් නොපිහිටා තිබූ ඉඩම්වල ව්‍යාප්තිය භාන විශේෂයක් වශයෙන් කරනු ලැබේ. මෙම පිළිවෙත වන වගාව යනුවෙන් හැඳින්වේ. වන වගාව සඳහා යට කරනු ලබන ඉඩම ජව කලින් වන ආවරණයක් සහිත වූ එකක් වන කල්හි මෙහි පිළිවෙත හඳුන්වනු ලබන්නේ "තැවත වන වගාව" වශයෙනි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ තැවත වන වගාව පුළුල් ලෙස කර ගෙන යනු ලැබේ.

ව්‍යාප්තිය සඳහා ව්‍යවහාර වන වෙනත් වචන වේ. උස ගස් නොමැති විවෘත කැළැ පුද්ගල "ලන්ද" යන වර්ගයට අයත් වේ. "ජංගල්" යනු ඉංග්‍රීසි ව්‍යවහාරය සඳහා සහසා ගත් ඉන්දියානු වචනයක් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ඉන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යාප්තිය ස්වරූපයක් ගෙන දෙන ගස් හා ලදු රෝපණ ගණනකි. අප්‍රිකාව පුරාම සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ "බුෂ්" යන වචනය

භාවිතා කරන්නේ මෙහි කැළැ විශේෂය හැඳින්වීමටය.

හිස්ව තිබෙන්නට ඉඩ හරින පුද්ගලයන් තිතරම භාන ජනපදකරණයට පාත්‍ර වන බව අපට හිටිකණයන්ගෙන් දැන ගන්නට පුළුවන. යම් පුද්ගලයකු ජනපදික වන භාන විශේෂය, මූලික වශයෙන් රඳා පවත්නේ පුද්ගලයට පිටින් ඇති භානවලින් (ප්‍රමාරනයන් විසිර යාම හේතුකොට ගෙන) එම පුද්ගල වෙත ළඟාවන ප්‍රමාරන වර්ගය මතය. ඒ හැරුණු විට පුද්ගලයට ලැබෙන ප්‍රමාරනයන් අයත් භාන විශේෂවලට හැලපෙන දේශගුණික හා පාංශු සාධන මතද මෙය රඳා පවතී. මෙසේ සංස්ථාපනය වන භාන ජනපදය ස්ථිර එකක් නොවන්නට පුළුවන. භාන සිය වාස භූමිය නෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරයි.

එනම්, පරිසරයේ වෙනස්කම් ඇති වේ. තිදසුනක් වශයෙන්, භානවල තැඹි යාම හා දිරාපත් වීම හේතුකොට ගෙන ඓතිහාසික ද්‍රව්‍ය එකතු වන්නට පටන් ගනී. සාමාන්‍යයෙන් මෙම වෙනස්වීම් තිසා පාංශු තත්ත්වය හා ක්ෂුද්‍ර දේශගුණය දියුණු වේ. මෙසේ වෙනස් වූ තත්ත්වයන් යටතේ, ඇතැම් භාන වාසය සඳහා ක්ෂුද්‍ර යයි කලින් සැලකූ පුද්ගලවල තහවුරු වන්නට පටන් ගන්නා අතර මුල් ජනපදිකයෝ ක්‍රම ක්‍රමයෙන් එම පුද්ගලවලින් ඉවත්ව විසිර යති. වෙනස් වීමේ මෙම ක්‍රියා වලිය "භාන අනුප්‍රාප්තිය" වශයෙන් හැඳින්වේ. සැම තැනකම, තිසි සාත්තුවකින් තොරව පවතින ගෙවත්තක ප්‍රචද මෙම තත්ත්වය දැකිය හැකිය. සොබා දහමේ ක්‍රියාදාමයට ඉඩ දී සිටියහොත් අවසාන වශයෙන් පුදුරු සහ ජව අතහැරුව ගස් වර්ගද එම

ස්ථානය සිය වාසභූමිය කර ගැනීමට ඉඩ තිබේ. අනුප්‍රාප්තික ක්‍රියාවලියේ අවසාන අවස්ථාව උත්තරීත පරිසරයක් ඇති වීමයි.

එහෙයින් තිසියම් ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්තතා කෙරෙහි බලපාන සාධක වන දේශගුණය හා පස ඉතාමත්ම මැනවින් පිළිබිඹු කරන්නකි, එම ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති උත්තරීත ශාක ප්‍රජාව. ලෝකයේ ප්‍රදේශ බොහොමයකම ස්ථාවර පරිසර පද්ධතිය ව්‍යාප්තතාව වේ. එක් කලෙකදී, එනම් ස්වාභාවික ව්‍යාප්තතා සමග භවිත මිනිසා විනාශකාරී අත්දැකීම් ගැටෙන්නට පෙර, ඇත්තෙන්ම ලොව බිම් ප්‍රදේශයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි තිබුණේ ව්‍යාප්තතාවලිනි. මෙම ප්‍රදේශයෙන් වැඩි හරියක් දැනට සල ගොවිතැන, සංවිධිත කෘෂිකර්මය හා කර්මාන්ත සඳහා අමු ද්‍රව්‍ය සැපයීම යනාදිය සඳහා එලිකර තිබේ.

ඉහත සඳහන් දෙයින් පැහැදිලි වන්නේ, ඕනෑම ප්‍රදේශයක එක් අතකින් පිටින් අතරක් අතෙන් අතින් පස හා දේශගුණය අතරක් අත්තර් සම්බන්ධතාවක් පවතින බවයි. උත්තරීත ව්‍යාප්තතාවයක් වූකලී ප්‍රදේශයක වර්ධනය වන ස්ථාවර පරිසර පද්ධතියකි. එවන් පරිසර පද්ධතියක පෙරට සාධක (ගස්, පඳුරු, පැලෑටි, සතුන් සහ පසෙහි සිටින ජීවීන්ද ඇතුළු සූදු ජීවීන්) එකිනෙක අතරද, එකී සාධක හා අපෙරට සාධක වන දේශගුණය හා පස අතරද සමතුලිතතාවයක් පවතී. යම් ප්‍රදේශයක උත්තරීත පරිසරය විනාශකර, සොබාදහමේ ක්‍රියාදාමයට ඉඩ හැරියොත්, නැවතත් අනුප්‍රාප්තික ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වී අවසාන වශයෙන්, සමහර විට දහන ගුණතාවකට පසුව නැතහොත් සියවස් කිහිපයකට පසුව උත්තරීත තත්ත්වය උදාවන තෙක් එකී ක්‍රියාවලිය යුතු වී ගෙන යයි.

ව්‍යාප්තතාවයකින් තියෝජනය වනුයේ, ප්‍රයෝජනයට නොගෙන ඇති ඉඩම් හෝ දැව ගබඩාවක් බව ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල දැක දෙන තුනකට පෙර මුල් බැසගෙන තිබූ සංකල්පයකි. ඉඩම් හෝ දැව අවශ්‍ය වූ විට වනය එලිපෙහෙලි කෙරිණ. පසුගිය දහන කිහිපය තුළදී මෙම තත්ත්වය විස්මයජනක අයුරින් වෙනස් වී ඇති අතර, දැනට ලොව පුරා විශාල වශයෙන්

කෙරීගෙන යන ව්‍යාප්තතා විනාශය පිළිබඳව සැහෙන අවධානයක් යොමු වී ඇත. නමුත් යමකු කථා කළේ දැව වශයෙන් හෝ වෙනත් නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් හෝ නිතමී ද්‍රව්‍යයක් ව්‍යාප්තතාවයෙන් ලබාගත හැකිද යන කරුණ ගැන පමණක් වුවද දැන් පිළිගෙන ඇත්තේ මිනිස් පරිසරය හිතකර කිරීමෙහි ලා ව්‍යාප්තතාවයකින් වැදගත් මෙහෙයක් සිදුවන බවයි. ඒ අනුව, මිනිස් ජීවිතයට අදාල වූ විශේෂ කාර්යයන් දෙකක් ව්‍යාප්තතාවලින් ඉටු වන බව පෙනේ. මේ කාර්යය යුගල සංක්ෂිප්තයෙන් "නිෂ්පාදන" හා ආරක්ෂණය යනුවෙන් කෙටියෙන් විස්තර කළ හැක. ආරක්ෂණය හා නිෂ්පාදනය එකිනෙක හා ගැටෙන කාරණා දෙකකි. එකකින් ඉල්ලුම් කරන්නේ ව්‍යාප්තතාව සංරක්ෂණය කිරීමයි. අනෙකින් ඉල්ලුම් කරන්නේ ව්‍යාප්තතාව ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගැනීමයි. එනිසා අඛණ්ඩ පදනමක් මත නිෂ්පාදනය පවත්වා ගෙන යාමට නම් ව්‍යාප්තතා කපා ඉවත් කිරීම එහි වර්ධන වේගය ඉක්මවා නොයන බවට වගබලාගත යුතුය. උද්භිද විද්‍යාව (මල් හා එළ දැරීම), පාංශු විද්‍යාව (විවිධ වර්ග සහ අදාල පාංශු වර්ග), සත්ව විද්‍යාව (ගස් හා භාවිතවන දැව කෙරෙහි කෘමීන් හා වෙනත් සතුන්ගේ බලපෑම), ඉංජිනේරු විද්‍යාව (ව්‍යාප්තතා මංමාවත් හා ගොඩනැගිලි) ආර්ථික විද්‍යාව (ආර්ථික හේතූන් මත බොහෝ ව්‍යාප්තතාවල වැඩ දායක බව සහතික කළ යුතුය.) ආදී සංකීර්ණ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්‍ය කරවන ව්‍යාප්තතාවයක් වන ව්‍යාප්තතා කළමනාකරණය යටතේ ඉහත සඳහන් කරුණු මෙන්ම වෙනත් පුස්තක බොහොමයක්ද විසඳිය යුතුව තිබේ. වන විද්‍යාව යනු "ව්‍යාප්තතා කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාව හා කලාව" වශයෙන් අර්ථ විවරණය කර ඇත්තේ නිතමී කරුණු පදනම් කර ගෙනද යන්න දැන් පැහැදිලි වනු ඇත.

ව්‍යාප්තතාවයෙන් උපයෝගී ලබන ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ පසුව විස්තර වේ. නිෂ්පාදනය ගැන සලකන කළ, ප්‍රධානතම නිෂ්පාදනය දැව බව පැහැදිලිය. මිනිසාට ඇති වැදගත්කම අතින් අද හඳුනා ගන්නා මෙම ද්‍රව්‍යය කඩදාසි හා තැන්පිටි නිෂ්පාදනය, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ රෙසෝල්ට් පිළිය සැපයීමේ හා විදුලි පහිවිඩි කටයුතු,

ඇතත්, සවිනිධිවේ නණ්‍ය යනාදි අවශ්‍යතා බොහොමයකට උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

දැව් හැරුණු විට ව්‍යාන්තරයෙන් උපයාගන්නා වෙනත් නිෂ්පාදන විශාල සංඛ්‍යාවක් වේ. ලාක්ෂ්‍ය (ඉන්දියාවේ වැදගත් කම්පාත්තයකි), ඛණ්ඩය නිෂ්පාදන (උදා:- අරට, බුර, තෙල්ලි, වෙතිවැල්ගැට යනාදිය) වර්ජනවයින් (පයින් ගසින්), බීඩි කොළ (Diosyros Melamoxylon) යනාදිය මීට ඇතුළත්වේ. මෙම සියලු ද්‍රව්‍ය පොදු වශයෙන් "සුළු ව්‍යාන්තර නිෂ්පාදන" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

අතියම් ප්‍රතිලාභ

සාමාන්‍යයෙන්, මිනිසාට වඩාත් හිතකර වන අයුරින් පරිසරය සකස් කරමින් ඒ කෙරෙහි ඉමහත් බලපෑමක් ව්‍යාන්තර මගින් ඇති කරනු ලැබේ. මෙය ව්‍යාන්තර මගින් මිනිසාට සලසන ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභයකි. රටක ස්වාභාවික ව්‍යාප්තතා නියෝජනය කරන දේශීය ජාත සම්භාරය ආරක්ෂාකර පවත්වා ගෙන යාම සඳහාද ව්‍යාන්තර සංරක්ෂණය අවශ්‍ය වේ.

ව්‍යාන්තර හා වර්ෂාපතනය

දේශගුණය හා පස යන දෙක නිසියම් තිත්විත ප්‍රදේශයක වඩිතය වන ව්‍යාන්තර විශේෂය නිර්ණය කරන වැදගත් පාරිසරික සාධක බව ඉහතින් සඳහන් කරන ලදී. කෙසේ වුවද, ව්‍යාන්තරය මෙම දේශගුණය හා පස යන සාධක සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක යෙදෙන අතර එකී සාධක වෙනස් තත්වයකට පත් කරයි.

දිවයිනේ වර්ෂාපතන කලාපය ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්ණය කරන නිරිතදිග හා ජසාන දිග මෝසම් සුළං සඳහා මුල්වන සාධක පිහිටා ඇත්තේ රටින් බොහෝ ඇතය. එම සාධක කෙරෙහි ව්‍යාන්තර ඇති තැනි බව බල නොපායි. කෙසේ වුවද පහත සඳහන් ආකාරයෙන් වර්ෂාපතනය කෙරෙහි ව්‍යාන්තර බලපෑමට ඉඩ තිබේ.

(අ) සෞර විකිරණයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ව්‍යාන්තරය තුළ වාෂ්පී - උත්ස්වේදනය හා උණුසුම් තෙත් වාතධාරාවක් ඉහළට ගමන් කිරීම

සිදුවේ. මෙම වාතය ව්‍යාන්තර විසතින් බොහෝ ඉහළට නැගීමෙන් අනතුරුව ඉහළ වායුගෝලයේදී සිසිල් වන විට, (උණුසුම්ව පැවති තත්ත්වයේදී වාෂ්ප ස්වභාවයෙන් එය තුළ තැබූ ජලය තව දුරටත් රඳා සිටිය නොහී) ඝනවී, වර්ෂාව ලෙස පහළට වැටේ. මෙය සම්ප්‍රදායික "වර්ෂාව" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

(ආ) සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාන්තරයක පවතින ආර්ද්‍රතාවය ඉන් පිටත ආර්ද්‍රතාවයට වඩා සාපේක්ෂ වශයෙන් ඉහළය. මෙය මෙසේ සිදුවන්නේ ව්‍යාන්තර තුළ වාෂ්පීකරණය හා උත්ස්වේදනය වඩා අධිකවීම හා වායු චලනය සීමා සහිත වීම හේතුකොට ගෙන ආර්ද්‍ර වාතයට ස්ථිතිකව පැවතීමට ඉඩ ලැබෙන නිසාය. ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාසවල, එනම් විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ පවතින්නාක් මෙන්, දිවා රාත්‍රී උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන්හි විශාල වෙනසක් ඇත්තේ නම්, දිවා කාලයේදී ව්‍යාන්තරය තුළ රැඳී ඇති ආර්ද්‍රවාතය රාත්‍රී කාලයේදී සිසිල් වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ජල වාෂ්ප ඝන වී දිය බිංදු වශයෙන් ශාක පත්‍රවලින් පහළට වැටෙයි. නැතහොත් ශාක කඳ දිගේ පහළට ගලයි. ඒ ආකාරයෙන් පසෙහි ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වේ. මෙය අදෘශ්‍ය වර්ෂණය නම්.

(ඉ) තෙතමනය රැගත් සුළඟ කඳුවැටි ඉහලින් ගමන විට එය වඩාත් සිසිල් පෙදෙස් තෙක් ඉහළට තල්ලු වී, එහිදී තෙතමනය ඝනවී, වර්ෂාව ලෙස පහළට වැටෙයි. කඳුවැටි මත ව්‍යාන්තර ඇත්නම්, (ව්‍යාන්තර විසතක් පිහිටා තිබීම හේතුකොට ගෙන) වඩාත් උස මට්ටමකට සුළඟ යොමු වී තෙතමනය ඝන වීමද වැඩි වේ.

සුළං වේගය පහළ දැමීම කෙරෙහි ඉමහත් බලපෑමක් ව්‍යාන්තරවලින් සිදුවන අතර ඒ අනුව අධික වේගයෙන් සුළං ගමන ප්‍රදේශ වඩාත් හිතකර තත්ත්වයකට පැමිණේ. දැඩි ලෙස ගමන සුළඟට පාත්‍රවන, ව්‍යාන්තර තොමැති ප්‍රදේශවල ආවරණ වශයෙන් තීරු ස්වරූපයේ වන වගාවන් පිහිටුවීම සාමාන්‍ය වන විද්‍යාත්මක පිළිවෙතකි. මේ අනුව, කැප්පෙට්ටිපොළ (කලනදී පාලුගම නමින් හඳුන්වන ලද) වියළි පතක් සහ හරස්බැඳි (රාගල අසල) යනාදී ප්‍රදේශ වල සුළං බාධක ලෙස ක්‍රියා කිරීම

සඳහා සුනාලිප්තවස් සහ වෙනත් ශාක විශේෂයන්ගෙන් යුත් ආවරණ තීරු වහසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදිකර තිබේ. වන වහා විශේෂයන්ගෙන් යුතු මෙම සුළං බාධක සාමාන්‍යයෙන් ඉදි කරනු ලබන්නේ සුළං හමන දිශාවට හැකි තරම් හරස්ව පිහිටි තීරු ස්වරූපයෙනි. තනි ගස් පේළියක් එලඳායන සුළං බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා නොකරයි. ඒ සඳහා යටත් පිරිසෙයින් පේළි තුනක්වත් අවශ්‍යවේ. එනම් මැද පේළිය උස් මුදුන් සහිත ගස්වලින්ද ඒ දෙපස සමාන්තර පේළි, පහළින් අතු බෙදෙන, ජට වඩා බීජ පත්වලින් යුතු ඒවා වශයෙනි.

සුළං බාධකයක් ලෙස සිටුවා ඇති ගස්වල උස මෙන් විසි ගුණයක් විශාල පෙදෙසක සුළගේ වේගය පහත හෙළිමට එම ගස් සමත් වේ. එහෙයින් විශාල ප්‍රදේශ සඳහා, සමාන්තරව පිහිටි සුළං බාධක ගණනාවක් අවශ්‍යය.

භෞතික ගුණාංග අතින් සලකන කල වනාන්තර පස් හා විවෘත ප්‍රදේශයක පස් අතර සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් වෙනසක් පවතී. සාමාන්‍යයෙන් වනාන්තර පසක් කැබලි සහිත ව්‍යුහයකින් සහ ජලය රඳා ගැනීමේ අධික ධාරිතාවකින් යුක්තවේ. රොඩු බොඩු සහ වෙනත් දිරා යන ශාක හා සත්ව අපද්‍රව්‍ය ස්වභාවයෙන් එන්නිෂ්ට ද්‍රව්‍ය එකතු වීම එහි තිරත්තරයෙන් සිදුවේ. එහි සාරවත් ක්ෂුද්‍ර ශාක හා ක්ෂුද්‍ර ජීවී සත්ත්වද වෙයි. වනාන්තර පස මුදු ගත්තක් වැනිය. එබැවින්, ජලය යහමින් තිබෙන විට එය පසට උරාගෙන වියළි කාලයේදී ආපසු මුදා හැරීමට වනාන්තර පස සමත් වේ.

අධික වණි කාලයේදී වනාන්තරයක සිදු වන්නේ කුමක්ද? පළමුවෙන් ශාක පත්‍ර සහ අතු තෙත් වෙයි. ඒ සඳහා සැහෙන ජල ප්‍රමාණයක් යෙදවේ. නොකඩවා වැසි වැටෙන විට, ශාක කඳ දිගේ පහලට ගලමින් හා පත්‍රවලින් පහලට වැටෙමින් භූමිය වෙත ජලය ළඟාවේ. මෙහිදී, පස මත වණිව පතනය වීමෙන් ඇති වන "ගැටුමේ" බලපෑම වනාන්තර එළිකර ඇති ප්‍රදේශයක වැසි වැටීමෙන් සිදුවන දැඩි බලපෑමට වඩා බෙහෝ සෙයින් අඩුය. තවද, විවෘත ප්‍රදේශවල දක්නට නොමැති, තරමක් ඝනකම

කොළරොඩු තට්ටුවකින් වනාන්තර පස ආවරණය වී ඇත. එහෙයින් බිහිප සහිත පස, ඒ මතුපිට පැමිණෙන ජලය ක්ෂණිකව අවශෝෂණය කර ගනී. පසට හැකි පමණ ජලය උරාගත් පසු, ඉතිරිය පස තුල ගැඹුරට කාන්දු වී ජල මට්ටම දක්වා ගමන් කරයි. දිගු කලක් වැසි පැවති පසු ජල මට්ටම ඉහල තිබියි. මේ තිසා තැනින් තැන පොළව මතුපිට උල්පත් පැන තහිනු දක්නට ලැබේ. ජලය රඳා ගැනීමේ අධික ධාරිතාවක් පසේ පවතින තිසා වැසි නොමැති කාලවලදී පවා පස තෙත් ගතියෙන් යුක්ත වන අතර වියළි කාලයේදී වුවද ජල මාගී දිගේ සැහෙන ජල ප්‍රමාණයක් ගලයි. වනාන්තරයක තද වැසි පවතිද්දී, පොළව මතුපිටින් ජලය ගලා යෑමක් සිදු වුවද ජලය (රොත්මඩ රහිත) පැහැදිලි බවකින් යුක්ත වේ.

වනාන්තර එළිකර ඇති ප්‍රදේශයක වැසි වැටෙන කල, වැහි බිංදු කෙලින්ම පස මතුපිටට වැටෙන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, විවරයන්ගෙන් සහ කැබලිවලින් යුත් පස් ව්‍යුහය ඉක්මනින්ම විනාශ වී යයි. එන්නිෂ්ට ද්‍රව්‍ය පතනය අඩුවෙන් පවත්නා තිසා මෙම ක්‍රියාවලිය තවත් වේගවත් වේ.

එබැවින් වනාන්තර එළිකර ඇති ප්‍රදේශයක වසින වණිවෙන් සැහෙන ප්‍රමාණයක් පොළව මතුපිටින් ගලා යයි. එසේ ගමන් කරන ජලය, මතුපිට පස රැගෙන යමින් තලං බාදනය හා ගලි බාදනය ඇති කරයි. පුබල වේගයෙන් ගලන ජලය මගින් ගෙන යනු ලැබෙන රොත් මඩ හා වෙනත් පස් අංශු අත්තිවේදී ගංගා පත්ලෙහි තැන්පත් වේ. මෙය සිදුවන්නේ ජලය ගැලීමේ වේගය අඩුවීම අනුව ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමේ හැකියාව පහල බැසීම හේතු නොව ගෙනය.

වසදින් වසරට උද්ගත වන මෙම තත්ත්වය, ගංගා පත්ලෙහි මට්ටම ඉහල දැමීමටද ඒ අනුව ජල ගැලීම් උද්ගත කිරීමට හා තීව්‍ර කිරීමටද හේතු වේ. අනෙක් අන්තයෙන්, වැසි රහිත කාලවලදී, කලින් තෙත් කාලගුණයන්හිදී ලැබුණු වණි ජලයෙන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් පමණක් රඳවා ගෙන සිටි පස වියලී යන අතර, වියලි කාලයේදී උල්පත්වලින් ගලන ජලප්‍රමාණයද ඉතාමත් හීන වේ. එහෙයින් විශාල ලෙස වනාන්තර එළි කිරීම

හිසා, වණි කාලයේදී වඩා බලවත් ජලගැලීම් තිරහැර හට ගනී. වර්ෂා රහිත කාලයේදී වඩාත් නර්තන හිසා තත්ත්වයන් පැන නගියි. මෙසේ වනාන්තර හිසා පසෙහි අත්තර්ගත ජල ප්‍රමාණය නෙරෙහි මෙන්ම සමස්ත පරිසරය නෙරෙහිම ඇති කරන බලපෑම, වණිපතනය වැඩිකිරීම සඳහා වනාන්තරයෙන් ඉටු වන මෙහෙයට වඩා වෙසෙසින් වැදගත් වේ.

ජාන සංරක්ෂණය

රටේ ශාක සත්තනික නියෝජනය කරන ජාන සම්භාරය (ජාන ද්‍රව්‍යවල එකතුව) ආරක්ෂා කිරීම වනාන්තරවලින් ලැබෙන තවත් ප්‍රතිලාභයකි. ශ්‍රී ලංකාව ගැන සලකන කල ජාන සමූහය ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් වන්නේ මෙරට ඇති සුප්‍රසිද්ධ ශාකවලින් හතරෙන් එකක් පමණ මෙරටට ආවේණික, එනම් මෙරටෙහි පමණක් දැකිය හැකි ශාක වන හිසාය. මිනිස් ප්‍රයෝජනය සඳහා ගස් කැපීම තවත්වා දමා, ස්වාභාවික වනාන්තර ප්‍රමාණය හිසිලෙස ආරක්ෂා කර නොගතහොත් මෙම ආවේණික ඇතැම් ශාක වඳවී යාමට ඉඩ ඇත. ඒ අනුව වසර මිලියන ගණනාවක් තුළ පරිණාම ක්‍රියාවලියට භාජනය වී ඇති ජාන ද්‍රව්‍ය (මෙහි ශාක විශේෂයන්ගෙන් නියෝජනය වන) සඳහටම තුරන් වීමේ සැබෑ ආපදාවටද පාත්‍රවනු ඇත. මෙය සත්ව සත්තනික සම්බන්ධයෙන්ද බලපායි. මේ හේතුකොට ගෙන වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් "යුතෙස්නෝ" ආයතනයෙහි "මිනිසා හා ජෛව ගෝලය" වැඩ සටහන යටතේ, දිවයිනේ ප්‍රධාන ජෛව දේශගුණික කලාපයන්හි ඇතැම් ස්වාභාවික වනාන්තර ප්‍රදේශ මායිම් කර, ඒවා විශේෂ සංවිත ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. සිංහරාජ සංවිතය මින් එකක් වන අතර මෙහි විශාලත්වය වූ අක්කර 22000 ත් හතරින් එකක පමණ ප්‍රමාණයක කලින් කෙටි ගෙන ගිය දැව සඳහා ගස් හෙළීම දැන් තවත්වා ඇත.

සෘජු ප්‍රතිලාභ

වනාන්තරයේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය වන දැව සපයා ගැනීම මිනිසා වනාන්තරවලින් ලබන ප්‍රධාන සෘජු ප්‍රතිලාභයයි. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අතුරින් පැරණිතම එකක් වන දැව තවමත් ඒ සඳහා

සුදානම් භාවිතා වේ. සත්තිසම්පන්න බව අනුව සඳහා බලන විට දැව සාපේක්ෂ වශයෙන් සැහැල්ලු ද්‍රව්‍යයක් වන හෙයින් තරමක ලී නොටයන් වුවද මිනිසෙකුට දසුලා ගෙන යන්නට පුළුවන. ඒ හිසා අත් ද්‍රව්‍යවලට වඩා දැව භාවිතය පහසුය. සුළු උපකරණ භාවිතා කරමින් ඉතා පහසු ලෙස දැව ආශ්‍රිත කටයුතු පහසුවෙන් ඉටුකර ගත හැකි වන අතර ඕනෑම ඉදිකිරීම් වැඩකටම පාහේ දැව උපයෝගී කර ගත හැක. ජෙයොන්, තුනි ලැලි ආදිය නිපදවීම වැනි විවිධ අවශ්‍යතා සඳහාද දැව භාවිතා කරනු ලැබේ. මේ අනුව දැව, වනාන්තරයෙන් ලබාගන්නා ඉතාමත්ම වැදගත් හා ප්‍රයෝජනවත් නිෂ්පාදිතය වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය වනාන්තරවලින් අවුරුදු පතා දැව ඝන අඩි දස ලක්ෂ පහක් පමණ (ඉත්ඛත, දැව ගැර) සපයා ගනු ලැබේ. දැව කණු බොහෝ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනේ. විදුලිය බෙදාගැනීම හා විදුලි පණිවුඩ උපකරණ සඳහා ගන්නා කණු හා ගම්බද ගෙවල් සෑදීමේදී ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යයන් වශයෙන් ද ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම අනෙකුත් දියුණු වෙමින් පවතින රටවල දැව උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. ගෙදර දොර ආහාර පිසීම සඳහා යොදා ගැනීම දැවවලින් ලැබෙන ඉතා වැදගත් ප්‍රයෝජනයකි.

වනාන්තරයෙන් ලබා ගත හැකි තවත් නිෂ්පාදිත විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. මේවා පොදු වශයෙන් ගත් කල "සුළු වනාන්තර නිෂ්පාදිත" යනුවෙන් හැඳින්විය හැකිය.

සුළු වනාන්තර නිෂ්පාදන

දැව හැරුණු විට වනාන්තරයෙන් ලබා ගන්නා නිෂ්පාදන විශාල සංඛ්‍යාවක් වේ. ඒවායින් සමහරක් සැලකිය යුතු වාණිජමය වැදගත් කමකින් යුක්තය.

ගම් පදවි කිරීමේදී භාවිතා වන වැහිත් යුෂය Acacia Mollissima වලින් ලබා ගන්නා නිෂ්පාදිතයකි. මෙහි ශාක විශේෂය වැටෙන්නේ කඳපොල ප්‍රදේශයේය. කරන ලද අත්හදා බැලීම් කිහිපයකට බාහිරව තවමත් වැහිත් යුෂය ලබා ගැනීම වාණිජමය වශයෙන් කර ගෙන යනු නොලැබේ.

නබොලාන ශාක විශේෂවලින් හා Cassia Auriculata (රණවරා) වලින්ද හම් පදම් නිධීමට භත්තා ද්‍රව්‍ය සැපයේ. Eucalyptus Spp. සපිපුස්, පසිතස් යනාදී වනාන්තර ශාක විශේෂවලින් විවිධ වාෂ්පශීලී තෙල් සපයා ගනු ලැබේ. Canarium Zeylanicum (තැතුණ) වල පොත්ත නැපීමෙන්, සුවඳ දුමක් වශයෙන් භාවිතා කිරීමට සුදුසු ඖෂධෝරෙසින (Oleresin) වර්ගයක් ලබා ගත හැක. මැලියම් වර්ග සපයන ශාක විශේෂ ද ගණනාවක් වෙයි. Dipterocarpaceae කුලයට අයත් ශාක වලින් "ෆ්‍රෙන්ච් - පොලිෂ්", වාර්තිෂ් වැනි දේ, පිළියෙල

තර ගැඹීම සඳහා උපයෝගී කර ගත හැකි "රෙසින්" ලැබේ.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය නවයුතු සඳහා භාවිතා වන උපයෝගී (ශාක පොතු, ගෙඩි, තැටි යනාදිය) එකතු කර ගත්තේ වනාන්තර වලිනි. බීඩ් තිෂ්පාදනය සිං ලංකාවේ වැදගත් කර්මාන්තයකි. Diospyros lanoxylon වල පත්‍ර, බීඩ් එකම සඳහා උපයෝගී කර ගනු ලැබේ. මේවා සිං ලංකාවේ ඇතැම් වාණිජමය වශයෙන් උපයෝගී කර ගත හැකි තරම් විශාල ප්‍රමාණයෙන් සපයා ගැනීමට තුදුරුවන.

තනාල්ස් ප්‍රදේශයේ ජල විද්‍යාත්මක අංශ නීතියක්

එම්. එම්. බණ්ඩාරතිලක

නියෝජ්‍ය ව්‍යාපාරික සංරක්ෂක

සහ

ව්‍යාපාරික සමාජයාචාර්‍ය - තනාල්ස්

1. හැඳින්වීම

තනාල්ස් ප්‍රදේශය යනුවෙන් හැඳින්වෙනුයේ දුම්බර විවිධාංගීකරණ නිසා මධ්‍යම කඳුකරයට අයත් සෙසු ප්‍රදේශයෙන් වෙන්වී ඇති, (මහනුවරට පසාතදිගින් පිහිටි) කඳු සමූහයයි. මෙම ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන කොටස් වයඹදිගින් ලන්හල සිට පසාතදිගින් මැදමහනුවර දක්වා විහිදෙන කඳුවැටියට අයත් වේ. කඳුවැටිය උස් ශිඛර නීතිපයනින් සමන්විතය.

ඒවා නම් - උසම ශිඛරය වන ගොම්බනිය (6248), තනාල්ස් (6112), කෙහෙල්පොත්දොරුවෙහල (6016), නිට්ගල්පොත්ත (5403), දුම්බරහල (5385), කලුපහන (5341), දොලවුහල (5164), වමාරාපුහල (5110), කෙලවුහල (4368) හා ලන්හල (4342) වේ. (තුරේ 1986).

තනාල්ස් කඳුවැටිය මෝසම් සුළං වාර දෙකෙහිදීම සාර්ථක බාධකයක් වශයෙන් ක්‍රියා කරයි. නිට්තදිග මෝසම් සුළං තරණකොටගෙන බටහිර බෑවුම්වලට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන අතර ඔක්තෝබර් සිට ජනවාරි මාසය දක්වා හමන පසාත දිග මෝසම් සුළං කාලයේදී තුණාටු සහිත ඉතා අධික වර්ෂාපතනයක් මුළු ප්‍රදේශයටම ලැබේ. තනාල්ස් ප්‍රදේශය මහවැලි ද්‍රෝණියේ අධික වර්ෂාපතනය සහිත ප්‍රදේශයන්ගෙන් දෙවෙනි තැන ගන්නා පෙදෙස වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය. තොසෙතුන් සදාකාලික ගංගාවල ආරම්භක ස්ථානය වන තනාල්ස් කඳුවැටිය මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණිය සඳහා ඉතා වැදගත් ජලධාරිත ප්‍රදේශයක් වේ. මෙම ප්‍රදේශයේ උතුරින් පිහිටා ඇති නවගහ, තැගෙනහිරින් හීන් ගහ සහ දකුණින් හුලු

ගහ, මහවැලි ගඟට සහ එයට අයත් ජලාශයන්ට සදාකාලිකව ඡලය සපයන වැදගත් අනුගංගාවෝය.

දළ වශයෙන් දිවයිනේ මුළු භූමි ප්‍රදේශයෙන් 39% ක් හා වියළි කලාපයෙන් 55% ක් පමණ වන හෙත්වයාර දශලක්ෂ 2.5 ක ප්‍රදේශයක් මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයට අයත් වේ. වියළි කාලයේදී ප්‍රමාණවත් තරම් වාරිමාර්ග ජලය නොලැබීම හැරුණු විට ජලමාර්ගවල ජලය අඩුවීම හා ජලාශවල රොත්මඩ එනතුටුම බාදනයට තුඩුදේ. මේ නිසා, බලාගාර ධාරිතාවයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙවන් වැදගත් වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරිකයක එළදායිතාව බොහෝ සෙයින් දුබල වනු ඇත. එහෙයින්, මෙම ප්‍රදේශයේ ජලවිද්‍යාත්මක අංශය සැලකිල්ලට භාජනය කරමින්, බාදනය අඩුකිරීම හා වියළි කාලයේදී ජලමාර්ගවල හා වසර පුරාම ජලාශවලද ජලය පවතින බව තහවුරු කර ගැනීමට නම් අවශ්‍ය වන සංරක්ෂණ පියවර ගැනීම වැදගත් කායනීයක් වෙයි. තනාල්ස් වැටියේ අඩි තුන්දහස් පන්සියයේ සමෝච්ඡ රේඛාවට ඉහලින් පිහිටි ප්‍රදේශය සහ ඊට පහළින් පිහිටි අඩංගු වනාන්තර ප්‍රදේශ ඇතුලත්, හෙත්වෙයාර 22,000 ක විශාලත්වයකින් යුත් ප්‍රදේශය ජලධාරිත හා ජානක සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීමෙහි ලා ඉතාමත් තීරණාත්මක ප්‍රදේශයක් ලෙස දැන් සළකනු ලැබේ. මහවැලි ද්‍රෝණියේ වැදගත් ජලධාරිත ප්‍රදේශයක් වශයෙන් මෙම ප්‍රදේශවලට වැඩි ආරක්ෂාවක් සැළසෙන පරිදි, අවශ්‍ය තීරීමය තත්ත්වය ලබාදීම සඳහා ඒවා වනාන්තර සංවිනයන් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතුවෙයි.

2. අු විද්‍යාව හා පාඨාණ

මෙම ප්‍රදේශයේ පාඨාණ මෙටමෝපින් ගණයට අයත්වන අතර ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් ක්වාට්සයිට්ස්, ක්වාට්ස්, ස්කිස්ට්ස් සහ ග්නෙස්සස් වේ. හාතට් - බයෝටයිට් - ග්‍රැනයිට් ග්නෙස්සස්, හාතට් - සිලිමනයිට් - ග්‍රැනයිට් ස්කිස්ට්ස්, ග්නෙස්සස් ක්‍රිස්ටලයින්, ග්‍රැනුලේ හා වානොනයිට්ස් (තුරේ 1986) මෙම ප්‍රදේශයේ බහුල වශයෙන් හමුවන පාඨාණ වර්ගයන්ගෙන් සමහරකි. ප්‍රදේශයේ පස්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් මුල් මෙටමෝපින් පාඨාණවලින් ව්‍යුත්පන්න ලැටරයිට් වර්ගයට අයත් වේ. තියුණු බැවුම් සහිත ස්ථානවල හැර, අන් තැන්වල මෙම පාඨාණ සාමාන්‍යයෙන් හැඹුරට විහිදී ඇති අතර ඒවාහි දිය බැසයාම මතා ලෙස සිදුවේ. තෙත් මොන්ටාන් කලාපයේ වනාන්තර පස්වල සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක හසුමස් අන්තර්ගතය. එය දුඹුරු පැහැයකින් යුක්තය (රොසසිරෝ 1958).

3. ජලධාරිත ප්‍රදේශ සහ ජලවහන රටාව

ජලවහන හා ජල ධාරිත ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙවෙනි සිතියමෙහි දැක්වේ. තනල්ස් ප්‍රදේශයෙන් ගලා බසින ගංගා නිහිපයක් වේ. ඒවා නම්:

(අ) නර්ගන

ප්‍රදේශයේ උතුරු නොටසෙහි ජලවහනය මෙම ගංගාවෙන් සිදුවන අතර එය දකුණේ සිට උතුරට ගලා බසියි. මෙය මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන අතු ගංගාවන්ගෙන් එකක් වන අඹන් ගඟෙහි මූලික මව් දියතුව වේ. නර් ගඟෙහි ජලවහන ද්‍රෝණිය ප්‍රධාන වශයෙන් තනල්ස් ප්‍රදේශයේ මොන්ටාන් කලාපයට සීමාවන අතර එහි උස සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4000 ට අධිකය. ගල්මිනි බස සහ කරාවන බස නර් ගඟෙහි ප්‍රධාන අතු ගංගා වේ. නැගෙන හිටින් වමාරාපුගල - නර්පහන වැටියෙන්ද, දකුණින් සහ තිටිනදිගින් සෙල්වනන්ද සානුවෙන්ද, බටහිරින් නිට්ගල්පොත්තෙන්ද මායිම්වී ඇති නර්ගඟේ ජලධාරිත ප්‍රදේශය මෙම මුළු ප්‍රදේශයෙන් 30% ක් පමණ වෙයි.

(ආ) හීන් ගඟ

මෙම ප්‍රදේශයේ නැගෙනහිර නොටසෙහි ජලවහනය සිදුවන්නේ හීන් ගඟෙහි. එය දකුණේ

සිට ජසාන දිගට ගලා බසියි. මෙම ගංගාවෙහි ප්‍රධාන අතු ගංගාව වන මහබයේ ඉහළ නොටස නර්මතැටියමය' යනුවෙන් හැඳින්වේ. හීන් ගඟෙහි තවත් අතු ගංගාවක් වන මීර් බයෙහි මව් දියතුව ආරම්භ වන්නේ නර්පහන වැටියෙහි. නර්පහන වැටිය හා නර් ගංගාව අතර ඇත්තේ යාර 500 ක දුරක් පමණි. ඉහත හී වැටියෙහි බටහිර බැවුමෙන් නර්ගඟද නැගෙනහිර බැවුමෙන් මීර් බයද ආරම්භ වේ. නානලිවත්ත බස සහ රාවණ බස හීන් ගඟෙහි අනෙකුත් අතු ගංගාය. නර්පහන, තනල්ස්, දුබනගල සහ නදුවැටි සහ ලන්ගල සහ තෙගෙල්පොත්තොරුවෙහිල නදු මුදුන් හීන් ගඟේ ජලධාරිත ප්‍රදේශයෙහි මායිම් වෙයි. තනල්ස් ප්‍රදේශයෙන් 30% ක් පමණ මෙම ජලධාරිත ප්‍රදේශයට අයත්ය.

(ඇ) හුලු ගඟ

නොට ගඟ සහ හීන් බස ඇතුළු තුඩා ගංගා රැසක් හුළු ගඟේ මව්දියතු ලෙස සැළකිය හැකිය. තනල්ස් ප්‍රදේශයේ බටහිර නොටසෙහි ජලවහනය එම ගංගාවන්ගෙන් සිදුවන අතර, ඒවා දකුණේ සිට ජසාන දෙසට ගලා බසියි. හුලු ගංගාවේ අතු ගංගාවලින් ජල වහනය වන ප්‍රදේශයේ උතුරු හා නැගෙනහිර මායිම් වනුයේ (තිටින සිට ජසාන දෙසට විහිදෙන) නිට්ගල්පොත්ත, හොම්බානිය සහ තනල්ස් නදු ඇතුළත් ප්‍රධාන නදු වැටියයි. මෙම ජලවහන ප්‍රදේශය මුළු ප්‍රදේශයෙන් 35% ක් පමණ වේ.

(ඈ) තෙලිගම් බස

මෙය තනල්ස් නදු වැටියෙන් ආරම්භවන තවත් තුඩා ගංගාවකි. මෙය අඹන් ගඟෙහි අතු ගංගාවක් වන කබරාව ගඟෙහි මව් දියතුව වේ.

තනල්ස් නදුවැටියේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 3500 කට වඩා උස් ප්‍රදේශයේ ඇති තෙත් මොන්ටාන් වනාන්තරවලින් ආරම්භ වන ගංගා සදානාලිත ඒවා වන අතර ජට වඩා පහත් ප්‍රදේශයන්ගෙන් ආරම්භවන අනෙකුත් ගංගා සෘතුමය ඒවා වේ (වියලි සෘතුවේදී හීන වී යයි).

4. තනල්ස් ප්‍රදේශයේ ජල විද්‍යාත්මක වැදගත්කම

වහාම අවධානයට යොමු කළ යුතු ඉතා වැදගත් ජල බෙහෙවන් වශයෙන් තනල්ස් ප්‍රදේශය

හඳුනාගෙන ඇත. ඉඩම් නොමිසත් සභාවේ 1985 සඳහා වූ අත්තර් වාර්තාව අනුව, තනල්ස් ප්‍රදේශය දිවයිනේ ගංගා පද්ධති සඳහා ජලය උපද්‍රවන ප්‍රධාන ප්‍රදේශයන්ගෙන් එකක් හැටියට විශේෂයෙන්ම හඳුනාගෙන ඇත්තේය. තවද, ජලබෝග්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව සැළැස්මක් පිළියෙල කළයුතු බවත්, එම සැළැස්මෙහි විශේෂ අවධානය තනල්ස් කඳු වැටියෙහි හා අනෙකුත් නම් කරන ලද ප්‍රදේශයන්හි ගංගා උත්පාදන ප්‍රදේශ සංරක්ෂණය කෙරෙහි යොමු වියයුතු බවත්, එම වාර්තාවෙන් නිර්දේශ කරන ලදී.

තනල්ස් ප්‍රදේශයේ ජල විද්‍යාත්මක වැදගත්කම පහත සඳහන් මානාකරණ යටතේ සාකච්ඡා කළ හැකිය.

(අ) තද වම්බා හා දළ බැවුම් සහිත භූමිය

ප්‍රදේශයේ වම්බාපතනය ඉතා පැහැදිලි ලෙස මෝසම් කන්න අනුව තදින් වෙනස් වේ. නිරිතදිග මෝසම සමග, මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළදී බටහිර බැවුම්වලට අධික වම්බාපතනයක් ලැබේ. ඔක්තෝබර් සිට ජනවාරි දක්වා පවත්නා ප්‍රධාන දිග මෝසම් සමයේදී නැගෙනහිර බැවුම්වලට වැඩි වම්බාපතනයක්ද දැඩි තුණාටු සහිත ඉතා අධික වම්බාපතනයක් මුළු ප්‍රදේශයටමද ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙසේ වැටෙන වැස්ස ඉතා බලවත් නිසා, බරපතල බාදන ප්‍රශ්න ජනිත වීමට හේතු වේ.

ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ජලධාරිත ප්‍රදේශ තුනෙහි සාමාන්‍ය වාර්ෂික වම්බාපතනය (මද්‍රිද්‍රව බණ්ඩාර, 1985) පහත දැක්වේ.

1 වන වගුව

ගංගා ජලධාරිතය	සා. වාර්ෂික වම්බාපතනය (මි.මී)	වසරකට වර්ෂාව සහිත දින ගණන
හුලු ගඟ	3031.9	183
නලු ගඟ	2724.6	184
ගිත් ගඟ	4281.9	184

වර්ෂ 1971 දී මද්‍රිද්‍රව බණ්ඩාර විසින් සාමාන්‍ය වාර්ෂික වම්බාපතනය සහ ජලධාරිත ප්‍රදේශය අතර සම්බන්ධතාවය පදනම් කරගෙන ජලවිද්‍යාත්මක ප්‍රදේශ පහක් හඳුනා ගන්නා ලදී (111 වන සටහන). ප්‍රදේශයේ වම්බාපතනය හා ගංගා ගලා බැස්ම පිළිබඳ ඉතිහාස එකී වර්ගීකරණයෙන් සැපයෙයි. මේ අනුව තනල්ස් ප්‍රදේශය අයත් වනුයේ 2 වන ජලවිද්‍යා වර්ගයටය. එය මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණියෙහි දෙවැනි තරමට අධිකතම වම්බා වලබන ප්‍රදේශය වෙයි. තනල්ස් කඳුවැටියේ සෙන්ටි මැටින්ස් (මිලිමීටර 4470) වැනි වම්බා මිණුම් ස්ථානයන්හි සාමාන්‍ය වම්බාපතනය දෙවෙනි වනුයේ දිවයිනේ අධිකතම වම්බා වලබන ප්‍රදේශය වන වටවලට පමණි.

කලින් සඳහන් කරන ලද පරිදි, ප්‍රදේශයේ භූමි ලක්ෂණ මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 6248 දක්වා උස් ගිටි සිබරයක් ඇතුළත් උස් හා තද බැවුම් සහිත ගිටි දැනුරුවලින් සමන්විතය. මෙම කඳු බැවුම්වල තියුණුව සහ ප්‍රදේශයට වැටෙන අධික, බලවත්, වම්බා නිසා තනල්ස් ප්‍රදේශය දිවයිනේ ඉතාමත් වැදගත් ජල බෝගක් වෙයි. පස් බාදනය කෙරේ බලපාන සාධකවල අත්තර් සම්බන්ධතාව මෙසේ හඳුනා ගෙන ඇත. A = RKSTCP (මෙය පස ඉවත් වීම පිළිබඳ පොදු සම්කරණය නම්).

මෙහි

A = පස ඉවත්වීම

R = වම්බාපතනය

K = පස බාදනය පිළිබඳ සාධකය

S'T = බැවුමේ දිග හා බැවුමේ තැඟ්ම

C = වැටී තිබෙන ව්‍යාප්තතා පිළිබඳ සාධකය.

P = පස සංරක්ෂණය

පස් බාදනය සඳහා බලපාන මෙකී සාධක අතුරින් වම්බාපතනය, පාංශු බාදනයට හා බැවුම යන සාධක පාලනය පිළිබඳව අපට ඇත්තේ ඉතා සීමිත හැකියාවකි. නැතහොත් නිසිදු බලයක් නැති තරමිය. වෙනස් කළ හැකි සාධක වන්නේ ව්‍යාප්තතා සහ පස සංරක්ෂණය පමණකි. එම සාධක යුගල භූ පරිහරණය යටතේ සලකා බැලිය හැකිය. එහෙයින් බාදනයට තුඩු දෙන තද වැසි

සහ දැඩි බැවුම් සහිත භූමියකින් යුත් තනල්ස් ප්‍රදේශය හැන් සලකන විට බාදන ප්‍රශ්නය සඳහා ඇති එනම විසඳුම වනුයේ බාදනය උද්ගත කරවන වණිවෙන් පස ආරක්ෂාකාර හැඟීම පිණිස සුදුසු පරිහරණ භාවයන් අනුගමනය කිරීමයි.

ආ) වික්ටෝරියා ජලාශයේ ජලධාරිත ප්‍රදේශයන් වශයෙන් :

බී සහ සී කලාපවල හෙක්ටයාර 70000 ක නව ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන වාරිමාලී පහසුකම් සහ මෙහෙවොට් 210 ක ජලවිදුලි බලය සැපයිය හැකි වන ඝන මීටර් මිලියන 698 ප්‍රමාණයක ගබඩා ධාරිතාවක් වික්ටෝරියා ජලාශය සතු වෙයි. වික්ටෝරියා ජලාශයෙහි උඩු ගං ජලවහන ප්‍රදේශය වර්ග කිලෝමීටර 1891 ක් වන අතර මෙම ප්‍රමාණයෙන් 9% ක් පමණ අයත් වන්නේ හුලු ගඟේ ජලධාරිත ප්‍රදේශයටය. ඉහත දැක්වන ලද පරිදි, තනල්ස් ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම ගඟට අයත් ජලවහන ප්‍රදේශයද, අධික වණිපතනයද වික්ටෝරියා ජලාශයට ජලය සැපයීමෙහි ලා සැලකිය යුතු අත්දැමකින් දායක වන බව පෙනේ. එහෙයින් ජලාශයේ රොන්මඩ එනතුටු අඩුකිරීම පිණිස සහ විශේෂයෙන් වියළි කාලය තුළදී වාරිමාලී සහ ජලවිදුලි බලය සඳහා ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම පිණිස හුලු ගඟට ජලය සැපයෙන ප්‍රදේශ රැකගැනීම වැදගත්ය.

(ඇ) මහවැලි ව්‍යාපෘතිය යටතේ යෝජිත ජලාශවල ජලධාරිත ප්‍රදේශයන් වශයෙන්:

කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වැඩ සටහනට අයත් වැඩ කටයුතුවලින් වැඩි හරියක් දැනට සම්පූර්ණ වී තිබුණද, සංවර්ධනය කළ හැකි ව්‍යාපෘති ගණනාවක් මහවැලි යෝජනා අතර ඇත්තේය. තනල්ස් දිය බෙත්ම හා සම්බන්ධ යෝජිත ව්‍යාපාර දෙකක් (මහවැලි ව්‍යාපෘති හා යෝජනා 1987) මෙසේය:

(i) තරඟන ව්‍යාපෘතිය :-

වාරිමාලී හා ජල විදුලිබල ව්‍යාපෘතිය, ජලාශ ධාරිතාවය - අක්කර අඩි 208,000.

(11) හින් ගඟ විවිධ සේවා ව්‍යාපෘතිය:- වාරිමාලී හා ජලවිදුලි බල ව්‍යාපෘතිය

මෙහි ව්‍යාපෘති දෙක සම්පූර්ණ කළායින් පසුව, තනල්ස් ප්‍රදේශය යෝජිත ජලාශ දෙකේ ප්‍රධාන ජලධාරිත ප්‍රදේශය බවට පත්වනු ඇත.

5. තනල්ස් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ගංගා දේශීවල ජල විද්‍යාත්මක අංශ සමහරක්:

පිළිවෙලින් හුලු, හින් සහ තරඟ ගංගාවන්ගේ හැලීම පිළිබඳ දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳහා වාරිමාලී දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා අංශය මගින් තොල්දෙණිය, උඩුවැල්වල සහ වැල්ලේවල යන ස්ථානවල ගංගා මිණුම් මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යන ලදී. අවුරුදු නීතිපයන් තුළ පමණක්, ගංගා හැලීම් පිළිබඳ දත්ත එක්රැස් කළ මෙම මධ්‍යස්ථාන දැනට අක්‍රියව පවතී. මෙහි මධ්‍යස්ථාන මගින් එක්රැස් කර ගන්නා ලද ජල විද්‍යාත්මක දත්තවල සාරාංශයක් 2 වන වගුවෙහි දක්වේ.

2 වන වගුවෙහි සඳහන් දත්තවලට අනුව නිරීක්ෂණය කරන ලද කරුණු මෙසේය.

(අ) ජලධාරිත තුනෙන් විශාලතම ජලධාරිත ප්‍රදේශය තරඟනට අයත්වන අතර ඉන් 35-40% පමණ අයත් වන්නේ තනල්ස් ප්‍රදේශයටය.

(ආ) තනල්ස් ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භවන ගංගා තුනෙන් උපරිම ජල ප්‍රමාණය ගෙන යන ගංගාව තරඟන වේ.

(ඇ) මතුපිට ගලායාම හා වණිපතනය අතර සම්බන්ධතාවෙහි ඉහළ අනුපාතයෙන් පෙනෙනුයේ තරඟන දෝණියේ ස්වාභාවික ව්‍යාප්තතා ආවරණය දුබල අත්දැමින් පවතින බවයි.

වැල්ලේවල පිහිටි තරඟ ගංගා මිණුම් මධ්‍යස්ථානය 1960-72 දක්වා ක්‍රියාත්මකව පැවතුණි. මෙම මධ්‍යස්ථානයට අයත් දත්ත වාරිමාලී දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා අංශයෙන් ලබා ගන්නා ලද අතර ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

2 වන වගුව

ගංගාව හා මධ්‍යස්ථානය	ජලධාරීත ප්‍රදේශය (කි.මී.)	මතුපිට ගලායාම (සාමාන්‍ය වාර්ෂික) මි.මී	සා. වා. වර්ෂා. හා මතුපිට ගලායාම අතර අනුපාතය.	සා. වා. වර්ෂා. මතුපිට ගලායාම (ස.මි.මී)
හුලු ගඟ (තෙල්දෙණිය)	160.58	1481.58	48.86	237.91
තරඟඟ (වැල්ලේවල)	194.25	1636.77	60.07	317.94
හීන් ගඟ (උඩුවැල්වල)	115.25	2357.88	55.06	271.75

*ඝන මීටර මිලියන

මූලාශ්‍ර: 'Some Aspects of the Hydrology of the Upper Mahaweli Basin - Maduma Bandara' 1985'

*කෘතීම විසින් ගණනය කර ඇත. (එම්.සී.එම් - ඝන මීටර මිලියන)

වර්ෂාපතනය සඳහා 1 වන වගුව බලන්න.

(අ) වාර්ෂික දත්ත අනුසාරයෙන් පමණක් කරන ලද, මතුපිට ගලායාම හා වර්ෂාපතනය අතර සම්බන්ධතාව පිළිබඳ අනුපාත භූමි පරිහානිය ඉතිරි කරන දර්ශකයක් සේ සැලකිය හැකිය. 1960-70 යන දශකයට අදාළ මෙම අනුපාත අනුක්‍රමයෙන් වැඩි ගොස් තිබෙන බව පෙනේ. මේ වූ කලී මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළදී තරඟඟේ ඉහළ ජලධාරීත ප්‍රදේශයේ සිදුවී ඇති භූමි පරිහානිය පිළිබඳ පැහැදිලි ඉතිහාසික. (වගුව 4 හා ප්‍රස්තාරය) නෙසේ වුවද මෙම කාලය තුළදී වාර්ෂිකව ගංගා වලින් බැස ගිය ජල ප්‍රමාණය වාර්ෂික වර්ෂාපතනයෙන් 49% හා 73% අතර පැවතුණේය. (සාමාන්‍ය වාර්ෂික අනුපාතය 60% ක් පමණ විය.)

ආ) ගංගාවල් මගින් ගලා යන ජල ප්‍රමාණය සෘතු අනුව ඉතා තදින් අඩු වැඩි වේ. එහි උපරිමය වූ ඝන මීටර මිලියන 92.4 දක්නට ලැබෙනුයේ ජනවාරි මාසයේදීය. අවම ප්‍රමාණය වූ ඝන මීටර මිලියන 1.93 ඇත්තේ අගෝස්තු මාසයේදීය (වගුව 3). මුළු ප්‍රමාණයෙන් 93.5% ක් සැපයෙනුයේ තෙත් කාලයේ ගලා යෑමෙනි. (ඔක්තෝබර්-අප්‍රේල්) වියළි කාලය (මැයි-සැප්තැම්බර්) තුළදී දායකවූ ප්‍රමාණය මුළු

ප්‍රමාණයෙන් 6.5% ක් පමණි. ජලධාරීත ප්‍රදේශයේ භූමි පරිහානිය හා අඩු වාෂ්පී උත්ස්වේදනය සහිත කාලයේදී වැටෙන අධික ජ්‍යාමාදිග මෝසම් වර්ෂාව යන මේ දෙකගලා බසින ජල ප්‍රමාණය තදින් අඩු වැඩි වීමට හා දෙසැම්බර්-පෙබරවාරි අතර දක්නට ලැබෙන ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ගලා යාමේ-වර්ෂාපතන අනුපාතවලට සාධක වේයයි සිතන්නට පුළුවන. තනල්ස් කළුවැටියේ උස් භූමිභාගවල මේ කාලය තුළදී පවතින අඩු උෂ්ණත්වය හා සුයුර්ශාලෝකය වැටෙන කාලය අඩු වීම නිසා වාෂ්පී උත්ස්වේදනය සැලකිය යුතු අන්දමින් පහත වැටේ. නෙසේ වුවද, ජල සම්පාදන ප්‍රදේශවල පවත්නා වන ආවරණය ආරක්ෂා කොට වැඩි දියුණු කළහොත් ඒ නිසා ජලධාරීත ප්‍රදේශයෙහි පස්වල ජලය උරා රඳවා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි වන බැවින්, වියළි කාලයේ ජලය ගලා යාමද සැලකිය යුතු තරමින් දියුණු කළ හැකිය [මුත්තාචෝ (1986) කෝල්මන් (1953)].

නිර්දේශ

1. තනල්ස් ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් ජල බෙහෙවනි (4 වැනි ශේෂය). එහි පස, ජලය හා

වගුව 3:

තථගත
සාමාන්‍ය මාසික දත්ත-ගලායාම හා වණිපතනය

මාසය	සා. වණිපතනය (මි.මී)	සා. වණිපතනය (මි.සෙ.මී)	සා. ගලායාම (මි.සෙ.මී)	ගලායාම මුළුප්‍රමාණ.	ගලායාම/ වණිපතනය අනුපාතය.
පතවාටි	413.33	80.29	92.40	28	1.15
පෙබරවාරි	307.39	59.71	60.65	18	1.02
මාර්තු	136.30	26.48	24.20	7	0.91
අප්‍රේල්	211.96	41.17	18.53	6	0.45
මැයි	94.31	18.32	11.90	4	0.65
ජූනි	82.58	16.04	3.34	1	0.21
ජූලි	79.12	15.37	2.24	0.7	0.15
අගෝස්තු	109.58	21.29	1.93	0.6	0.09
සැප්තැම්බර්	114.38	22.22	1.98	0.6	0.09
ඔක්තෝබර්	293.34	56.98	6.13	2	0.11
නොවැම්බර්	431.22	83.76	30.53	9	0.36
දෙසැම්බර්	479.09	93.06	75.50	23	0.81

මාර්ගික වණිපතනය %	-	60
මාසික උත්ප්‍රේෂණය %	-	40
තෙත් ගලායාම %	-	93.5 (ඔක්තෝබර් - අප්‍රේල්)
වියළි ගලායාම %	-	6.5 (මැයි-සැප්තැම්බර්)

වගුව 4: ගලායාම වණිපතන අනුපාතය-තථගත

වර්ෂය	වණිපතනය (මි.මී.)	වණිපතනය (ස.මි.මී.)	ගලායාම පරිමාව	ගලායාම/වණිපතනය අනුපාතය
60-61	2377.17	461.77	225.16	0.49
61-62	3232.90	627.99	390.46	0.62
62-63	3342.38	649.26	399.68	0.62
63-64	3145.52	611.02	403.90	0.66
64-65	2325.62	451.75	223.63	0.51
65-66	2340.36	454.61	293.32	0.65
66-67	2308.60	448.45	238.93	0.64
67-68	2744.71	533.16	389.40	0.73
68-69	2613.68	597.71	298.26	0.59
69-70	3094.99	601.20	375.50	0.62

අවශේෂ පරිසර තත්ත්වයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගැනීම අවශ්‍යය. පස්වැනි ඡේදයෙන් පෙන්නා දී ඇති පරිදි මේ ප්‍රදේශය දැනටමත් සැලකිය යුතු අන්දමින් පරිහානියට පත්ව ඇත. මෙම පරිහානිය තවදුරටත් සිදුවුවහොත් බරපතල පරිසරමය හා වාරිමාර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රශ්න උද්ගත වන්නට ඉඩ ඇත්තේය. එබැවින් තනල්ස් ප්‍රදේශයේ වන සංරක්ෂණය සඳහා ක්ෂණික පියවර ගතයුතු යයි යෝජනා කෙරේ.

2. වහා කළ හැකි සියලුම ඉඩම්වල උචිත පස් සංරක්ෂණ පියවර ගතයුතුය.


තේ වහාව - විශේෂයෙන්ම මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 3500 ට වැඩි උසක පිහිටා ඇති වහාව

මට්ට අයත් වේ. මේ අරමුණ සපුරාලීම සඳහා තනල්ස් ප්‍රදේශයට අයත් වැදගත් භූමි භාගවලට අදාළ වන සේ පස් සංරක්ෂණ පනත අතුරුම ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍යය.


3. මේ ප්‍රදේශයේ ඉහළ භූමිභාගවල (මුහුදු මට්ටමෙන් අඩි 3500 ට වැඩි) පිහිටි පුද්ගලික ව්‍යාපාරවල කෙරෙන ඉවත් බවත් නැති ගස් හෙළීම පාලනය කිරීම සඳහා නියමිත පියවරක් ගත යුතුය.

4. තනල්ස් දිය බෙන්ම ප්‍රදේශය තුළ ජලය බෙදීමට හා ඉවතට ගලායාම පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගනු වස් මේ ප්‍රදේශයට අදාළ ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් පැවැත්විය යුතුයයි අවසාන වශයෙන් නිර්දේශ කෙරේ.


ප්‍රස්තාරය : ගලායාම/ ව්‍යාපාර අනුපාතය- තර්ග



සටහන 1





තනල්ස් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන දියබෝත්ම



සටහන 11

ඉහළ මහවැලි ද්‍රෝණියේ පල විද්‍යාත්මක කලාප :-



ප්‍රලාභය: චඳ්‍රිම බණ්ඩාර (1985) සටහන 111

ගෝර්ථන් තලාව _ එහි ව්‍යාප්තිය සහ පරිසරය පිළිබඳ ඇතැම් අංශ

සී.වී.එස්. ගුණතිලක සහ අයි.ඒ.සු.එන්.
ගුණතිලක,
උද්භිද විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය,
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය.

ගෝර්ථන් තලාව යනුවෙන් ප්‍රකට රැළි සහිත භූමියකින් යුත් සානුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර හා දකුණු කඳු වැටි අතර කෝණයේ පිහිටා තිබේ. ගෝර්ථන් තලාවේ සාමාන්‍ය උස මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2150 කි. එහි බටහිර හා ජසාන දිග දෙකෙලවරින් කඳු දෙකක් පැන නගී. එනම්, මීටර් 2392 ක් උසැති, මනාව කැපී පෙනෙන, කිට්ගල් පොත්ත සහ මීටර් 2206 ක් උසැති, එතරම් කැපී නොපෙනෙන, තොටපොළකන්ද ය. බලංගොඩට ඉහලින් පිහිටි දළ බැවුමකින් යුත් භූමිභාගය මෙහි දකුණු මායිම වේ.

තිරණයෙන් 6'45 ක් උතුරට පිහිටා තිබීම හා සාමාන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 17' ක් වීමත් හේතු කොට ගෙන ගෝර්ථන් තලාවට හිටර්තන මොන්ටේන් (Montane) දේශගුණයක් ලැබී තිබේ. මෙහි මායිම උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයන් විචලනය වන්නේ සූර්‍ය වශයෙනි. එහෙත් සාමාන්‍ය දෛනික උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයන් විශාල වශයෙන් උච්චාවචනය වේ. දිවා කාලයේ උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයන් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 25 කට ලඟා වන හා රාත්‍රී කාලයේ උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයන් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 0 ගෝ ජටත් පහල බසින ජනවාරි අග, පෙබරවාරි හා මාර්තු මුල ඇතුළු කාල සීමාව තුලදී මෙම තත්වය විශේෂයෙන් අත්දැකිය හැකිය. එහෙයින් ඩී.සී විට්මෝර් ඔහුගේ "ඇත පෙරදිග හිටර්තන වැසි වනාන්තර " යන ග්‍රන්ථයෙන් ඉතා උචිත අත්දැකීම් මෙහි දේශගුණය "සෑම දිවා කාලයකම උෂ්ණ සෘතුවක් හා සෑම රාත්‍රී කාලයකම ශීත සෘතුවක්" ලෙස විස්තර කර තිබේ. වර්ෂයේ ඉහත කී කාල සීමාව තුල රාත්‍රී තුෂාර සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි. සෙන්ටි මීටර් 2000 කට වඩා ඉහල

සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය, ඉතා අධික ආරද්‍රණාවය හා හිරු එළිය ශාක කරා ලඟා වීම සීමා කරනවන තිරතුරුව පිහිටි වලාකුළු ආවරණය හා අගෝස්තු සිට ඔක්තෝබර් මුල දක්වා අධික සුළං හැමීම යන මේවා අතිතෙන් දේශගුණික ලක්ෂණවේ. මේ සියලු දේශගුණික ලක්ෂණවල අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය අද ගෝර්ථන් තලාවේ දක්නට ලැබෙන ව්‍යාප්තිය ඇති වීම සඳහා ඉවහල් වී තිබේ. මෙම ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව කුතුහලයක් උපදවන කරුණක් නම් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම වනාන්තර හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම තණබිම් නොවීම හා එකිනෙකට 50% ක් බැගින් යට වී ඇති වනාන්තර හා තණබිම් මිශ්‍රණයක් වීමය. වනාන්තර ඉහළ බැවුම්වලට සහ කඳුමුදුන්වලට හා තණබිම් පහල බැවුම්වලට හා තිම්මයන්ට සීමා වීමද තවත් වැදගත් ලක්ෂණයකි. තණබිම් පැතිරී ඇති ප්‍රදේශවල වනාන්තර හෝ වනාන්තර ප්‍රදේශවල තණබිම් හෝ නොමැති පැහැදිලි මායිමක් මේ දෙවර්ගය අතර ඇත. ප්‍රදේශයේ පොදු ලක්ෂණයක් වන මෙම වනාන්තර-තණබිම් වඩාත් ප්‍රකටව දක්නට ඇත්තේ ගෝර්ථන් තලාවේය.

දේශගුණය හා ව්‍යාප්තිය හැරුණු විට වලසුන් වැනි විශාල සිව්පාවුන් ඇතුළු නොයෙකුත් සතුන් හා පක්ෂීන් ගෝර්ථන් තලාවේ අපූර්ව විශේෂ අංශ වේ. පැහැදිලි හා ප්‍රකට නොමැති අංශය නම් ව්‍යාප්තිය, පරිසරය හා සතුන් අතර පවතින ත්‍රිවිධ ඒකාබද්ධතාවයයි. අත්දැකීම් කිහිපයක් ගෝර්ථන් තලාවේ පරිසර පද්ධතිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන ආකාරයයි. මෙකී අංශ සමහරක් පිළිබඳව සාමාන්‍යයෙන් විමසා බැලීම වටී.

හෝර්ටන් කලාවේ පිහිටි ව්‍යාන්තරයෙහි උස නිව්ගල්පොත්ත හා නොටපොලනන්ද යන නළු මුදුන්වලදී මීටර 10-15 සහ 1-1.5 අතර වේ. එම නළු මුදුන්වල සිට කෙතෙකුට පහලින් ඇති "ව්‍යාන්තරය" දැන ගත හැකිය. ගස් බොහොමයක කඳ හෝ නයිරුව නෙළුන් පිහිටා තොමැත. ඇතැම් විට කරු මුල් දක්නට ලැබේ. අතු බෙදී යාම කඳ පහළින් ආරම්භ වී ඇති අතර එවා ඇඹරී ගොස් ඇත. මෙහි ලක්ෂණ අනුව මේවා "ජපන් රුක් රෝපණයේ යෝධ බොත්සාය" වලට සමාන වේ යයි මෙම දිවයිනෙහි වන සංරක්ෂණ වශයෙන් සිටි බබ්. ආර්. එම්. පෙරේරා මහතා වාර්තා කරයි. සවිස්තර වශයෙන් ගත්කල, වැඩි උසකින් යුත් ගස්වල පත්‍ර කුඩාය. මතු පිට බුබුන් හෝ ඉටි වත් වැස්මක් පිහිටීම අනුව එවා හිය-පුතිරෝඩි ලක්ෂණ පිළිබිඹු කරයි. ව්‍යාන්තරයෙහි අධික සුළං හැම්මට පාත්‍රවන ප්‍රදේශවල ව්‍යාන්තර වියන බොහෝ දුරට අබණ්ඩව පවතී. හෝර්ටන් ව්‍යාන්තරයේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් වන උසගස් එවන් ප්‍රදේශවල පෙතෙන්නට තොමැත. ගස් ස්තරය යටින් පිහිටි පදුරු සහ වැල් වර්ගවල පත්‍ර සාපේක්ෂ වශයෙන් විශාලය. ගස්වල කඳ හා අතු මත වැඩි ඇති අපි ශාක හා පත්‍ර මත වැඩි ඇති අපි පත්‍ර වර්ග අතෙක් වැදගත් ශාක වේ. මේවා අතර බිහිබි, බෝල්සව්, මීවන, පායි, අත්මා ශාක සහ ලයිනන දක්නට ලැබේ. ඉන් සමහර ශාක ගල් මත හෝ දිරා යන ලී මත තැනහොත් භූමිය මතම වැඩේ. මේවායේ වඩිතය තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය අධික අර්ඝ්‍යතාවයයි.

සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ නිවර්තන හා උප නිවර්තනවලට සීමාවන ශාක කුලයන් (එනම් න්ලියියාසි නොහොත් කඳුකර "නීත" කුලය, මර්ටසි නොහොත් ග්වාවා හෝ යුකැලිප්ටස් කුලය, මෙල්ස්ටොමටසි නොහොත් උත්බෙකියා හෝ බෝට්ටියා කුලය යනාදිය) සහ සෞම්‍ය කලාපික රටවල පොදු කුලයන් (එනම් එටිනාසි නොහොත් රොඩොඩෙන්රන් කුලය, වැසිතිසාසි, වැසිතියම් සහ හෝල්තේටියා කුලය, මැග්නොලියාසියේ මිවලියා හෝ වතසපු කුලය යනාදිය) යන දෙකොටසටම අයත් ශාක මෙම ව්‍යාන්තරයේ දක්නට ලැබේ. "ෆ්පැගසි" හෝ "බින්" කුලයට

අයත් ශාක සහ ප්‍රදේශයේ නළුකර ව්‍යාන්තරයන්හි දක්නට ලැබෙන නේතුබර ශාක මෙහි දක්නට නොලැබීම තවත් විශේෂ ලක්ෂණයකි.

ගස්වලට යටින් පිහිටි කුඩා ගස් සහ පදුරු ස්තරයට අයත් එක් ප්‍රධාන ශාක විශේෂයක් වේ. "ස්ට්‍රෝබිලන්තස්" හෝ තෙලු යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම ශාක විශේෂයෙහි මල් පිපෙන්නේ එහි පීචිත කාලයේ එක් වතාවකදී පමණි. ඉන් අනතුරුව ශාකය නැසී යයි. එක් තනි ශාකයක පීචිත කාලය කෙතෙක්දැයි නිසිවකු ස්ථිර වශයෙන් නොදන්නා කරුණකි. වසර 4 ක් හෝ 8 ක් බව සාමාන්‍ය විස්වාසයයි. බොහෝ දුරට එනම වයසනට අයත් වන මෙම ශාකවලින් වැඩි නොටස එනම කාලයකදී මල් දරමින් වාන්තර යටි රෝපණය දව් පැහැයකින් අලංකාර කරයි. ස්ට්‍රෝබිලන්තස් මැලට් යාමත් සමග ඒ හේතු නොට ගෙන ඇති වන සිදුරු තුළින් හිරු එළියට ව්‍යාන්තර භූමිය කරා රුරා යෑමට ඉඩ සැලසේ. ඒ අනුව ස්ට්‍රෝබිලන්තස් ශාකවලට යටින් පිහිටි බෝල්සම් සහ කොලියස් යන ශාක වල වර්ධනය ප්‍රබෝධවත් වේ. මෙම බෝල්සම් සහ කෝලියස් නෙට් කලන් පීචන් වන ශාක වර්ගය. එහෙයින් ස්ට්‍රෝබිලන්තස් වල බීජ ප්‍රරෝහණය වී මතාව මුල් බැස ගැනීමට මත්තෙන් ඉහත කී ශාක සිය පීචන මත්‍රය අවසන් කරයි. ස්ට්‍රෝබිලන්තස් වර්ධනය වන්නට පටන් ගන්නා විට ව්‍යාන්තර භූමිය බුමුතුරුණුවන විලාශය පායී. ස්ට්‍රෝබිලන්තස් හැරුණු විට ජැබ්බාසියේ එනම් කෝපි කුලය යටි රෝපණයේ බහුල වශයෙන් වේ. මල් නොදරන ශාක අතර අපි ශාක හෝ හෙමික ශාක ස්වභාවයෙන් දක්නට ලැබෙන ජයිලෝටම් හා ලයිනපෝඩියම් (කුඩා හැඩය හා මහා හැඩය යන වර්ගවලට තැනම් නියත විශේෂ) වැනි මීවන වල ආදී කාලීන නොහොත් අසංවර්ධිත සාමාජිකයන් සහ තුනී පටලයකින් වැසී ඇති වැඩි දියුණු මීමත වර්ග වන ෆ්ජරුලාතියා, බසාතියා සහ ස්ෆ්පග්නම් වැනි පායි වර්ග ගණනාවක් ද දක්නට ලැබේ. මේවා අපිශාක හෝ හෙමික අපිශාක වශයෙන් පවතියි.

ව්‍යාන්තරයෙන් පැන නැග ගලා යන පිටිසිදු පැහැදිලි ජලයෙන් යුතු ඇල දොල තුල සි

ලංකාවේ ඇති එනම රතු ඇල්ෆී වර්ගය දැනිය හැක. මෙය බටර්නොස්පර්මට් නම්.

වනාන්තර වෘක්ෂලතාදිය යටින් පිහිටි වනාන්තර පසද වෘක්ෂලතා මෙන්ම ගිනික ස්වභාවයකින් හා එයටම විශේෂ වන ශාක හා ශීවීන්ගෙන් සමන්විතය. පසෙහි ඇති ශාක සමග බැක්ටීරියා හා දිලීර බැඳී පවතින අතර පසෙහි දිලීර ඇති බව අනාවරණය වන්නේ සමහර දිලීර වර්ග ඒවායේ එල නොටස් නොහොත් කවුරුන් හොඳින් හඳුනා "හතු" නිපදවන විටය. ඒවා විවිධ ප්‍රමාණයෙන්, හැඩයෙන් හා වර්ණයෙන් යුතු වේ.

තණ බිම ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රිසෝපෝගට් සෙසිලානිකම් නැමැති මීටර 1-1.5 ක් උසැති "ටසොන්" තණ විශේෂයෙන් වැසි ඇත. එහි තැනින් තැන පඳුරු හා මිටි ගස් නිපයක්ද වේ. රතු මලින් යුත් සුප්‍රකට රොබෝඩෙන්ඩ්‍රොන් සෙසිලානිකම්, කුඩා සුදු මලින් යුත් ගොලනීරියා කුලය (මේවායෙහි ශාක පත්‍ර පොඩි කළ විට චිත්තපිතෝ වැනි සුගන්ධයක් ඇතිවේ) සහ කහ හෝ සුදු මලින් යුත් ඇනාෆෙපාලිස් වර්ගය (මෙම වර්ගයෙහි ශාක කඳ සහ පත්‍ර ප්‍රථම වත් බුටනින් වැසි තිබේ.) යන සිවු වර්ගයන්ද දක්නට ලැබේ. සියුමැලි, අලංකාර මල්වලින් ගහණ අනාන්ධ ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් තණකොල සෙවනෙහි ආරක්ෂිතව වැඩේ. තණබිමෙහි, ඇළදොළ ගලා යන හෝ ආර්ද්‍රතාවය අධික නොගැඹුරු මිටියාවත්වල "විවිතොබැම්බුසා ඩෙන්සිපෝලියා" නැමැති කුරු උණ පඳුරු සාරවත්ව වැඩේ.

මේ අනුව හෝර්ටන් තලා වනාන්තරයෙහි හා තණබිමෙහි, ප්‍රමාණයෙන් හා හැඩයෙන් වෙනස් වන නොයෙකුත් වර්ගයේ ශාක, සංකීර්ණත්වයේ විවිධ අවස්ථා පිළිබිඹු කරමින් ඒ එක් එක් වර්ගයට මනාව ගැලපෙන ක්ෂුද්‍ර වාසගුම්වල වැඩෙන බව පෙනේ. අනෙකුත් අංග හැරුණු විට හුදෙක් ශාක වල මෙම විවිධත්වයම පරිණාම වෘත්තාන්තය අපට කියා පායි. හෝර්ටන් තලාව වැනි සියුමැලි පරිසර පද්ධතීන්ට ගිනික සම තුලිතතාවක් ලැබෙනුයේ එහි අන්තර්ගත ශාක හා සත්ව නොටස්වල විවිධත්වය හා සංකීර්ණත්වය තුලිති. එහෙයින් එවන් පද්ධති

මිනිස් බලපෑම්වලට හෝ භූ වලන වැනි මනා ස්වාභාවික ව්‍යසනයන්ට ලක් නොවන්නේ නම්, සාපේක්ෂ වශයෙන් ස්ථායීතාවයකින් යුක්ත වේ. හෝර්ටන් තලාවේ වනාන්තරය හුදෙක්, ප්‍රයෝජනයකින් තොර, ගස් පත්තියක් නොවේ. එම ගස් පරිසරයේ සෙසු නොටස්වලට එම ගස් ක්ෂුද්‍ර වාසගුම් සපයා දෙයි. පඳුරු හා පැලෑටිවලින් ගස්වල මනා පැවැත්මට සේවයක් ඉටු නොවේයයි කෙනකුට සිතිය හැකිය. නමුත් මේ දෙකොටස අනෙකානව වශයෙන් ප්‍රයෝජන ලබන බව පෙනේ. තිසි පරිදි බිම වසා සිටින පඳුරු හා පැලෑටි, පස ආරක්ෂා කරමින් එහි අධික ආර්ද්‍රතාවයක් රඳවා ගනියි. තවද, තිසි උෂ්ණත්වය සැපයීමේ මාතීයෙන් බීජ පැලවල මෙන්ම ඒවායේ පරිණාම සාමාජිකයින්ගේ වධිතය පහසු කරවයි.

හෝර්ටන් තලාවෙන් ලබා ගතහැකි ප්‍රයෝජනයන්ගෙන් හතරක් වැදගත් ලෙස සැලකිය හැකිය. (1) අධ්‍යාපනය (2) ජලවිද්‍යාව (3) ජාන සම්භාර සංරක්ෂණය හා (4) අනාගත කාණ්ඩනීය සඳහා ඉටු කරන මෙහෙය මෙකී ප්‍රයෝජන ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන. ඒවා ලුහුඬින් මෙසේ විස්තර කළ හැකිය.

(1) අධ්‍යාපනය :

හෝර්ටන් තලාවේ වෘක්ෂලතා අත් සැම වර්ගයකම ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා මෙන්ම "සිත්කණ" විෂයෙහිලා අගනා සම්පතකි. මෙහි දක්නට ලැබෙන ශාක හා සත්ව ශීවීන්ගේ විවිධත්වය ඇසුරු කර ගෙන විද්‍යා විෂයයන් (විශේෂයෙන් උද්භිද, සත්ව හා පරිසර විද්‍යා) හඳාරන සියුම්ව එම විෂයයන්ට ඇතුලත් නොයෙකුත් අංග පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය. පත්ති කාමරය තුළදී සියුම්ව සිදු වන්නේ තම ගුරුවරුන් සතු පහදා දීමේ කෞශල්‍යය හා උද්යෝගය සහ තමා සතු සංකල්පනා හැකියාව මත රඳා සිටීමටය. නමුත් කෞතුකයෙහිදී ශිෂ්‍යයා ස්වභාව ධර්මය මෙන්ම යථාර්ථය සියැසින් දැන ගනී. විවසා දැනගැනීමේ චෛතසික හැකියාව වධිතය කර ගැනීම සඳහා එමගින් ඔහුට අවකාශ ලැබේ. විපුල ප්‍රයෝජන ලබා දීමේ හැකියාවකින් යුත්

හෝර්ටන් තලාව වැනි පරිසර පද්ධතීන්ගෙන් තවමත් ප්‍රයෝජන ගෙන නොමැත.

(2) ජල විද්‍යාව :

හෝර්ටන් තලාව මහවැලි ගංගා ජලධානික පුද්ගලයෙක් නොවෙයි. හෝර්ටන් තලාවේ පිළිවෙලින් බටහිර හා උතුරු දිශාවන්ගෙන් ආරම්භවන අඟුරු ඔසෙහි සහ නානු ඔසෙහි අතු ගංගා සහ එහි තැගෙනහිරින් ආරම්භවන උළුමා ඔසෙහි හා බදුලු ඔසෙහි අතු ගංගා යන සියලු ගංගා අන්තිමට මහවැලි ගඟ හමුවන තෙක් ගලා යයි. මීට අමතරව, බේකර් දිය ඇල්ල හා ලෝකාත්තය අසල තලාවේ දකුණු දිගින් බෙලිගුල්ඔය ඇතුළු උඩවලවේ ගඟෙහි ඉහළට අතු ගංගා ආරම්භ වෙයි. මොන්ටාන් තලාවේ ස්වාභාවික වනාන්තර ඒ මත පතිත වන වර්ෂාමය ඉහණය කර ගැනීම, රඳවා ගැනීම හා මුදා හැරීම සඳහා මනාව හැඩ ගැසී ඇති ආකාරය අනුව ඒ වටා ඇති තේ වතු වලින් වෙනස්වේ.

විවිධ ස්තර වශයෙන් පිහිටි ගස් හැරුණු විට ගස් වටා දිවෙන වැල් වර්ෂා හා කාෂ්ඨීය ශාක ජලය උරා ගැනීමේ හැකියාවකින් යුක්තය. මෙම පෘෂ්ඨයන් සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පෙණුණායින් පසු ඉතිරි ජලය සෙමින් සෙමින් පස වෙත මුදා හරිනු ලැබේ. එහිදී නොළ රොඩු සහ හසුමස් එම ජලය අවශෝෂණය කර ගනියි. මින් පසුව ජලයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වේ නම් එය පස තුළට කාන්දු වේ. පොළව මතුපිට ජලය ගලා යාම ආරම්භ වන්නේ මෙම සියලු පෘෂ්ඨයන් පෙහී ගියායින් පසුවය. ඒ අනුව මෙම සංකීර්ණ පරිසර පද්ධතියේ සැම අංශයක්ම ජලාශයක් මෙන් ක්‍රියා කරයි.

ජලධානික පුද්ගලයන් ලෙස ක්‍රියා කිරීමෙහි ලා වාක්‍ෂලතාදිය සතු හැකියාව ඒවායේ සංකීර්ණත්වය වැඩිවීමත් සමග අධික වේ. මෙම වනාන්තරවල ඇති කාෂ්ඨීය ශාක ලයිනත, පාසි, අන්මා ශාක සහ මීවන යන ශාකවලින් ජලය රඳවා තබා ගැනීම අතින් වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු වේ. හවාසි විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිසර විද්‍යාඥයකු වන මහාචාර්ය මියුල්ර් ඩොමිලොයිට් අනුව විශේෂයෙන් කාලගුණ තත්ත්වයන්හි රාත්‍රී කාලයෙහි මෙම වනාන්තර මත පැතිරෙන මිදුම් පටලයන්ගෙන්

ජලය ඇදගැනීමේ හැකියාවන් ඉහත කී ශාකවලට ඇත. හෝර්ටන් තලාවෙන් ආරම්භවන ගංගාවන් වියළි කාලයෙහි ද ජලයෙන් යුක්තවීම තරමක් දුරට එමගින් තහවුරු වේ. ලයිනත, පාසි අන්මා ශාක, මීවන යන මේ ශාක ස්වාභාවික වනාන්තරයෙහි වැඩි ඇති තරම් සාරවත් අත්දැකීම් කිසිම තණබිමක හෝ තේ. පයින්ස් ඇතුළු එක බෝග හෝ වාණිජ වගා පුද්ගලයකු වැටී නොමැත. ඒ හේතුකොට ගෙන කායනීක්ෂම ජලධානික පුද්ගල වශයෙන් ඉහත කී සරල වාක්‍ෂලතා අංශ ස්වාභාවික වනාන්තරවලට සමාන නොවේ.

(3) ජාන සම්භාර එන්රික් කිරීම

හෝර්ටන් තලාවේ වාක්‍ෂලතා සම්භාරය අනාගතයේ දී උද්‍යාන විද්‍යාව, කෘෂිකර්මය, වෛද්‍ය විද්‍යාව යන ක්‍ෂේත්‍රයන්ට අදාළ කායනීයත් බොහොමයකට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ශාක සමුදායක් ලෙස සැළකිය හැකිය. බෝග විවිධාංගීකරණය සඳහා යෝග්‍ය ශාක වර්ග සොයා ගැනීම සඳහා නෙතෙකුට තැවත තැවතත් යත්තට සිදුවන්නේ හෝර්ටන් තලාව වැනි පරිසර පද්ධතීන් වෙතයි. අද පවා විදේශ උද්භිද උද්‍යානවලින් පැමිණෙන ශාක එන්රික් කරන තොරතුරු පුද්ගලයන් හෝර්ටන් තලාව වැනි ස්ථානවලින් උද්‍යාන විද්‍යාත්මක කායනීයත් සඳහා ශාක එකතු කර ගෙන ස්වකීය උද්භිද උද්‍යානයන්හි රෝපණය කරනු පෙනේ. එහි ඇති ස්ට්‍රෝබිලන්තස්, එග්සැනුම්, සහ ගෝඩෝනියා යන විශේෂවල මල් අසාමාන්‍ය අලංකාරයකින් හා චිත්‍රාකාරකයකින් බවකින් යුක්තවේ. තවත් ශාක විශේෂ (රුබියා සහ ලයිනොපෝඩියම්) ඔෂ්ඨීය වැදගත්කමක් උසුලයි. අනෙක්වා ආහාරමය වටිනාකමකින් අගනේය.

(4) අනාගත කෘෂිකර්මය

හෝර්ටන් තලාව සමස්තයක් වශයෙන් ගෙන සලකා බලන විට එහි වාක්‍ෂලතා අතර ඇති විභව කෘෂිකාර්මික ශාකවල වටිනාකම හැර කඳුකර පුද්ගලයන්හි කෘත්‍රීම (තොහොත් මිනිසා විසින් සකසා ගෙන ඇති) බහු වගා ක්‍රම තුළින් අත්කරගත හැකි ප්‍රයෝජනද අවබෝධවනු ඇත. වනාන්තරයේ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරීත්වය

සැළකිල්ලට භාජනය කළහොත්, තිසැතවම, සමාන උස ප්‍රමාණයන්ගෙන් හා දේශගුණික තත්වයන්ගෙන් යුත් පුද්ගලයෙකු කෘෂිකර්මය පිළිබඳව තොරතුරු දැනගත හැකිවේ. මෙම ස්වාභාවික ව්‍යාප්තිය තරාතිරමක් ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුක්ත වන බව කාලයා විසින් ඔප්පු කර ඇත. එම කෘෂිකර්මයට පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර ඉන් ලබන දැනුම අනාගත කෘෂිකර්මයට ක්‍රම සඳහා භාවිතා කරගත හැකිද යන්න සොයා බැලීමට හැකියාවක් තැද්ද? එක් අනෙකින් ව්‍යාප්තිය සහ අනෙක් අතින් තණබිම සහිත හෝර්ටන් තලාව අනාගත කෘෂිකර්මය සඳහා අනාගත ආදායමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළයුතුව ඇත්තේ හෝර්ටන් තලාවේ පරිසර පද්ධතිය වෙතත් වෙමින් පවතින බවය. 1978 තරම් ඇත කලකට පෙරම මෙම ලිපියේ සඳහන් බිම්. ආර්. එම්. පෙරේරා මහතා විසින් හෝර්ටන් තලාවේ ගස් මැටි යමින් පවතින බව වාර්තා කර ඇත. ලෝකයේ නොයෙකුත් පුද්ගලයෙකු ව්‍යාප්තිය "මැටියාම" පිළිබඳව පොත් පත්වල සඳහන්වී ඇති අතර මෙකී සංසිද්ධියට හේතු වන සාධක ගැන ප්‍රධානීන් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. 'හෝර්ටන් තලාව' සම්බන්ධයෙන් නිතරම සාධක එහි ' මැටියාමට' ඉවහල් වී දැයි කිසිවෙක් නොදනිති. ඒවා මිනිසා

විසින් ඇති කරන ලද්දේ? නැතහොත් ස්වාභාවිකද? ස්වාභාවික නම් ස්වාභාවික හේතූන් මුල්කොට ආරම්භ වූවායයි සළකන වර්තමාන තණබිම් බිහිවී ඇත්තේ අවුරුදු දස දහස් ගණනකට කලින් පැනනැගී ඇති සමාන තත්වයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්ද? වර්තමාන ව්‍යාප්තිය ඇති තැන්වල, ඒ වෙනුවට තණබිම් ඇතිවේද? එම සාධක මිනිසා මුල්කොට ඇති වූ ඒවා නම් මිනිසා ස්වාභාවික පරිසරය විනාශ කිරීමේදී වුවමනාවට වඩා දුර ගොස් ඇති බව ප්‍රකාශ කරන අනතුරු ඇඟවීමක්ද? කරුණු කෙසේ වුවද, හෝර්ටන් තලාවේ ව්‍යාප්තිය වෙනස්වී ගෙන යන බව නම් සත්‍යයකි. සානුවේ රැළි සහිත භූ දර්ශනය, තිස්සලියෙකුගේ, ප්‍රථම බව මෙතෙක් ව්‍යාප්තිය-තණබිම් පරිසරයේ අලංකාරය මිනිසාගේ තෙත්සිත් ඇදගත්තේ කෙලෙසද? එලෙසින්ම එහි සිදුවෙමින් පවතින වෙනස්වීම් තිසා "හෝර්ටන් තලා ව්‍යාප්තිය-තණබිම් පරිසර පද්ධතියේ අනාගතය කුමක්ද? අනාගත පරම්පරාවන් අද අප එය දකින සැටියෙන් දකිද? තැත්තම් එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්වී තිබෙයිද?" යනුවෙන් ප්‍රශ්න කරන පරිසර විද්‍යාඥයාගේ සිත වෙහෙසට පත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික ව්‍යාප්තිය

උපේක්ෂා හෙට්ටිගේ

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

මෑතකදී මිහින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කර ඇති ඇස්තමේන්තුකර අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 24.9 ක ප්‍රතිශතයක් ස්වාභාවික ව්‍යාප්තියෙන් වැසි තිබේ. නොයෙක් වර්ෂවලට අයත් මෙම ව්‍යාප්තිය විවිධාකාරයෙන් විස්තර කළ හැකිය. නමුත් ඒ සඳහා වඩාත්ම භාවිතා වන්නේ දේශගුණික කලාප මත පදනම් වී ඇති පහත සඳහන් වර්ගීකරණයයි (1 වන වගුව). මීට අමතරව තණබිම්, සැවතා වනාන්තර, කඩොලාන ඇතුළු වෙරළබඩ ප්‍රජාවන් වැනි වෙනත් නොයෙකුත් ශාක ප්‍රජාවන් දක්නට ලැබේ. ඒවා එක් විශේෂ දේශගුණික කලාපයකට සීමාවන ප්‍රජාවන් නොවේ.

1 වන වගුව

ව්‍යාප්තිය වර්ගය	දේශගුණික කලාපය
නිවර්තන තෙත් සදාහරිත වනාන්තර/නිවර්තන වැසි වනාන්තර	තෙත් කලාපය
නිවර්තන මොන්ටාන වනාන්තර	තෙත් කලාපය
අන්තර් කලාපීය වනාන්තර	අන්තර් කලාපය
වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර	වියලි කලාපය
නිවර්තන කටු වනාන්තර	ශුෂ්ක කලාපය

දේශගුණික කලාපයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ව්‍යාප්තිය වර්ග:

නිවර්තන තෙත් සදාහරිත වනාන්තර/ නිවර්තන වැසි වනාන්තර

උත්කර්ෂ වනාන්තර ගණය ලෙස සැළකිය හැකි මෙම වනාන්තර අයත් වන්නේ දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයෙහි තෙත් කලාපයටය. ඒවා

වෙරළබඩ සිට මීටර 1500 ක් පමණ වන මධ්‍ය උන්නතාංශ දක්වා ව්‍යාප්ත වේ. මිලි මීටර 2500 සිට 5000 දක්වා වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන නිසා ආර්ද්‍රතාවය හිඟ කාලසීමාවක් මෙම ප්‍රදේශයෙහි ඇති නොවේ. මෙහි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 28 ක් පමණය. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 75% ක් 85% ක් අතර විචලනය වේ. පස රතු කහ පොඩ්සොලින් වර්ගයට අයත්ය.

වැසි වනාන්තර සංකීර්ණ ව්‍යාප්තියක් වේ. ව්‍යාප්තිය සතුව වැඩි මනාව ඇතිදී ඇති අතර යෝග්‍ය දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ සාරවත්ව වඩාත්ය වේ. මෙම වනාන්තර විශේෂයෙහි ශාක ඉතා ගහගැරේව වැඩේ. නිවර්තන තෙත් සදාහරිත වනාන්තරවලින් විවිධ ශාක විශේෂ රාශියක් සහ ආවේණික ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් වාතාවී තිබේ. ඉතා පැහැදිලි ලෙස සිරස් අතට ශාක ස්තර වෙන්කර දැක්විය හැකිය. උසට ගස් වැඩී ඇත්තේ තැනින් තැන වන අතර ඒවා මගින් අඛණ්ඩ වියනක් නිමාණය වී නොමැත. Dipterocarpus zeylanicus (හොර), Dipterocarpus hispidus (බු හොර) සහ Shorea යන විශේෂයන්ගෙන් සැදී තිබේ. වියනට යටින් උප වියන සහ "යටිමහල්" ස්තර දක්නට ලැබේ. Mesua nagassarium (බටු-තා), Chaetocarpus castanocarpus (හැඩවන), Ansophyllea cinnamomidis (වැලිපියන්න), Myristica dactyloides (මලබ්බ) සහ Shorea යන විශේෂයන්ගෙන් සැදී තිබේ. වියනට යටින් උප වියන සහ "යටිමහල්" ස්තර දක්නට ලැබේ.

"යටිමහල්"ට පහළින් පසුරු, මිටි ගස් සහ පැළෑටිවලින් සැදුම් ලත් ස්තරය ඇත්තේය.

තොයෙකුත් පාසි, මීවන, සහ පැලෑටි වර්ගවලින් වහාත්තර භූමිය වැසී තිබේ. කාන්තරයක් ලෙස වටේ එතෙමින් වියන දෙසට තහිසි. සිරස් ස්තරයේ සැම මට්ටමකම අපිශාක බිහිවී හා මීවන සුලභය.

ස්තම්භ වැනි මහා කඳකින් යුක්තවීම විශාල ගස්වල කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි. ගස් වර්ග සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක බෙදී ගිය අතු දක්නට තොලැබෙන අතර, අතු බෙදී යාම (එසේ සිදුවන අවස්ථාවන්හි) ගසෙහි සැහෙන ඉහළින් ආරම්භ වන බව පෙනේ. මෙම විශාල ගස්වල මුල් ගැඹුරට පිහිටා තොමැන. ශක්තිමත්ව පිහිටීම සඳහා මේවාට කසිරුවල ආධාරය ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන් මෙම කරුණ හේතුකොට ගෙනය. ඇතැම් ගස්වලට ආධාරක වශයෙන් කසිරු මුල් නිමාණය වී ඇති බවද පෙනේ. ශාක පත්‍ර වැහුම් තුඩුවලින් යුක්තවීම වැසි වහාත්තරයෙහි තවත් වැදගත් ලක්ෂණයකි. ඇතැම්විට මෙම දිගටි පත්‍ර මේ අයුරින් සකස් වී ඇත්තේ ඒවා මත තිරතුරුව එකතුවන අතිරික්ත තෙතමනය බස්සවා දැමීමට විය හැකිය. කෙළින්ම කඳෙන් හෝ අතු වලින් මල් සහ එල හට ගැනීම සිදු වේ. මෙම "ස්කන්ධප්‍රජාපිපාස" යනුවෙන් හැඳින්වෙන සංසිද්ධිය වැසි වහාත්තරයට විශේෂ වත්තකි. හානිකර විකිරණයෙන් ලපටි පත්‍ර ආරක්ෂා කරවීම සඳහා ඒවා ප්‍රභාමත් වර්ණයන්ගෙන් නිමාණය වී තිබේ. වැසි වහාත්තරයට පෝෂක ප්‍රධාන වශයෙන් එන්රැස් වී ඇත්තේ පෙට්ට්ස්කන්ඩය තුලය. ගැඹුරට තොපිහිටා ඇති මුල් පද්ධති එන්රැස් ද්‍රව්‍ය කුණුවීම හා පිරණය නිසා පසට එක්වන පෝෂක අවශෝෂණය කරගත හැකි වන ආකාරයට මනාව හැඩ ගැසී තිබේ. "දිලීර මුලය" යනුවෙන් හැඳින්වෙන ගස් මුල් සහ දිලීර අතර පවතින සම්බන්ධතාවය තුලින් මෙම පෝෂක අවශෝෂණය තවත් පහසු කෙරේ. මෙම හිසු වක්‍රීකරණය අවසාන ප්‍රතිඵලය වශයෙන් වහාත්තර පස වේගයෙන් නිසරු වේ.

කලත් විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරී තුබූ මෙම වහාත්තරය දැනට දිවයිනේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 1.45 ක ප්‍රතිශතයක් දක්වා අඩු වී තිබේ (2 වන වගුව). එහි සිංහරාජ, හිනිදුම කන්ද සහ

කන්තෙලිය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශ තවමත් මිනිස් පහසින් හිඳහස්ව පවතී.

නිවර්තන මොන්ටාන් වහාත්තර

තෙත් කලාපයේ මීටර 1500 ට ඉහළ කඳු ප්‍රදේශයන්හි නිරිතදිග බෑවුම්වල මෙම වහාත්තර වර්ග දක්නට ලැබේ. මෙම ප්‍රදේශයද ආර්ද්‍රතා හිත කාලයකින් තොරව මිලි මීටර 2500 සිට 5000 දක්වා වූ වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් ලබයි. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙ. 20 ක් පමණ වන අතර ඉහළ කඳු මුදුන්වල තිරතුරුව තුෂාර දක්නට ලැබේ.

මෙම ව්‍යාකූලතා වර්ගයෙහි සිරස් ස්තරවලින් එතරම් කැපී නොපෙනෙන අතර ජට අයත්වන ස්තර සංඛ්‍යාව අඩුය. එහි දක්නට ලැබෙන සාපේක්ෂ වශයෙන් වඩා කුඩා සැකැස්මකින් යුක්තවන ගස් වැඩි ඇත්තේ වියත් මට්ටමේදී මීටර 13 ක් තරම් උසක් දක්වා පමණි. මෙම ගස් විශේෂයෙන් අතු කරකැවී පහළට බර වී ඇති ස්වභාවයක් ගනී. වියන නිමාණය වී ඇති ගස් ඝනව වැඩි විහිදී ගිය සමතලා මුදුන්වලින් යුක්ත වේ. ගස් විශේෂ බොහොමයක පත්‍ර මෘදු ය. ඉතා විශාලය. මෙම ශාක ප්‍රජාවට ප්‍රධාන වශයෙන් අයත්වන විශේෂ තම් Elusocarpus glandulifer (තිත්ත වෙරළ), Mastixia tetrandra (දියතාලිය), Michelia nilagirica (සපු) සහ Calophyllum walkeri (බටු නීත) ය.

වියත් ස්තරයට යටින් Cinnamon sp (කුරුඳු) සහ Rhododendron arboreum (මහ රත්මල්) යන කුඩා ගස් විශේෂ වැඩි ඇත. ඝනව වැඩි ඇති, යටි රෝපණයට Psychotria nigra, Strobilanthes sp' සහ කලු-උණ යන පඳුරු වර්ග අයත් වේ. අපි ශාක, බිහිවී සහ ලයිකන් ද බහුලව දක්නට ලැබේ. "මහල්ලාගේ රැවුළු" යනුවෙන් හැඳින්වෙන Usnea barbata නම් ලයිකන් වර්ග අතු වලින් පහළට එල්ලී තිබෙනු දක්නට ලැබේ. බිම් ස්තරය පැලෑටි වර්ග ගණනාවකින් යුක්ත වේ.

දැනට මෙකී වෘක්ෂලතා වර්ග වැඩි ඇති ප්‍රදේශය මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 1.54% ක් පමණි. හත්ගල, හෝරටත් තලාව හා ශ්‍රීපාද අඩවිය යන ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ නිවර්තන මොත්වාත් වනාන්තර සඳහා සුදුසු ප්‍රදේශ වේ.

වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර

මෙම වනාන්තර වර්ග දිවයිනේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 3/2 පමණ ආවරණය කරන වියලි කලාප තැනිතලාවන්හි උත්කර්ෂ වෘක්ෂලතා ගණය ලෙස සැළකේ. මෙම ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතය මිලි මීටර 1250 සහ 1900 අතර විචලනය වේ. ඔක්තෝබර් සිට ජනවාරි මාසය දක්වා ජසාතදිග මෝසම් සුළඟින් වර්ෂාව ලබන මෙම ප්‍රදේශයට ප්‍රති සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය අතීතයින් වියලි කාල සීමාවක් වේ. මෙහි පස රතු මිශ්‍ර දුඹුරු වර්ණයකින් යුක්තය.

විවෘත හා උසින් අඩු වියනක් මෙම වනාන්තරවල ඇත්තේය. මේවාට සිරස් ස්තරීභවනයක් නොමැත. උසින් වැඩි ගස් වියත් මට්ටමින් මීටර 3 ක් පමණ ඉහළට වැඩි තිබේ. උස ගස්වලින් වැඩි සංඛ්‍යාව පතනශීලී ගණයට අයත් වේ. ඒවා නම් Choroxylon swietenia (බුරුත), Vitex pinnata (මිල්ල), Berrya cardifolia (ගලමිල්ල) සහ Adina cordifolia (කෝන්) ය. ප්‍රධාන වශයෙන් මීටර 20 සිට 25 දක්වා උසට වැඩි ඇති සදාහරිත ශාක විශේෂයන්ගෙන් වියන නිමාණය වී තිබේ. පුළුල්වශයෙන් දක්නට ලැබෙන වියන් -විශේෂයන් නම් Drypetes sepiaria (වීර), Berrya cordifolia (ගලමිල්ල) සහ Diaspyros ebenum (කථවර) ය. අන්‍ය ශාක විශේෂවල පත්‍ර හැඳි ඇති විටකදී පවා වනාන්තරය සදාහරිත පෙනුමක් ලබන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් Drypetes Sepiaria (වීර) ගස් හේතු කොටගෙනය. බොහෝ ශාක විශේෂ ශුෂ්කරූපිත අනුවර්තී පෙන්නුම් කරයි. මෙම ශාක ප්‍රජාව තුල අභිශාක සහ පාසි දක්නට නොලැබේ. වනාන්තර පස සාපේක්ෂ වශයෙන් ශාක පෝෂකයන්ගෙන් සාරවත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෘක්ෂලතා අතුරින් වඩාත්ම පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති ශාක ප්‍රජාව මෙය වේ. තමුත් එය වේගයෙන් අඩුවෙමින් පවතින අතර දැනට ව්‍යාප්තව ඇත්තේ මුළු භූමි ප්‍රදේශයෙන් 21.9% ක පමණි.

නිවර්තන කටු වනාන්තර

නිවර්තන කටු ලැහැබී වනාන්තර දිවයිනේ වයඹ සහ ගිණිකොණ දිශාවන්හි ශුෂ්ක ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබෙන දුර්භීය වෘක්ෂලතා වර්ගයි. (විශේෂයෙන් ජසාතදිග මෝසම් සුළං කරණකොටගෙන) මිලි මීටර 1250 කට අඩු වාර්ෂික වර්ෂාපතයක් මෙම වනාන්තරවලට ලැබේ. මාරතු සිට සැප්තැම්බර් තෙක් මාස 4 සිට 7 දක්වා ආර්ද්‍රතාවය හිඟ දිගු කාල සීමාවක් වේ.

මෙම වනාන්තරය, තැනින් තැන ඇති ගස්වලින් යුත්, පහත්, විවෘත, කටු ලැහැබී ගහණ ප්‍රදේශයකි. ශාක විශේෂ සියල්ලම ඝන පත්‍ර, කටු සහ අනෙකුත් ශුෂ්කරූපිත අනුවර්තී ප්‍රදීප්තය කරයි. බහුලව ඇති ශාක විශේෂ නම් Carissa spinarum (හින් කරඹ), Zisypus sp (එරමිතියා), Acacia sp සහ Dichrostachys cinera (අත්දර) ය. මේවා කුරු ගස් විශේෂ වේ. මෙම ශාක ප්‍රජාවට අයත් ප්‍රධාන ගස් විශේෂ නම් Salvadora persica (මලින්තන්), Manilkara hexandara (පලු) සහ Drypetes sepiaria (වීර) ය. මත්තාරම් සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙහි වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල කටු වනාන්තර දැකිය හැකිය.

අත්තර් කලාපීය වනාන්තර

මෙම අඩි-සදාහරිත වනාන්තර පහත් සහ මැද රට අත්තර් කලාපයට අයත් උත්කර්ෂ වෘක්ෂලතා ගණය වශයෙන් සැළකේ. මෙහි දක්නට ලැබෙන ශාක විශේෂවල සංයුතිය තෙත් සදාහරිත වනාන්තර සහ වියලි සදාහරිත වනාන්තර අතරට වැටෙන්නකි. මෙම ශාක ප්‍රජාවෙහි බහුලව දක්නට ලැබෙන විශේෂ අතර

Melia dubia, Filicium decipiens (පිහිබිය), Bombax ceiba, Artocarpus lakoocha (කහගොත), Magnifera zeylanica (ඇටබ) ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මුළු භූමි ප්‍රදේශයෙන් 1% වැනි ඉතා අඩු ප්‍රතිශතයක් දක්වා, මෙම ස්වාභාවික වනාන්තර අඩු වී ගොස් තිබේ. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බර්ගොඩ සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දරාගොඩ යන ප්‍රදේශවල තැනින් තැන අන්තර්-කලාපීය වර්ගයට අයත් තිස්සාර වන ලැහැබ් දක්නට ලැබේ.

නිවර්තන සැවතා වනාන්තර

මෙම වනාන්තර ඇත්තේ මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර බෑවුම් වලය. මේවායේ ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩි ඇත්තේ කණකොළ වර්ගයි. ගස් ඇත්තේ තැනින් තැන. මෙම කණ වර්ග උසින් වැඩිය. ඇතැම් විට මීටර 2 ක් පමණ උසකට වැඩේ. කණ වර්ගයන්හි ගිනි ඇවිලෙන සුලු ස්වභාවය ඉතා අධික නිසා මෙම ශාක ප්‍රජාව තුළ තිරතුරු ගිනි ඇවිලීම හට ගනී. ප්‍රධාන කණ වර්ගය Imperata cylindrica (ඉලුන්) කුරු ස්වභාවයක් උසුලයි. ඇතැම් විට මීටර 7 ක් දක්වා උසකට වැඩේ. ගස් වර්ග ගින්නට ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වයි. Careya arborea (කහට), Terminalia belerica (බුලු), Terminalia chebula (අරඵ) සහ Phyllanthus embelica (තෙල්ලි) ගස් විශේෂ මේවා අතර ප්‍රධාන වේ. මෙම වර්ගයට අයත් වන ලැහැබ් මහියංගන, බිබිල හා වැල්ලවාය යන ප්‍රදේශවල තවමත් දක්නට ලැබේ.

තණබිම්

දේශගුණික ප්‍රදේශ සැම එකකම තණබිම් දක්නට ලැබේ. කෙසේ වුවද, මෙකී කිසි ප්‍රදේශයක තියම වශයෙන් උත්තර්ෂ ගණයක් නිමාණය වී නොමැත. තණබිම් අතුරින් විශාල තම ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්ත වී ඇති වඩාත් පුනට වර්ග "පතත්" වන අතර ඒවා තෙත් කලාපයෙහි දැකිය හැකි වේ. වියළි පතන සහ තෙත් පතන යනුවෙන් පතත් බිම් දෙවර්ගයකි. වියළි පතත් බිම්

විශාලය. ඒවා ව්‍යාප්තව ඇති ප්‍රදේශ මීටර 500 ත් 1500 ත් අතර වේ. මතුපිට පස වියළිය. මෙය තලින් තලට ගිනි ඇවිලීම් උද්ගත කරවන සාධකයකි. ප්‍රධාන කණ විශේෂ නම් Cymbopogon na (මාත) Themeda tremula සහ Imperata cylindrica (ඉලුන්) ය. තෙත් පතත් බිම් ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය. ඒවා මීටර 1500 ට ඉහළ උත්තතාංශයෙහි දක්නට ලැබේ. මෙම මට්ටමට ඉහළ ප්‍රදේශවල අගසෙහි පැතිරී ඇති වළාකුල් තුලින් ශෛෂර විකිරණය වනාන්තර භූමිය දක්වා විහිවීද එන්නේ මඳ වශයෙනි. තෙත් පතත් තිරතුරු තද කුණාටුවලට පාත්‍ර වන අතර ඒවාහි බිම පින්තෙන් වැසී යයි. පස තෙතමතින් යුක්තය. එමෙන්ම වගුරු ස්වභාවයක් ගනී. විශෝජනය අවම මට්ටමකින් සිදුවන හෙයින් ඵෙත්ඳිය ද්‍රව්‍ය පස්වල එකතුවීමත් ඒ අනුව පස කට පැහැයට හුරු වර්ණයක් ගැනීමත් සිදු වේ. ප්‍රධාන කණ විශේෂ Chrysopogon zeylanicus Arundinella villosa සහ Pollinia sp වේ. Rhododendron arboreum (මහරත්මල්) හා තොයෙකුත් පැලෑටි වර්ග කණ බිමෙහි තැනින් තැන වැටී ඇත. Arundinaria densifolia (බට) තමැති ආවේණික උණ පඳුරු වර්ගය ස්ථිර වශයෙන් තෙත් ප්‍රදේශ සිය වාස භූමිය කර ගෙන තිබේ. වඩාත්ම පුනට තෙත් පතත් කණබිම් ඇත්තේ හෝර්ටන් තලාවේය. අනෙක් තෙත් කලාපීය කණබිම් වන 'තලාව' සහ 'කැකිල්ල' මීවන බිම් මීටර 1500 කට පහළින් පිහිටි පහත රට කණබිම් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය. මෙම ව්‍යාප්තතා විශේෂ පහළ වී ඇත්තේ වනාන්තර එළිපෙහෙළි කිරීම, සල ගොවිතැන හා තිරතුරු පිළිස්සීම් හේතුකොටගෙන සිදුවන පස තිසරුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. ගාලු හා කඳුතර දිස්ත්‍රික්කවල තලාව බිම් දක්නට ලැබේ. කැකිල්ල මීවන බිම්වල ඇති ප්‍රධාන ශාක විශේෂ ය. Dicranopteris linearis (කැකිල්ල) වේ. මේවා රත්නපුර හා කඳුතර දිස්ත්‍රික්කවල දක්නට ලැබේ.

වියළි කලාපීය කණබිම් විශේෂයන් නම් 'වියළි දළම' සහ 'තෙත් චිල්ලුය'. දළම කණබිම් බිහිවී ඇත්තේද වනාන්තර එළිකිරීම් සහ පිළිස්සීම්වල

ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. මෙම තණබිම් පොළොන්නරුව, මහවිලිය සහ ගල්බය ප්‍රදේශවල ඇත. කලින් ජලය සහිතව තිබී දැනට ජලය නොමැති ජලාශවල පත්ල සහ ජලය එක්ස්ස්ට් කුඩු විශාල වළවල් පත්ල සහ විශේෂයෙන් මහවැලි වැනි ගංගාවල පිටාර තැනි මෙම විල්ලු සඳහා වාසගුමිය වී තිබේ. පිටාර ගැලිම් කාල සීමාව හා ප්‍රමාණය මත විල්ලු පද්ධතියේ පරිසරය තීරණය වේ. ශාක ප්‍රජාවට තෘතීය සහ හස් අයත්වේ. Cyanodon dactylon, Panicum repens සහ Brachiaria මේවායේ තිබෙන ප්‍රධාන තණ වර්ග වේ.

කඩොලාන වනාන්තර

ලවණ-ජලගැලීම්වලට තිරතුරුව පාත්‍රවන කලපු සහ ගංගා මුවදොරවල් ආශ්‍රිතව පිහිටි ආවරණික අන්තර්-උද්ඵ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල කඩොලාන වනාන්තර පැන නැගී තිබේ. මෙම විශේෂ ප්‍රජාව හෙමළ සාධකයන්ගෙන් පාලනය වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කඩොලාන විවිධත්වයෙන් අඩු, වඩිතයෙන් හිත ඒවා වේ. තවද ඒවාහි ආවේණික ශාක නිසිවත් නොමැත. නියම කඩොලාන ශාක වර්ග සහ කඩොලාන ශාකයන්ට නැතම් නියත ශාක වර්ග මෙම ප්‍රජාවට අයත් වේ. නියම කඩොලාන ශාක නම් Rhizophora, Bruguiera, Avicennia, Xylocarpus, Cerriops යනාදියයි. කඩොලාන ශාකයන්ට නැතම් නියත වර්ග නම් Cerbera manghas (කදුරු), Acanthusilicifolius, Sonneratia alba (කිරල) යනාදියයි.

කඩොලාන වඩිතය වන ප්‍රදේශවල පස වගුරු ස්වභාවයට පත්වන අතර ඒ අනුව එහි වාතනය දුච්ඡ වේ. පසෙහි ලවණතාව සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මට්ටමක පවතිනු මෙන්ම කලින් කලට උච්චාවචනය ද වේ. මෙම අහිතකර තත්ත්වයට මුහුණදීම සඳහා විශේෂ අනුවර්තීන් ගොඩනගා ගෙන තිබීම කඩොලාන ශාකවල දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයකි. බුරුල් උපස්තරයක පිහිටා ඇති කඩොලාන ශාක නැගී සිටීමේ ශක්තිය ලබා ගත්තේ වඩිතයට ඇති

විශේෂ මුල්වල ආධාරයෙනි. අනුවලින් පැන නගින කරුමුල් සහ ප්‍රධාන තාරවියෙන් පැන නගින කයිරු මුල් එම විශේෂ මුල් වර්ග වෙයි. ලවණ ස්වාභාවය තරත භූමි මගින් අතිරික්ත ලවන ඉවත් කරනු ලැබේ.

උත්ස්වේදනයේදී සිදුවන ජල භාතිය වැළැක්වීම සඳහා සකස්වී ඇති ශුෂ්කරූපින අනුවර්තීන් සියලුම කඩොලාන ශාකවලට පොදුය. කඩොලාන ශාක පත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් ජලය ගබඩා කර ගත හැකි පටලයක් අන්තර්ගත සහ, උච්චර්මයකින් යුක්තය. බොහෝ ශාක විශේෂයන්හි මතුපිට පසින් උඩු අතට හැරී වඩිතය වී ඇති ශ්වසන-මුල් දක්නට ලැබේ. මුල් අග ඇති විවරයන්ගේ මාභියෙන් වාතය හුවමාරු කර ගැනීමට සිදුවේ. පරිසරයෙන් ඇති වන බාධකයන්ට මුහුණදීම සඳහා වඩිතය වී ඇති, 'ජලාබ්‍රූජතාව' බොහෝ කඩොලානගේ පෙත්තුව වේ. එලය මාතෘ ශකයට සම්බන්ධිතව තිබියදීම බීජය පුරෝගණය වන්නට පටන් ගනී. මනාව වඩිතය වී ඇති බීජාවරණය සහිත ලපටි බීජ පැලය, මාතෘ ශාකයෙන් වෙන්වී පසෙහි තැන්පත්වීම සඳහා ස්ථානයක් ලැබෙන තුරු ජලයෙහි පාවෙයි. කඩොලාන පිළිබඳ කදිම නිදහිත දක්නට ලැබෙන්නේ මිගමුව සහ මඩකලපුව යන කලපු ආශ්‍රිතවය.

වෙරළබඩ ප්‍රජාව

වැලිවැටි, මුහුදු තණ පිටි සහ ලවණ වගුරු වෘක්ෂලතා යන නොයෙකුත් වෙරළබඩ ප්‍රජාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබේ. තමුත් මෙහිදී විස්තර කරනු ලබන්නේ ඉතාමත් පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රජාව වන මුහුදු වෙරළ ප්‍රජාව පමණකි. මෙම වෘක්ෂලතා වර්ග ඇත්තේ මුහුදු වෙරළේ උද්ඵ මට්ටමින් ඉහළ ප්‍රදේශවලය. මෙහිදී කලාප හතරක් වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනාගත හැකිය. ඒවා නම්: (1) වෘක්ෂලතා රහිත හිස් ප්‍රදේශ (11) පහතින් බිම පැතිරෙන මිටි වෘක්ෂලතාදියෙන් යුත් කලාපය (111) මිටි පදුරු සහ වෙරළබඩ කැලැවෙන් යුත් කලාපය සහ (IV) වැලි සහිත පසෙහි විහිදී ගිය මුල්වලින්

යුත් වෘක්ෂලතා වේ. මෙම කලාපයෙහි Ipomoea
pescaprae (බත්තඹුරු) සහ Spinifex
littorus (මහ-රාළු රවුළ) යන ශාක විශේෂ
ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මිටි පඳුරු කලාපයෙහි
වැදගත් තැනක් ගන්නේ Clerodendron
inorme සහ Crotolaria retusa වැනි පඳුරු
හා පැලෑටිය. වෙරළබඩ කැලෑවට Pandanus
(වැටකෙසියා),


Calophyllum enophyllum (දොඹ)
Barringtonia speciosa (බුදිල්ල), Phoenix
zeylanica (ඉඳි) සහ Terminalia catappa
(තොට්ටඹ) ඇතුළත් වේ. මෙම ප්‍රජාව දැනට
තැනින් තැන පිහිටි වෙරළබඩ කැළෑ බිම්
නීතිපයකට සීමාවී ඇත.

වගුව 2:

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තරවල විශාලත්වය

වෘක්ෂලතා වර්ගය	එක් එක් කලාපයට අයත් මුළු බිම් ප්‍රදේශය අනුව වැඩි ඇති වනාන්තරවල ප්‍රතිශතය	මුළු දිවයිනට අයත් බිම් ප්‍රදේශය අනුව වැඩි ඇති වනාන්තරවල ප්‍රතිශතය
නිවර්තන තෙත් සදාහරිත වනාන්තර/නිවර්තන වැසි වනාන්තර	9.1	1.45
නිවර්තන මොන්ටාන් වනාන්තර	17.8	1.54
අන්තර් කලාපීය වනාන්තර	1	තොසැලකිය හැකි ප්‍රමාණයක්
විශදි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර	30.3	21.97

ශ්‍රී ලංකාවේ චිතෘත්‍ර ආවරණය සහ දේශගුණික කලාප



ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් ශාක සහ ඵලායේ ඖෂධීය ප්‍රයෝජන

තපු

ඉංග්‍රීසි: තැණු තම් සිංහල: තපු, දෙමළ : අත්දිම, තල්ලාරම, නොට්ටෙයිමුන්දිට්, මුත්දිට්, සාරම්, සිහිදිම, තිට්ගයි, උට්ටුමාබලම්, හිත්දි: තපු, සංස්කෘත: අග්නිකුත, අරුණකාර, ගුම්මපුෂ්ප, තපුටක, පාර්වතී, ප්‍රිතගනීප, සෝථාර. සෝථාගාර. ග්‍රිසිට්ථාල, උපපුෂ්පිත, විට්ටිටපත්‍ර.

ඇඳවිහිය කඳකින් සහ සිහිදු සිලින්ඩරාකාර අතුරවලින් යුත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගසකි. පත්‍ර සරල, ඵලාකාර හා වර්ගාකාර. දිගින් සෙන්ටිමීටර 8.5-24 ක් හා පළලින් සෙන්ටිමීටර 5.8-14.5 ක් අතර වේ. ආයතන තැනහොත් ඉලිප්සී ඇත. පත්‍ර අග කවාකාරව තරමක් තනාගුව පවතී. සිහිදුය. එහි අත්තර්ගත තාරටි ශක්තිමත්ව පාලාවක් මෙන් පිහිටා ඇත. පත්‍රයෙහි යටි පැත්ත කීලාකාරය. ධාරය රැළි සහිතය. පාර්ශ්වික තාරටි සුලල 10-15 ක් අතර සංඛ්‍යාවක් වේ. මෙම තාරටි පත්‍රය යටි පැත්තෙහි වඩාත් කැපී පෙනේ. පත්‍රවල තැටි සෙන්ටිමීටර 1- 2.5 දිගය. ක්‍රමවත්ව පිහිටා ඇති කුඩා මල් තටුව අගට වත්තට බහුයෝගීය. තිප්‍රි සංයුක්ත ඵලාකාර, පත්‍රවලට වඩා දිගුය. මංජරී වෘක්කය කල් ගතවීමත් සමග දිත්වේ. උප පත්‍රවල දිග මෙන්ම පළල මිලිමීටර 6-8 අතර වේ. බොහෝ දුරට අශ්වාකාරය. තීව්‍රය. පිට පැත්ත බුට සහිතය. ඇතුල් පැත්ත සිහිදුය. ඉන්මණින් හැලෙන සුලුය. මණිපත්‍ර 5 හෝ 6 ක් වේ. අසමාවෘතිය. මිලිමීටර 4-5.5 දිගය. මිලිමීටර 1-2.7 පළලය. ලත්සාකාර හෝ අශ්වාකාරය. පිට පැත්ත බුට සහිතය. මල් පෙති 5 හෝ 6 කින් යුක්තය. රේඛීය -ලත්සාකාරය. අසමාවෘතය. ඇතුල් පැත්තට කවාකාරව තැම් ඇත. කොළවත් කහ වර්ණයකින් යුක්තය. මධ්‍යයෙහි රතු පැහැයෙන් යුත් කොටසක් වේ. රේණු 7-10 ක් වේ. අගින් බිම්බ කෝෂය ස්පර්ශවන සේ ඵ වටා පිහිටා ඇත. ඇතැම්විට එක් රේණුවක් අතර රේණුවලට වඩා දිගුව, එනම් මල්පෙතිවලින් ඉහළට තැඟී සිටින

තරම් ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වේ. තැනහොත් සියල්ලම සමානය. වඩා කෙටි රේණුවල සුක්‍රිකා මිලිමීටර 3.5-4 දිගය. දිගු රේණුවල ඵලා මිලිමීටර 8.5 දිගය. පාදය දෙසට වන විට මේවා බුට සහිතය.

බිම්බ කෝෂයෙහි ඉහළ ප්‍රදේශය විශාලවන අතර පහළට වන විට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් කුඩා වී ගෘද්‍රයාකාර හැඩයක් ගනී. දිග මිලිමීටර 2 කි. අග බුට සහිත වේ. ඖෂධීය සිහිදුය. පැත්තකට බරව සිහින්වී යයි. මිලිමීටර 7.5-8 දිගුය. අස්මාව වෘක්කාකාරය. සෙන්ටිමීටර 2.5 දිග මෙය පිම්බී ඇති මාංසල, කහ හෝ රත්ත වර්ණ පුෂ්ප වෘක්කයක් මත පිහිටා ඇත. එලාවරණය . විවර සහිතය. සැර තෙල් සුලභව ඇත. බීජය වෘක්කාකාරය. ඉහළට තැම් ඇත. එය තිරිඟුණපෝෂීය. බීජාවරණය පටල සහිතය. බීජ පත්‍ර නිට් රසකින් යුක්තවන අතර අඩ සඳක හැඩයට සමාන වේ.

මල්: තොටැම්බර් මස සහ ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා මල් ගට ගනී.

සංයුතිය

මෙම ශාකයට අයත් අක්මාවේ එලාවරණයෙහි බුලක මුලද්‍රව්‍යවල, කාඩොල්, ඇතකාඩොල්, කඩතෝල් සහ ඇතකාඩින් ඇසිඩ් අත්තර්ගත වේ. තපු මද විශේෂ තෙල් වර්ණයක් උපදවන අතර එහි ලයිතොලින්, පැල්මිටින්, ස්ටීරින් සහ ලිතොසරින් අම්ල සහ සිටොස්ටරින් අත්තර්ගත වේ. මෙම ශාක පොත්තෙහි තිරියාසය "ගම්-ඇරබින්" සහ "බැසොරින්" වල සම්මිශ්‍රණයකි.

ප්‍රයෝජන

පාචනය, උපදංගමය සත්ධිවල ඉදිමුම් සහ දියවැඩියාව යන රෝගවලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ශාක පෙත්තෙන් පිළියෙල කරගනු ලබන කසාය ප්‍රයෝජනයට ගනු ලැබේ. ස්කර්වි තම් රෝගය, ගණිකයේ රෝග සහ ජලශෝථය සඳහා තපු

පුහුලමෙන් ලබාගන්නා යුෂය, නිර්දේශ කරනු ලැබේ. ලාදුරු සහ "ජයෝධියසිස්" නම් ආබාධ සඳහා නිර්විදනයන් වශයෙන් මෙහි එලාවරණයෙන් ගනු ලබන තෙල් ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙය බලගතු පත්‍ර සහ නෘමිතාගනයන් වේ. අඟස් යාතා එන්ජින්වල හිඟි දැල්වීම් පද්ධති උෂ්ණයෙන් ආවරණය කිරීම සඳහා තෙල්වලින් වෙන්කරගන්නා ලද විෂ-රහිත පීෆ්තෝල් සහ නාඩතෝල් උපයෝගී කරගනු ලැබේ. රසනැවිලි කර්මාන්තයෙහි නපු මදය පුළුල් ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනු ලැබේ. ඉන් ලබාගන්නා තෙල් හිරිහැරදායක විෂ වර්ග සඳහා භාවිතා වන යාන්ත්‍රික හා රසායනික ප්‍රතික්‍රියානාටී ද්‍රව්‍යයන් වේ.

ගෝවා ප්‍රදේශයෙහි ඉදිකු නපු පුහුලත්වලින් මද්‍යසාර අන්තර්ගත බීමක් පිළියෙලකරගනු ලැබේ. අප්‍රිකාවේ "ඇප්තේ" නම් රෝග ප්‍රතිකාරයේදී උගුර සේදීම සඳහා ශාකයෙහි පොත්තකු විරේකයක් වශයෙන් එහි මුල්ද උපයෝගී කරගනී. ලපටි රිකිලි සහ පත්‍ර තම්බා තිවාගත් වතුර දමුත්ගේ කැස්ස සඳහා දීමට ගනු ලැබේ. නොංගෝ ප්‍රදේශයේ ශාක පොත්ත ජතල විෂ පෙට්ටේ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන අතර පොත්තේ සාරය ඇතුලත් දියර පෙට්ටේ රුධිරයෙහි අඩංගු සීනි මට්ටම පහත ගෙළිය හැකි බව විශ්වාස කෙරේ.

අඹ

ඉංග්‍රීසියෙන්: මැංගෝ, සිංහල: අඹ, දෙමළෙන්: අඩිෂෙලරායම්, අම්බිරම්. අමරම්, ඉරදම්, කම්මන්කර්, කොහිලෝසවම්, කොන්කු, මා, මාඩි, මඩුඩුඩම්. මංගා, මගන්ඩම්. මලෙයි, මමගම්, මන්ඩි, මන්මඩම්ගතෙයි, මට්ටියගන්ඩම්, මිරුදලගම්, ඔමෙයි. පලෂිරට්ට, පලර්බට්ටි, පිගුබන්දු, ෂෙඩරම්, ෂෙගරම්, ෂුඩම්, ෂුල්ලි, කේමා, කේවම්, හිඩලම්. හින්දි: අම්, සංස්කෘත: අලිප්‍රිය, අමර, අටිසයිරාණ, බ්‍රාන්මරප්‍රිය, ග්‍රිංගාහිෂ්ට, චුක්‍රාලතාමිබර, චූට, චූටක, ගන්ධබන්ධු, කාමාංග, කාමමල, කාමරස, කාමෂාර, කාමවල්ලන, කාමායුධ, කාමේෂ්ට, කේශාවයුධ, කිරේෂ්ට, කෝකිලතන්දු, කෝකිලවාස, කෝකිලෝත්සව, කෝෂි, මඩ්ධන,

මාධවාධාම, මඩුකු, මඩුකාර, මඩුලි, මාධවවාස, මදිරසාඩ, මගන්ද, මන්ජරී, මන්මතලය, මන්මතවාස, මනෝද්ත, මොඩන්කස, මිටිකාලාන, තිලකපිත්ත, තරියාප්‍රිය, පරපුෂ්ටමනෝත්සව, එලසුෂ්ට එාලෝත්පත්ති පිනප්‍රිය, පිනාරග, පිනවල්ලන, ප්‍රියබු, රසල, සහකාර ෂට්පදතිල්හි, සුෂ්ට, ගුණප්‍රිය, සිඬුරස, ශ්‍රීප්‍රිය, සුමදුත, වනෝත්සුර, වසන්තබු, වසන්තකුත.

මීටර 15-20 පමණ උසැති, විහිදී ගිය අතු වලින් යුත් විශාල ගසකි. ගසෙහි පොත්ත රළු, විවර සහිතය. දඩු සහ අතු සිහින්ය. පත්‍ර සරල හා ඒකාකාරය. අතු අඟදී පත්‍ර එකට ගොඩගැසී ඇත. පත්‍ර සෙන්ටි මීටර 12-40 දක්වා දිගකින් සහ සෙන්ටි මීටර 4.5-13 දක්වා පළලකින් යුක්තය. ආයත ගෝ ආයත ලත්සාකාරය. තීව්‍ර ගෝ අතිතීව්‍රය, සිහින්ය. දිලිසෙන සුලුය, සම්පූර්ණය. පත්‍රධාර තරංගීය. පත්‍ර අග පටුය. පත්‍ර තටුව සෙන්ටි මීටර 1.7-4 අතර දිගකින් යුක්තවේ. මල් කුඩාය. කහවත් කොළ වර්ණය, බහුයෝගීය, ඒකගාමීය. තියුණු ගත්ධයකින් යුක්තය. බුබුබුන් යුත්, පත්‍රවලට වඩා දිගු ඒකාන්ත මත මෙම මල් රාශි වශයෙන් ඇතිරී ඇත. කෙටි හා ඝනකම් මල් තැටි එකිනෙකට සම්බන්ධිතව පවතී. උපත කුඩාය. අශ්වාකාරය. බුබු සහිතය. පතතශීලය. මණිය 4 කට ගෝ 5 කට බෙදී ඇත., කොටසක් මිලිමීටර 1.5- 2 දක්වා දිගය, මිලිමීටර 1-105 දක්වා පළලය. අශ්වාකාරය. අසමාවෘතය (එකක් අනෙක පසුකර යන අයුරින් ඒ මත පිහිටි); බුබු සහිතය. මල් පෙති 4 කින් ගෝ 5 කින් යුක්තය. ඇතැම් මල් වැඩි කොටසක් එක් තට්ටුවකට වැඩි ප්‍රමාණයකින් යුත් පෙතිවලින් යුක්තවේ. පෙති එකිනෙකින් වෙන්ව පිහිටා තිබේ. මිලිමීටර 2.5 දිගය. මිලිමීටර 1.5 පළලය. ආයතය. මන්දතීව්‍රය. ප්‍රතීතය. සිහින්ය. ඇතුල්පැත්ත තැබිලි පාට වියර තුනකින් යුක්තය. මඩල මාංශ සහිතය. කොටස් 5 කින් යුක්තය. මල් පෙති මඩල කොටස් හා ඒකාන්තරව පිහිටා ඇත. 1.5 අතර ගණනක් ඇති රේණු මඩල කොටස් අතරින් ඇතුලට තෙරා ඇත. තැනගොත් මඩල කොටස් මත පිහිටා ඇත.

මින් එතැන් හෝ ඇතැම්විට දෙනත් සරුය. අනෙක්වා වදය : රේඡු , අගිත් සිහිත්ව හා නුඛා ඉන්ටියනින් යුතුව පිහිටා තිබේ. සුත්‍රිකාව සිහිත්ය. පරාගධාතිය දව්පාටය. පාදස්ථ හෝ පාර්ශ්වික ඩිව්ඛ වෘත්තයකින් පහළට එල්ලී ඇති ඩිව්ඛයක් සහිත ඩිව්ඛනෝෂය (ඉහළින්) පිහිටා තිබේ. එය ස්ථායිය. තෝෂ්ටිකය ඇළව පිහිටා ඇත. සිහිදුය. පැත්තතට බරවී ඇත. කලංකය සරලය. එලය විශාල, මාංශ අධික, රෙසිත් සහිත අෂ්ටිචලයකි. සෙන්ටිමීටර 7.5-20 දක්වා දිගුය. කෙඳි සහිත ඇටය එලයෙහි මසිත් තදවී ඒ මැද පිහිටා ඇත. බීජය විශාලය. නිර්භූෂපෝෂීය. අභුකාන ආයතය. සම්පීඩිතය. බීජාවරණය කඩදාසියක් වැනිය. එය වල උත්තල වූ හා බොහෝ විට අසමානව පිහිටි බෙදී ගියාවූ බීජ පත්‍ර සහිතය.

මල් - ඔක්තෝබර් මාසයේ
එල - අප්‍රේල් හා මැයි මාසවල

ව්‍යාප්තිය - ගිමාලය, සිත්තිවි, කාසියා, බටහිර සාවිස්, බුරුමය හා ලංකාව යන ප්‍රදේශවල මෙය දක්නට ලැබේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ හා නිවර්තන ඇමරිකාවේ වහා තරනු ලැබේ. ලංකාවේ දේශීය ශාකයක් නොවුවද, සෑම ගම්බද ගෙවත්තකම පාහේ වගාකරනු ලබන ශාකයක් බව පෙනේ.

සංයුතිය - මෙම ශාක පත්‍රවල ඉයුක්සැන්තොන් අම්ලය, ඉයුක්සැන්තොන්, ගිපියුරික් සහ බෙන්සොයික් අම්ල, මැංගිපෙරික් හා මැන්ගිත් අන්තර්ගතය.

පොත්තෙහි වැනිත් අන්තර්ගත වන අතර එහි නිර්සාසයෙන් රෙසිත් හා මැලියම් ලැබේ. මෙහි එල්වලින්ද රෙසිත් ලැබෙන අතර එම රෙසිත්වල මැංගිපෙරික්, මැංගිපෙරික් අම්ල, රෙසිනෝල් සහ මැනිපෙරෝල් අඩංගු බව නියතු ලැබේ. පරිභෝජනය සඳහා ගනු ලබන එල ඒ, බී සහ සී විටමින් , ඇස්නෝබින් අම්ල සහ කැරටින්වලට අමතරව සැකෝස්, ලෙවුලෝස්, ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් හා සිට්‍රික් , ටැටරික් සහ මාලික් අම්ල අඩංගුය. විටැමින් ඒ,බී,සී ඇස්නෝබින් අම්ල හා කැරොටින්ද අන්තර්ගතය. බීජවල ඔලියෝස්ටරික්, පිෂ්ටය, ගලින් අම්ලය සහ වැනිත් සහිත විශේෂ තෙල් වර්ගයක් අන්තර්ගතය.


ප්‍රයෝජන

රත්තාතීසාරය සඳහා මෙම ගසෙහි පත්‍රවල යුෂය දෙනු ලබන අතර ඇදුම , කැස්ස සහ පෙණහලුවල නිදත්ගත රෝග සඳහා මෙහි දුර් තැම්බූ වතුර තියම තරනු ලැබේ. පොත්ත තැම්බූ වතුර හෝ පොත්ත තලා ලබා ගත් යුෂය මෙතොහාදියා. ලියුකෝරියා, රත්ත-අර්භස් සහ පෙණහලු හා අන්ත්‍රවල ලේ ගැලීම් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට උපයෝගී කරගනු ලැබේ. අභ්‍යන්තරික ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලේ ගැලීම් සඳහා අඹ, සයිපිපියම් කුමිති සහ ටර්මිනාලියා අර්ජුන යන මේවායේ පොත්ත තැම්බූ වතුර තිටා වී පැණි සමග කට්ටම්කර දෙනු ලැබේ. වියලි මල්වලින් පිළියෙල කරගනු ලබන කසාය අතීසාරය, නිදත්ගත අතීසාරය හා "ග්ලිට්" සඳහා යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙනදේ.

This botanical illustration depicts a plant with large, ovate leaves featuring prominent, parallel veins and a serrated margin. The main drawing shows a branch with several such leaves and a terminal inflorescence with small flowers. Detailed insets include: a single flower (A), a longitudinal section of the ovary (B), a longitudinal section of the style and stigma (C), a cluster of stamens (D), a single stamen (E), a longitudinal section of the fruit (F), a cross-section of the fruit (G), and a longitudinal section of the seed (H). Scale bars are provided for the main branch and the fruit section.

41

Mangifera indica Linn. - ANACARDICAEAE



රූප සටහන - : A. පුෂ්ප සංයුක්ත ඒකාන්තය සහිත අන්තක්. B. තනි රේඛාවක්, ඩව්බ්බෝෂය සහ මැද රේඛා සහිත ද්විලිංගික පුෂ්පයක්. C. තනි රේඛාවක් සහ තුළ මැදරේඛා සහිත ප්‍රමංගි පුෂ්පයක්. D. ද්විලිංගික පුෂ්පයක සිරස් කඩක්. E. ඇතුළු පැත්තෙහි වියදි තුනක් සහිත පෙත්තක්. F. ඵලය G. බීජය

MEDICINAL PLANTS (Indegenous and Exotic) Used in Ceylon - Part I by D.M.A. JAYAWEEERA යන කෘතියෙන් උපුටාගත් ලිපියක පරිවර්තනයකි: