

වත්මන් යුද්ධ

සහ


පරිසරය

ආර්.එච්. වික්‍රමසිංහ

නිවර්තන පරිසර අධ්‍යයන ආයතනය

41, මල්පාර

කොළඹ 7.



යුද්ධය මිනිසුන් අතර නිරන්තරයෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව මෙම කාර්යය " සුපුරුදු පරිදි සිදුවන ව්‍යාපාරයක් " බවට පත්ව ඇත. 1945 සහ 1980 අතර කාල පරිච්ඡේදය තුළ සෑම මාස 3 කට වරක්ම කිසියම් ස්ථානයක එක් යුද්ධයක් බැගින් යුධ ආරම්භවී ඇති අතර මෙම කාලසීමාව තුළ සමස්ථයක් වශයෙන් ඇතිවූ යුධ-සංඛ්‍යාව 140 ක් පමණ වේ. මෙම යුද්ධ වලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තත්වන ලෝකයේ රටවල් 80 ක් පමණ සම්බන්ධවී ඇති අතර මිනිසුන් දශලක්ෂ 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් ඇත. (දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේදී මිය ගිය සංඛ්‍යාව දශ ලක්ෂ 50 කි) මිනිසා සෑම විටම කළහකාරී සත්වයෙකු වී ඇතැයි (පුරාවිද්‍යාත්මක සහ පොසිලමය සාක්ෂි අනුව) සිතිය හැකි වන අතර, නවීන ලෝකයේ යුධ අවි සහ හමුදමය සැලසුම් සත්‍ය වශයෙන්ම පරමාණයෙන් සහ සුක්ෂම භාවයෙන් අති භයානක වේ.

ගැටුම් හේතුකොටගෙන මිනිසාට ඇතිවන දුක්පීඩා සහ ආර්ථික ඵලවිපාක පිළිබඳව මිනිසුන් තුළ සැලකිය යුතු අවබෝධයක් ඇත. එහෙත් නිසි පරිදි වටහාගෙන නොමැත්තේ යුද්ධමය කටයුතු හේතුකොටගෙන පරිසරය කෙරෙහි ඇතිවන බලපෑමයි.

උද්ගරණ වශයෙන් 1991 ගල්ප් යුද්ධයෙන් එම ප්‍රදේශයේ වන ජීවීන්ට සිදුවූ තර්ජනය ඇතුළු පාරිසරික උපද්‍රව රාශියක් ඇතිවිය. (මෙම ප්‍රදේශයේ වන ජීවීන් අතර එතරම් ප්‍රකට නොවන චෙනත් සත්ව හා ශාක වර්ගයන්ට අමතරව අරාබියානු, ඔරික්ස්, තල්මසුන්, ඩුගොංඩුගොං, කොළ පැහැති කැස්බෑවන් සහ ඇතැම්විට දිගින් අඩි 6 කටත් වැඩි ටයිග්‍රිස් වර්ගයේ සෑමන් මසුන් ද වෙති.) ගිණි අවුලන ලද තෙල් ලීං වලින් නිකුත් වූ දුප්ක හැරුණු කොට හුදෙක් 25000 කට අධික යුධ ගුවන් යානා වර්ගයන්ගෙන් නැගුණු සෝපා මෙන්ම වන ජීවීන් කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් ඇති වන්නට ඇත. බෝම්බ දැමීමෙන් සිදුවූ හානි අතර, පළළ වූ ඩ්‍රාන්ස්ෆෙල්ෆර් වලින් PCB, (polychlorinated biphenyl) වර්ග නිකුත්වීමද පඵද වූ ශීතකරණ පද්ධති වලින් නිකුත්වූ CFC, (chlorofluorocarbons) වර්ග නිකුත්වීමද වෙයි. ගල්ප් යුද්ධයෙන් පැන නැගුනු පාරිසරික ගැටළු වශයෙන් සඳහන් කළ හැකි කරුණු අතර (1) දශ ලක්ෂයකට අධික සන්නද්ධ හමුදා පිරිසක් කාන්තාරයේ කඳවුරු ලා ගැනීමෙන් ඇතිවූ බලපෑම, (2) තෙල් බැරල් දශලක්ෂ 11 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉසිරීමෙන් ඇතිවූ බලපෑම, (3) මෙහෙයුම් න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරක දෙකක් විනාශ වීමෙන් ඇතිවූ බලපෑම සහ පුරා විද්‍යාත්මක වස්තූන්ගෙන් ගහණ ප්‍රදේශයක යුධ හටගැනීමෙන් ඇතිවූ බලපෑමද වෙයි.

පැරණි යුගෝස්ලෝවියාවෙහි දැනට සිදු වෙමින් පවතින ගැටුම හේතුකොටගෙන, මෙයට තරමක් වෙනස් පරිසරයක බලපෑම් පරාසයක් (උද්ගරණ දර ඉන්ධන සඳහා ගස් කපා හෙලීම) හට ගනිමින් පවතියි. එනමුදු මේ අවස්ථාවේදී නවීන යුධ සුදුසුකම් කටයුතු සහ තාක්ෂණයන්හි ඇතැම් අංග පිළිබඳව පොදු සමාලෝචනයක් කිරීම වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

සම්පත් උපයෝජනය

යුද්ධය සහ යුද්ධ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා සම්පත් උපයෝජනයට අදාළ කරුණු කීපයක් සලකා බැලීමෙන් අවදානම පිළිබඳ

සැලකිලිමත් වීමට ඇති හේතු සාධකයන්ගේ ප්‍රමාණය වටහාගත හැකිවනු ඇත.

යුද්ධ ආශ්‍රිත අරමුණු සඳහා සිදුවන සම්පත් අපතේ යැවීමේ මට්ටම කෙතරම් අධිකද යන්න, යුධ වියදම්වල ප්‍රමාණය සලකා බැලීමෙන් පෙනී යයි. 1981 වර්ෂයේදී පමණ ලොව පුරා යුධ කටයුතු සඳහා වූ වියදම ඇමරිකන් ඩොලර් 40000 සිට 550000 අතර ප්‍රමාණයක් (එනම් මිනිත්තුවකට ඇමරිකන් ඩොලර් දශලක්ෂයක් පමණ) විය යුතු අයත්මෙන්තු කර ඇත. 1981 පැවති ප්‍රවණතාව අනුව, උද්ධමනයද සැලකිල්ලට ගත් කල, වසර 2000 වන විට ලොව පුරා යුද්ධ වියදම වසරකට ඇමරිකන් ඩොලර් දශලක්ෂ දශලක්ෂයක් වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත. 1981 දී පමණ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් දශලක්ෂ 20,000 ටත් 30,000 ත් අතර යුධආයුධ වෙළඳමත් සිදුවූ අතර, ආයුධ සඳහා වැය වූ මුළු මුදල ඇමරිකන් ඩොලර් දශලක්ෂ 135000 ක් පමණ විය.

මිනිස් බලය පිළිබඳ සලකා බලන්නේ නම් යුද්ධයෙහි හා යුද්ධ ආශ්‍රිත කාර්යයන්හි නියැලී පිරිස්, සංඛ්‍යාවෙන් දශ ලක්ෂ 60 ක් වූ බැව් පැවසේ. මෙයට විද්‍යායින් 400,000 ක් එනම් ජීවත්ව සිටින විද්‍යා සංඛ්‍යාවෙන් 40% ක් ඇතුළත් වෙයි.

ලොව පුරා යුද්ධමය කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇති භූමි ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කිරීම අපහසුය. යොදාගෙන ඇති එක් මිණුම් දණ්ඩකට ඉඩම් භාවිතය යුද්ධ සේවයෙහි නියැලී එක් මිනිසෙකුට දළ වශයෙන් හෙක්ටෙයාර් 0.3 සිට හෙක්ටෙයාර් 5 කට අධික ප්‍රමාණයක් දක්වා විවිධ විය හැකිය. ලෝකයේ යුද්ධ කටයුතු සඳහා වැය වී ඇතැයි ගණන් බලා ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර් දශ ලක්ෂ 42 සිට දශ ලක්ෂ 174 දක්වා වෙයි.

බර යුධ වාහන ගමන් කිරීමෙන් සහ බෝම්බ පිපිරීම යනාදිය හේතුකොටගෙන ද භූමිය පිරිහීම සිදුවිය හැකිය. කිලෝ ග්‍රෑම් 250 ක බෝම්බයක් පිපිරීමෙන් අර්ධ වීර්කම්භය මීටර් 8 ක් සහ ගැඹුරින් මීටර් 4 ක පමණ වූ පඵද්දක් ඇතිවිය හැකිය. බෝම්බ වලින් සියයට 1 සිට 10 දක්වා පමණ ප්‍රමාණයක් නොපිපිරී තිබීමෙන් යුධ බිමෙහි හෝ පුහුණු පඵයේ හෝ අනාගතයේදී අනතුරු ඇතිවිය හැකිය. දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් පසු බිම් බෝම්බ 14,500,000 ක් පමණ ඉවත් කරන ලද බවද, ඉවත් කිරීමේ කටයුතු තව දුරටත් සිදු වෙමින් පැවති බවද එක් රාජ්‍යයක් විසින් සඳහන් කර ඇත.

යුධ සමයන්හිදී විවිධ කරුණු හේතුකොටගෙන ගස් ගොතික වශයෙන් ඉවත්වීම බොහෝ විට සිදුවිය හැකිය. දෙවැනි ලෝක යුද්ධ සමයේදී ප්‍රංශයේ (යුද්ධය ආශ්‍රිත ගිණි ඇවිලීම නිසා) වනාන්තර හෙක්ටෙයාර් 500,000 ක් පමණ හානියට පත්විය. තවද, දකුණු වියට්නාමයේ දී එක්සත් ජනපදය විසින් සුවිශාල මැක්ටර් (රෝම නගල්) 200 ක් පමණ භාවිතා කිරීමෙන් වනාන්තර හෙක්ටෙයාර් 325,000 ක පමණ ගස් ඉවත් කෙරිණ. පිපිරීම් වලින් විසිරුණු සුත්බුන් නිසා හානි සිදුවූ ගස් දිලිරියන්ට ගොදුරු වීමෙන් දිරාපත්වීම සිදු වෙයි. මෙසේ වනාන්තර ආවරණය තුරන් වීමෙන් පාංශු බාදනය හට ගනී.

ජායාරූප ගැනීමේ කටයුතු සඳහා රිදී භාවිතය යනාදී වශයෙන් යුද්ධමය කටයුතු සඳහා සැලකිය යුතු අමු ද්‍රව්‍ය භාවිතයක් සිදු

වේ. යුද්ධය සඳහා උපයෝජනය කර ගන්නා තෙල් ප්‍රමාණය සමස්ථ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ උපයෝජනය මෙන් දෙගුණයක් විය හැකිය.

තව්න සටන් ක්‍රම

සටන් කිරීමේ එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රම කිහිපයක් වන අතර, ඒ සෑම ක්‍රමයකින්ම පරිසරය කෙරෙහි ඇති වන්නේ කවර හෝ ආකාරයක අහිතකර බලපෑමකි.

පවතින ක්‍රම අතුරින් සම්ප්‍රදයික යුධ ක්‍රමයන්ගෙන් ඇතිවන බලපෑම පිළිබඳව මහජනයා තුළ සැහෙන අවබෝධයක් ඇත. වසර 10 ක පමණ කාලයක් තුළ දකුණු වියට්නාමයේදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් බෝම්බ සහ වෙනත් යුධ්‍යුර්ණ ද්‍රව්‍ය වෙන් දශ ලක්ෂ 14 ක් පමණ භාවිතා කළ බවද කලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වනාන්තරයෙන් වැසි පැවති හෙක්ටෙයාර් 100,000 ක භූමි ප්‍රමාණයක පැතිරී එමගින් වලවල් සෑදුන බවද සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් තව්න යුද්ධෝපක්‍රම හේතුකොටගෙන හට ගන්නා විනාශයෙහි පරිමාණය වටහාගත හැකිය. (ඇමරිකා එක්සත් ජනපද බලකායන්ට අදාළ සංඛ්‍යා ගෙනහැර දැක්වීමෙන් ඇගවෙන්නේ ඇතැම්විට යුධ වැදුණු සෙසු ජාතීන්ට අදාළ සංඛ්‍යා ලේඛන මහජනයාගේ දැන ගැනීම සඳහා ලබාගත නොහැකි බව විය හැකිය.)

රසායනික යුධකාරක, විවිධ ආකාරයේ වෙයි. පිරිස් විරෝධී කමක් මිනිසුන්ට එරෙහිව යොදා ගන්නා (antipersonnel) යුද්ධකාරකයන්ට 1 වන ලෝක යුද්ධයේදී ප්‍රයෝජනයට ගත් ආකාරයේ ආසනික් සංයෝග සහ මස්ටඩ් වායුව යනාදිය ඇතුළත් වෙයි. (මේවායින් සම පිළිස්සීම සිදුවන අතර ඇස් අන්ධවීමට ද ඉඩ ඇත) නූතන පිරිස් විරෝධී යුධකාරකයන්ට, සංවේදී උද්ධිපකද, ආධාරණයක, බිබ්ලි වායු රුධිරවායු, ස්නායු වායු සහ මාරාන්තික විෂ වර්ග ඇතුළත් වේ. පොලියිය විසින් රංචු ගැසෙන්නන් විසුරුවා හැරීම සඳහා යොදාගනු ලබන කදුළු ගැස් සහ CS ගැස් සංවේදී උද්ධිපක අතරට ගැනේ. බෙට්සුලින් නැමති විෂ වර්ගය මිලිග්‍රෑම් 0.013 දී මිනිසාට විෂ සහිත වේ යයි තක්සේරු කර ඇත. (මිලි ග්‍රෑම් 1000 -ග්‍රෑම් 1)

ශාක විරෝධී රසායන කාරක, (1) සතුරන්ට ආහාර සපයන හෝග වර්ග විනාශ කිරීමටත් (2) සැහවීම සඳහා ආවරණය ලබා දෙන වනාන්තරවල කොළ පත්‍රයන්ට භාවිතා වේ. මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය පසෙහි ක්ෂුද්‍රජීවීන්ටද, විෂ සහිත වේ.

දස වසරක් තුළදී දකුණු වියට්නාමයේ භාවිතා කරන ලද, ශාක විරෝධී කාරක වෙන් 90,000 ට 2, 4-D, 2, 4, 5-T (Picloram) ද අයත්වේ. බයොක්සින් නැමති රසායනික ද්‍රව්‍යය, 2, 4, 5-T වල ද්‍රව්‍ය කාරකයයි. එමගින් උත්පත්තියේදී ඇතිවන අඩුලහුඩුතා වලට මෙන්ම, අක්මාවෙහි පිළිකාද ඇතිවීමට තුඩුදිය හැකිය. පරික්ෂණයට භාජනයවී ඇති පිරිස් විරෝධී ජෛවීය සාධක අතර, බෘෂලොසිස්, චුලරෙමියා, කිව්ටුණ, කහ උණ, වෙනිසියුලින්, ඉක්ටයින්, එන්සපලයිටිස්, සහ ඇන්ත්‍රැක්ස් යන රෝගයන්ට තුඩුදෙන ව්‍යාධිකාරකයන් වෙති. ඇන්ත්‍රැක්ස් යනු යම් ප්‍රදේශයක් (උදාහරණ වශයෙන් ඉලක්ක කළ නගරයක්) දූෂණය කර එය දශකයකට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ පදිංචියට තත්වයට පත් කරවීමේ හැකියාව ඇති ද්‍රව්‍යයකි. ව්‍යාධිකාරක

විසුරුවා හැරීම සඳහා, ස්ප්‍රේ ක්‍රමයට ඉඩම, වෙඩි උණ්ඩ, මීසයිල සහ පොකුරු බෝම්බ වැනි විවිධ ක්‍රම පරික්ෂණයට භාජනය කර ඇත.

අධ්‍යයනයට භාජනයවී ඇති බෝග විරෝධී ජෛවීය කාරක අතර සහල්, අර්තාපල්, තක්කාලි, දුම්කොළ, බතල, සෝයා, බටරුව සහ කජු යන බෝගයන්ට එරෙහිව යොදාගත හැකි ජෛවීය කෘති වෙති. ජෛවීය කාරක ව්‍යාජන කරවීම සඳහා යොදාගත හැකි ක්‍රම අතර, සංක්‍රමණය වන කුරුල්ලන් භාවිතයද වෙයි. (තවත් යුධ ප්‍රකාශ කර නොමැති සතුරන් බෙලහින කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.)

පරිසරය වෙනස් කිරීම හෙවත් භූ භෞතවේදී ක්‍රම, යුධ සඳහා යොදාගත හැකි තවත් ක්‍රමයකි. ඉන්දුවිතයේ මාර්ග සහ සංක්තිවේදන ක්‍රම අවුල් කිරීම සඳහා කෘත්‍රීම වර්ෂාව හට ගැනීමේ ක්‍රම අත්හදා බලන ලදී.

න්‍යෂ්ටික යුද ගැටුම

අවසාන වශයෙන් හටගත හැකි පරිසරික සන්ත්‍රාසය න්‍යෂ්ටික යුද්ධය විය හැක. න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් කවර තැනක ඇති වුවද, ප්‍රධාන පෙළේ ගැටුමකින් බිහිවිය හැකි න්‍යෂ්ටික යුක්තූන් සහ පාරිසරික බලපෑම, ලෝක පරිමාණයෙන් සිදුවනු ඇති බැව් අපේක්ෂා කළ හැකිය.

යුද කටයුතු හේතුකොටගෙන
හෝ යුද කටයුතු පිළිබඳ බිය
හේතුකොටගෙන, විශාල
වශයෙන් මිනිස් සංක්‍රමණයන්
සිදු වෙන බව සැලකිල්ලට
ගත යුතුය. එසේ සංක්‍රමණය
වීමෙන්, විශේෂයෙන් සංක්‍රමණිකයන්
ලඟාවන ප්‍රදේශය කෙරෙහි තදබල
පීඩනයක් ඇතිවන බව
සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

එහෙත් තව්න යුද්ධෝපක්‍රම
ක්‍රියාත්මක කිරීමට එරෙහිව ගනු
ලබන එක් ආරක්ෂක මාර්ගයක්
වශයෙන් යුධ අවි සීමා කිරීමට
සහ ඒවා භාවිතයට
අනුකූලව ගිවිසුම් ඇති
කරනු ලැබේ. ඒවායේ සාර්ථකත්වය
බොහෝ විට රද පවතිනුයේ, ඊට
මහජනතාවගෙන් ලැබෙන
සහයෝගය මතය.



න්‍යෂ්ටික යුද්ධයෙන් හටගත හැකි ඇතැම් ප්‍රතිඵල, බොහෝ මූලික ප්‍රකාශන මගින් සහ සමුළු මගින් සාකච්ඡාවට භාජනය කර ඇත. 1945 අගෝස්තු වේදි නාගසාකිහිදී මියගිය දෙලක්ෂ විසිපන් දහසකට අධික ජනතාවගෙන් වැඩි පිරිස වාණිජමය වාහන වලින් සිටින ලදී. න්‍යෂ්ටික යුද්ධයකින් අපේක්ෂිත මධ්‍යම සහ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිඵල අනුව, වඩාත් වාසනාවන්ත වන්නේ, ප්‍රථම බෝම්බ පිපිරීමේදී මිය යන්නාවූ බව පෙනී යයි. තවත් බොහෝ දෙනා විකිරණය සහ විකිරණ ආශ්‍රිත රෝග හේතුකොටගෙන මිය යනු ඇත. සමාජය බිඳවැටීම නිසා, රෝගීන්ට සහ තුවාල ලද්දන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ආරෝග්‍යශාලා මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් තෙක් වැටී ඇත. සෞඛ්‍යාරක්ෂක සහ කැලිකසල, ඉවත් කිරීමේ සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා, රෝග වසංගත පැතිර යනු ඇත. වසර ගණනාවක් යන තෙක් මිලියන 30කට වඩා විකිරණයෙන් දූෂිත වනු ඇති අතර, වර්ෂාවද විකිරණශීලී වනු ඇත. පෘතුවි පෘෂ්ඨයේ විශාල ප්‍රදේශයන් දූෂිත වනු ඇත. දූෂිත වලාවන්ගෙන් ආවරණය වීමෙන් "න්‍යෂ්ටික සිසිර සෘතු" ඇති විය හැකිය. කෘෂි කර්මාන්තය සහ ධීවර කර්මාන්තය මගින් කෙරෙන ආහාර නිෂ්පාදනයට මෙන්ම ආහාර බෙදා හැරීමටද අහිතකර බලපෑම් ඇතිවනු ඇත. මිනිසුන් තුළ පිළිකා සහ (හෝ) වන්ධ්‍යතාවය හටගනු ඇති අතර, තවත් දශක ගණනාවකට අසංඛ්‍ය සංඛ්‍යාවක් ජාන මූලික ආබාධයන්ගෙන් යුක්තව උපත ලබනු ඇත.

ඉහත දක්වන ලද්දේ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයේ උපකල්පිත ප්‍රතිඵල කිහිපයකි. අද ලෝකයේ න්‍යෂ්ටික යුධ ආයුධ සංඛ්‍යාව පහසුවෙන්

දහසකට වැඩිවන අතර, ඒවා සතු විනාශකාරී ශක්තිය හිරෝෂිමාවෙහි භාවිතා කළ බෝම්බය මෙන් දශලක්ෂ තුන් කාලක් තරම් අධිකය. එක් B 52 බෝම්බ ප්‍රවාහනයක් මගින් මිනිසුන් මෙතෙක් කළ යුධ සහ සටන් සියල්ලෙහිදී භාවිතා කළ පුපුරුණු ද්‍රව්‍යවල ශක්තියට වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනය කළ හැකිය.

මහජන මතය සහ ගිවිසුම්

යුද කටයුතු හේතුකොටගෙන හෝ යුද කටයුතු පිළිබඳ බිය හේතුකොටගෙන, විශාල වශයෙන් මිනිස් සංක්‍රමණයන් සිදු වෙන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. එසේ සංක්‍රමණය වීමෙන්, විශේෂයෙන්ම සංක්‍රමණිකයන් ලබාදෙන ප්‍රදේශය කෙරෙහි තදබල පීඩනයක් ඇතිවන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

එහෙත් නවීන යුද්ධෝපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට එරෙහිව ගනු ලබන එක් ආරක්ෂක මාර්ගයක් වශයෙන් යුධ අවි සීමා කිරීමට සහ ඒවා භාවිතයට අනුකූලව ගිවිසුම් ඇති කරනු ලැබේ. ඒවායේ සාර්ථකත්වය බොහෝ විට රජ පවතිනුයේ, ඊට මහජනතාවගෙන් ලැබෙන සහයෝගය මතය. (මෙම ලිපිය 1985 සහ 1991 වර්ෂවල ඉරිදි ඔබ්සවර් පුවත් පතෙහි පළවූ කරුණු ආශ්‍රයෙන් සකස් වූවකි.

පුපුරුණ ද්‍රව්‍යයන්ගේ ඉතිහාසය, රසායනය සහ තාක්ෂණය

ඩබ්ලිව්.ඩී.පී.එස්. ගුණතිලක
රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර රස පරීක්ෂක
රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව
බොරිත්තන් වතුරාය
කොළඹ 7.

පිපිරීමක් සිදු වන්නේ කලින් සිරකොට තබන ලද ශක්තිය පරිසරය කෙරෙහි බලපාන අන්දමින් හදිසියේ නිදහස් කරනු ලැබීමෙනි. එය සැමවිටම සිදුවන්නේ සීමාවූ පරිමාවක් තුළින් අධික උෂ්ණත්වයක්ද, විශාල හඩක් හා දරුණු කම්පනයක් ද සමග වායු වර්ග සිඟුයෙන් නිකුත්වීම ආශ්‍රයෙනි. පිපිරීම්, මූලික ආකාර තුනක් වශයෙන් වර්ග කර දැක්විය හැකිය. එනම් යාන්ත්‍රික, රසායනික සහ පරමාණුක යනුවෙනි. සෙල්ලම් බැලුමක් පිපිරීම වැනි හානියකින් තොර සුළු පිපිරීම් සරල යාන්ත්‍රික පිපිරීම්ය. මෙබඳු පිපිරීම් වලට රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සම්බන්ධ නොවේ. ඉතිහාසයේ සඳහන් විශාලතම වාෂ්ප ස්පෝශ්ණය වන්නේ 1883 අගෝස්තු මස 27 වන දින හටගත් සුප්‍රකට ක්‍රැකටාම්(Krakatau) යමහල් පිපිරීමයි. ක්‍රැකටාම් යමහල විදරණය වී උණුසුම් ලෝදිය විශාල ස්කන්ධයක් මුහුදට නිකුත් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සාගර ජලය සහ සැතපුමක පමණ ප්‍රමාණයක් දරුණු ලෙස කෂණිකව වාෂ්පීකරණය වීමෙන් මෙය සිදු විය. මෙහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වූයේ මිනිස් ජීවිත 36,000 ක් පමණ විනාශ වී යාමයි. යාන්ත්‍රික පිපිරීමකින් සිදුවිය හැකි හානියේ ප්‍රමාණය මෙයින් මනාව පිළිබිඹු වෙයි. රසායනික පිපිරීම් යන නමින්ම ඇගවෙන පරිදි රසායනික පිපිරීම් සැම විටම රසායනික ප්‍රතික්‍රියා හා සම්බන්ධ වෙයි. මෙම ලිපියෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධාරණය කෙරෙනුයේ මෙකී ආකාරයේ පිපිරීම් කෙරෙහිය. ප්‍රකටවූත් බහුල වශයෙන් භාවිතා වන්නාවූත් පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය වන වෙඩි බෙහෙත්, ඩයිනමයිට්, ට්‍රයි නයිට්‍රෝ ටොලයින්, ජ්‍යෝස්ටික් පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය යනාදිය රසායනික පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය වෙති. පරමාණුවක න්‍යෂ්ටිය පැලීමෙන් හෝ ඇතැම් මූල ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරමාණුවල න්‍යෂ්ටීන් දැඩි බලයක් යටතේ එකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් පරමාණුවක පිපිරීමක් ප්‍රේරණය කළ හැකිය.

දෙවැනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයේදී ජපානය මත හෙලන ලද පරමාණු බෝම්බවල පිපිරීමේ ශක්තිය ට්‍රයි නයිට්‍රෝ ටොලයින් වෙන් 20,000 කට සම වී යැයි ගණන් බලන ලදී. එහෙත් එම බලශක්ති ප්‍රමාණය නිපදවීම සඳහා අවශ්‍ය වූයේ රාත්තල් 2.2 ක් පමණ බරැති විඛන්ධන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකි. තවද මෙබඳු පිපිරීම් වලින් දිගුකාලීන විකිරණ උපදව හට ගැන්වෙයි.

රසායනික පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය වලදී ඔක්සිකාරක සහ දහනීය ද්‍රව්‍ය, එකම අණුවක ඒකාබද්ධව හෝ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය වල මිශ්‍රණයක් වශයෙන් හෝ පවතියි. උදාහරණ වශයෙන් නයිට්‍රෝ ග්ලිසරීන් සහ ට්‍රයි නයිට්‍රෝ ටොලයින් කේවල රසායනික ද්‍රව්‍යවන අතර, වෙඩි බෙහෙත් යනු රසායනික ද්‍රව්‍යයන්ගේ මිශ්‍රණයකි.

සියළුම පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය ඒකාකාර නොවන අතර ඒවායේ ගුණාංග විවිධය. වෙඩි පතොරම් වල ධාවකයක් වශයෙන් භාවිතා වන පුපුරුණ ද්‍රව්‍යයක් ගල්වලල් හෝ ගල්පර කැඩීම සඳහා සාර්ථකව යොදාගත නොහැකිය. අනික් අතට ගල්වල වල් තුල භාවිතාවන ඩයිනමයිට් වැනි පුපුරුණ ද්‍රව්‍යයක් යෙදුවහොත් තුවක්කුවල බැරල සුණුවීසුණු වනු ඇත. පුපුරුණ ද්‍රව්‍යවල ගුණාංග සහ පිපිරවීමේ ක්‍රම අනුව ඒවා ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනක් වශයෙන් වර්ග කර දැක්විය හැකිය. එනම් ආරම්භක, පහත් සහ අධි පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය වශයෙනි. ආරම්භක පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය, පහසුවෙන් පිපිරවිය හැකි වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් ගිනි දැල්ලට, ගිණි පුළිඟු වලට, ගැස්සීමට, කම්පනයට හා සර්ෂනයට සංවේදීතාව දක්වයි. මේවායින් අත්‍යාවශ්‍යයෙන්ම විශාල වායු ප්‍රමාණයන් නිෂ්පාදනය නොවන අතර, ඒ නිසා මෙම වර්ගයේ ද්‍රව්‍ය යම් යම් දෑ පුපුරවා හැරීමේ කටයුතු සඳහා

එතරම් සුදුසු නොවේ. මර්කරිපුල්මිනේට් (Mercury Fulminate) ලෙඩ් ජ්‍යයිඩ් (Lead Azide) සහ ලෙඩ් ස්ටිප්නේට් (Lead styphnate) වැනි පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භක පුපුරන ද්‍රව්‍ය වශයෙන් සලකනු ලැබේ. පහත් පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ගිණි දැල් සහ ගිණි පුළිඟු වලට සංවේදීතාවය දක්වන අතර, ඒවා පරිහරණය වඩා ආරක්‍ෂාකාරී වෙයි. මෙම වර්ගයේ පිපිරීම් වලට සම්බන්ධවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව නම් දහනීය ද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් සමග සරල ලෙස දහනය වීමයි. සුලභවම භාවිතාවන පහත් පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය වන්නේ වෙඩි බෙහෙත්ය. පිපිරුම් කැටිති (blasting granules) වලද එම පිපිරුම් මිශ්‍රණයම අන්තර්ගත වන නමුදු තෙතමන අවශෝෂණය අවම කිරීමටත් බෝර සිදුරු පිරවීම පහසු කරලීමටත් ඒවාට මිනිරන් තවරනු ලැබේ. දැන් වෙඩි බෙහෙත් හෝ කළු වෙඩි බෙහෙත් (Black Powder) යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන වෙඩි බෙහෙත්, ප්‍රථමයෙන්ම භාවිතාවූ පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය වූ අතර එය මුලින්ම සොයා ගන්නා ලද්දේ 13 වන සියවසේදීය.


වෙඩි බෙහෙත් සෑදී ඇත්තේ පොටෑසියම් නයිට්‍රේට්, කාබන් සහ ගෙත්දහම් දළ වශයෙන් 75: 15: 10 අනුපාතයේ මිශ්‍රණයකිනි. මුළුමණින්ම වාතයෙන් තොර අවස්ථාවකදී වුව ගිණි දැල්ලක් හෝ පුළිඟුවක් මගින් එය වහා ජවලනය වෙයි. එහෙත් එය යමක් ඇතුළත තදින් සිරවී නොමැති නම් සාමාන්‍යයෙන් පුපුරා නොයයි. බෝර සිදුරක් හෝ යුධ ආයුධයක් බදු සීමිත අවකාශයක් තුළ ගිණි තැබූ විට පීඩනය වැඩිවීමෙන් දැවියාමේ වේගයද අධික අගයක් දක්වා ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දරුණු පිපිරීමක් හට ගනියි. එහිදී පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් ඔක්සිජන් සැපයුම් මාධ්‍ය වශයෙන් ක්‍රියා කරයි. වෙඩි බෙහෙත්වල ගිණි ප්‍රචාරණ වේගය තත්පරයට මීටර් 100 යක් පමණ වෙයි. වෙඩි බෙහෙත් පුපුරුණු විට, වායූන් සහ ශක්තිය සීඝ්‍රයෙන් නිකුත් කරමින් එය දහනීය ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය වෙයි. වෙඩි බෙහෙත් පිපිරීමෙන් බිහිවන අවසන් ද්‍රව්‍ය, පොටෑසියම් කාබනේට්,

පොටෑසියම් සල්ෆේට්, පොටෑසියම් සල්පයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් නිෂ්පාදන විය හැකියි. සියළුම පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය අතුරින් වඩාත්ම සෙමින් ක්‍රියාත්මක ද්‍රව්‍ය වන මෙහි තෙරපා හැරීමේ හා පෙරළා දැමීමේ හැකියාව තිසා එමගින් ද්‍රව්‍ය විශාල කොටස් වලට පිපිරී යයි. වෙඩි බෙහෙත්, ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා ඉතා ප්‍රබලව භාවිතා වන අතර, රනිකද්ද සඳහා අනුමැතිය ලත් පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණය ද මෙයයි. පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තයේදී මෙය තිරාපද වෙඩි තුල්වල මධ්‍යය ලෙසද ගිණි කෙළි කර්මාන්තයේදී අහස් රොකට් වල ධාවකයක් ලෙසද භාවිතා කරනු ලැබේ.

එසේ වුවද වෙළඳ පොළෙහි ඇති රනිකද්ද වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක, ඇලුමිනියම් කුඩු යෙදීම නිසා රිදී පැහැයකින් දිලෙන පෙනුමකින් යුත් මිශ්‍රණයක් අන්තර්ගත වන බව කණගාටුවෙන් වුවද පැවසීමට සිදුව ඇත. රනිකද්ද වල වෙනත් ද්‍රව්‍ය සමග ඇලුමිනියම් කුඩු මිශ්‍රකර ඇතුළත් කිරීමෙන්, වඩා විශාල හටක් නිකුත්වන නමුදු පීඩන වෙඩි බෙහෙත්වල සර්ෂණ සහ ගැටුම් සංවේදතාවය වැඩිමෙන් ඒවා අවදානම් සහිත වන බැවින් එසේ කිරීම පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ රෙගුලාසි, මගින් තහනම් කර තිබේ. මෙමගින් හදිසි පිපිරීම් වලටත්, පාලනය නොකළ හැකි ගිණිගැනීම් වලටත් මග පෑදේ.

තනි රසායනික අණුවක් තුළ ඔක්සිජන් සහ ඉන්ධන ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් වඩාත් සීඝ්‍ර ප්‍රතික්‍රියාවක් බිහි කළ හැකිය. මෙබඳු පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ, අධි පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය යනුවෙනි. මෙබඳු පිපිරීම් වලට සම්බන්ධ රසායනික ක්‍රියාවලිය දහනය නොවේ. එය හඳුන්වනු ලබන්නේ ප්‍රස්පෝශනය (Detonation) යනුවෙනි. සරල වශයෙන් මෙය " ක්ෂණික දහනය " යනුවෙන් නිර්වචනය කලත් මෙම ප්‍රස්පෝශන ක්‍රියාවලිය වඩාත්ම හොඳින් විග්‍රහ කළ හැක්කේ " අණු කුඩා කැබලි බවට විශෝජනය වන පරිදි, ස්පෝශන ද්‍රව්‍ය තුලින්, අධික පීඩනයකින් සහ උෂ්ණත්වයකින් යුත් හදිසි අධිබබ්ද (supersonic) තරංගයක් ගමන් කිරීම යනුවෙනි.

පසුව මෙම කැබලි තැවත ඒකාබද්ධ වීමෙන් අවසන් නිෂ්පාදක ද්‍රව්‍ය හට ගනියි. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය තත්පරයට මීටර් 8000 ක් පමණ වෙයි. මෙය අවට ඇති වායුවල පීඩනයෙන් නිදහස්ව සිදු වන්නක් බැවින් පිපිරීම සිදුවනු පිණිස මෙහිදී තදින් සිරකොට තිබීම අත්‍යවශ්‍යය නොවන්නේය. මෙබඳු පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය ප්‍රස්පෝශනය කෙරෙන විට ආසන්න වශයෙන් තත්පරයකින් 1/10,000 පංශුවක කාලයක් තුළදී ඉතා උණුසුම් ප්‍රසාරී වායු වර්ග හට ගැනේ. මෙම වායූන් මගින් ප්‍රස්පෝශන ස්ථානය අවට පරිසරයෙහි සාමාන්‍යයෙන් වර්ග අඟලකට වොන් 700 ක පමණ පීඩනයක් හට ගැනී අවට වායුව සමපීඩනය කරමින් තත්පරයට මීටර් 9000 ක් පමණ දක්වා ප්‍රවේගයකින් ඉවතට දිවයයි. ප්‍රසාරණය වන මෙම වායු ස්කන්ධය ප්‍රස්පෝශන කේන්ද්‍රයේ සිට වොන් ගණනාවක් බැරෑරුම් යෝධ රුල්ලක් මෙන් සිය ගමන් මගෙහි ඇති සියළුම ද්‍රව්‍ය සුණු විසුණු කරමින් ගෝලාකාර රටාවකට අනුව පිටතට පෙරළී යයි. සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝශන පීඩන තරංග (blast




පොති බෝම්බය

Pressure Wave) යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙය පිපිරීම සිදුවන ස්ථානයේ සිට ගමන් කරන දුර වැඩිවත්ම, එහි බලය කෙමෙන් අඩුවී බොහෝ දුරක් ගිය විට අවසානයේ ගුණ වන තෙක් හීනවී යයි. මෙබඳු පිපිරීමක් ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ශක්තියකින් යුත් අධ්‍යවේද (Supersonic) තරංගයක් අවශ්‍ය වන බැවින් එවැනිතක් ආරම්භණය පහසු නොවන බව දැන් පැහැදිලිය. මෙම අවශ්‍යතාව සැපිරීම සඳහා ගිණි දැල්ලක් හෝ විදුලි බලය මගින් ආරම්භ කළ හැකි ප්‍රස්පෝධකයක් (Detonator) නමින් හැඳින්වෙන කුඩා උපකරණයක් භාවිතාවේ. එතරම් සංවේදී නොවන අධි ප්‍රස්පෝධක ද්‍රව්‍ය පිපිරවීමේ හැකියාව එයට ඇත.


ලොව පුරා පිපුරුම් කටයුතු වල බහුල වශයෙන්ම භාවිතාවන වානිජමය අධි පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය වන ඩයිනමයිට් වර්ගයන්හි ප්‍රධාන සක්‍රීය කාරකය වන්නේ නයිට්‍රෝ ග්ලිසරීන්ය. ශුද්ධ නයිට්‍රෝ ග්ලිසරීන් යනු ආමන්ඩ වලට ආවේනික සුවඳ රැගත්, අවර්ණ හෝ ලා කහ පැහැය ගන්නාවූ ද්‍රව්‍යයකි. අසානියෝ සොබ්‍රෙරෝ (Ascanio Sobrero) නැමති ඉතාලි ජාතික රසායනඥයකු විසින් 18වන සියවසේදී නයිට්‍රෝග්ලිසරීන් සොයා ගන්නා ලදී. එහෙත් මෙම තෙල බෙහෙවින් පුපුරුණු සුළු වූ අතර එය පරිහරණය බෙහෙවින් අවදානම් සහිත විය. පහරක් වැදීමෙන් එය පුපුරා යා හැකි විය. 1863 වර්ෂයේ දී ස්විඩන් ජාතික රසායනඥයකු වූ ඇල්ෆ්‍රඩ් නොබෙල් විසින්, අතිශය සවිවර වූ පස් වර්ගයක් වන Kieselguhr මගින් පිළියම් කර නයිට්‍රෝ ග්ලිසරීන් පාලනය කර ඒවා කුරු වශයෙන් සවි ගැන්වීමෙන්, බලය යන අර්ථය ඇති ග්‍රීක වචනය ආශ්‍රයෙන් සකසා ගත් "ඩයිනමයිට්" යන වචනයෙන් හැඳින්වෙන ද්‍රව්‍යය තැනීය. එහෙත් අවාසනාවකට මෙන් මෙම කාල සීමාව තුල ඇල්ෆ්‍රඩ්ගේ රසායනාගාරය තුල ඇතිවූ හදිසි පිපිරීමක් නිසා, ඔහුගේ

සොහොයුරා මිය ගිය අතර පියා මාරාන්තික තුවාල ලැබීය. ඇල්ෆ්‍රඩ් නොබෙල් සිය ජීවිත කාලය මුළුල්ලේ කිසි විටෙකත්, තම සොයා ගැනීම මිනිසුන් මැරීම සඳහා යොදා ගැනීමට අදහස් නොකළ බව මගේ හැඟීමයි. මෙම ද්‍රව්‍ය දැන් අන්තවාදී කණ්ඩායම් විසින් මිනිස් ජීවිත වලට එරෙහිව බිම් බෝම්බ, උගුල් බෝම්බ (Booby traps), කාල බෝම්බ යනාදිය තැනීම සඳහා පුළුල් වශයෙන් භාවිතා කරනු ලැබේ. නයිට්‍රෝ ග්ලිසරීන් විෂ ශරීරගත වීමේදී සුලභවම දක්නට ලැබෙන රෝග ලක්ෂණය වන්නේ දැඩි හිස රදයයි.


එය පරිහරණය ආරම්භයේ දී දැනුනද කෙමෙන් මගහැරී යයි. පළුදු නොවූ සම තුලින් පවා එය අවශෝෂනය විය හැකි වන අතර, එමගින් අත්ලෙහි පැළුම් තුවාල හටගත හැකිය. එහෙත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවේශමෙන් යුතුව ඩයිනමයිට් පරිහරණය කිරීමේදී නයිට්‍රෝ ග්ලිසරීන් වලින් ඇති වන්නේ තාවකාලික අපහසුවකි. එයින් ශරීර සෞඛ්‍යයට බරපතල හානි සිදු නොවේ. කල්ගතවීමෙන් පරිහරණයට පත්වූ ඩයිනමයිට් පරිහරණයේදී එහි හදිසි ස්වයං ප්‍රස්පෝධනය වීමේ අවදානම අධික වන බව මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය. ට්‍රයිනයිට්‍රෝ ටොලයින් බහුලව භාවිතාවන යුධ පුපුරුණු ද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය අවර්ණ හෝ ලා කහ පැහැති සන ද්‍රව්‍යයකි. මේවා (monoclinic) ස්ථවික ස්වරූපයකින් පවතී. අත් බෝම්බද, අහසින් එවන බෝම්බද, නිෂ්පාදනයේදී මෙය ප්‍රධාන පුරවනය වශයෙන් පුළුල් ලෙස භාවිතා වෙයි. වැඩි වශයෙන්ම R.P.G. රොකට්ටු, යුධ වැංකි විනාශ කරන බෝම්බ ටෝපිඩෝ සහ ග්‍රෙනේඩ් බෝම්බ නිෂ්පාදනයේ දී යොදා ගන්නා 'composition B' නමින් හැඳින්වෙන ප්‍රයෝජනවත් අධි ප්‍රස්පෝධක ද්‍රව්‍ය නිපදවීමේදී මෙය භාවිතා කෙරේ. දිවයිනේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂක හමුදා වලට මහත් තර්ජනයක්ව ඇති "ජොනි" බෝම්බ



පිරිස් විරෝධී බෝම්බය



ඇඟුස් බෝම්බය



අධි සක්‍රීය ජෙලටිනිය පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය/ස්පෝංකය

තැනීමේදීද දේශීය වශයෙන් ට්‍රයිනයිට්‍රොටොලයික් යොදා ගනු ලැබේ. මෙය ස්ථායී පුපුරුණ ද්‍රව්‍යයක් වන නමුදු, එම ධූවිලි ආශ්වාස කිරීමෙන්, සමට අවශෝෂණය වීමෙන් හෝ පරිභෝජනය වීමෙන් තයිට්‍රො ටොලයික් වීශ දරුණු ලෙස ශරීරගත වීමෙන් කමලාව (Jaundice) කැරකිල්ල, ආහාර අරුචිය, වර්ම රෝග, සයනෝසියාව යනාදිය වැළඳිය හැකිය.

සුදු පැහැති ස්ඵටිකමය කුඩු වර්ගයක් වන සයික්ලෝ ට්‍රයි මෙතිලින් ට්‍රයි තයිට්‍රේට් සයිකලෝ ට්‍රයි මෙතිලින් ට්‍රයිනයිට්‍රේට් (RDX) අද භාවිතයේ පවතින වඩාත්ම ප්‍රබල අධි ස්පෝංක ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් එකකි. එයට ට්‍රයි තයිට්‍රො ටොලයික් වලට වඩා ද්‍රව්‍ය සුණු විසුණු කිරීමේ ශක්තිය ඇත. ජලාස්පික් ස්පෝංක ද්‍රව්‍ය සහ ජලාස්පික් තහඩු ස්පෝංක ද්‍රව්‍ය වල ප්‍රධාන සක්‍රීය කාරකය වන්නේ මෙයයි.

කෙසේ වුවද, පාඨකයින් විසින් කිසිවිටෙකත් පුපුරුණ ද්‍රව්‍ය හෝ අග්නි තාක්ෂණය (pyrotechnics) සම්බන්ධයෙන් කිසි විටෙකත් අත්හදා බැලීම් නොකළ යුතු බව මතක තබා ගැනීම අතිශයින් වැදගත්ය. මක්නිසාද යත් මෙහිදී අත්වැරදි වලට කිසිදු ඉඩක් තැබිය නොහැකි හෙයිනි. එමගින් හයාතක පිපිරීම්ද, පාලනය කළ නොහැකි දරුණු ගිණිගැනීම්ද හට ගැනීමට ඉඩ ඇත.



බෝම්බ පිපුරුමක ප්‍රතිඵල

ආහාරයට එක්වන විෂ - ඇලුමිනියම්

මනෝහරී සන්දනායක
සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ස්වාභාවික සම්පත් බලශක්ති හා විදු අධිකාරිය



දහනව වැනි ශත වර්ෂයේ අග භාගයේ සිට ලෝකයේ නොයෙකුත් රටවල භාවිතා වූ ඇලුමිනියම් ලෝහය මෑතක් වන තුරුම විෂ රහිත ලෝහයක් ලෙසින් සැලකුණි. එම හේතුව නිසාම, මෙම ලෝහයෙන් භාජන තනා, ආහාර සැකසීමේදී භාවිතා කෙරුණි. නමුත් විසිවන සියවසේ අගභාගය වන විට ඇලුමිනියම් භාවිතය නිසා මිනිස් සිරුරට ඇතිවන බලපෑම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමට සිදුවී ඇත.

කාර්මික ලෝකයට ඇලුමිනියම් හඳුන්වා දෙන ලද්දේ හෙන්රි සෙන්ක්ලෙයාර් ඩෙවිල් නැමැත්තාය. වසර සියයකට පමණ ප්‍රථම ඔහු මෙය හඳුන්වා දුන්නේ නිලව හුරු සුදු පැහැයක් ඇති, දිප්තිමත්, සැහැල්ලු, හැඩවූ විට මිහිරි නාදයක් දෙන ලෝහයක් ලෙසිනි. තවදුරටත් මෙම ලෝහය මිනිසාට අහිතකර නොවන, ගෘහස්ථ පාවිච්චිය සඳහා සුදුසු, තාපයට ඔරොත්තු දෙන ලෝහයක් බවට ඔහු විසින් පෙන්වා දෙන ලදී. පසු කාලයකදී ඇලුමිනියම්, ආහාර සැකසීම සඳහා යොදාගත හැකි සුදුසුම ලෝහය ලෙස පිළිගැනින. ඒ අනුව එතෙක් භාවිතයේ තිබූ තඹ, ටින් වැනි ලෝහ භාවිතයෙන් ඉවත් විය.

නමුත් මෑතකදී සොයාගත් පරිදි ඇලුමිනියම්, යම් ප්‍රමාණයකට, යම් යම් අවස්ථාවන්හිදී ආහාර සමග මුසුවේ. ඇලුමිනියම් ලෝහයෙන් තැනූ භාජන පරිසරයේ ඇති ඔක්සිජන් සමග එක්වී ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් සෑදේ. පරිසරයට නිරාවරණය කර තැබූ කළු ඇලුමිනියම් භාජනවල දිප්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වන්නේ එම හේතුවෙනි. මෙම ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ස්ථරය, ආරක්ෂක ස්ථරයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතරම, ආම්ලික හා කෂාරීය මාධ්‍යයන්ගේදී දියවීමට පටන් ගනී. එමෙන්ම ඇලුමිනියම් භාණ්ඩ පිරිසිදු කිරීමේදී සෝඩා වැනි කෂාර භාවිතා කර භාජන මැදීමෙන්, ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ස්ථරය පළලවී ලෝහය නිරාවරණය වේ. ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙතුල දමා පියනු ලැබූ විට ඇලුමිනියම් යම් ප්‍රමාණයක් ආහාර සමග මිශ්‍ර වේ යයි සිතිය හැක.

ආම්ලික ගුණ සහිත (ඇමුල් රසැති) ආහාර ද්‍රව්‍ය (ලදු: තක්කාලි, ගොරකා යෙදූ මාළු, විනාකිරි යෙදූ මස්) ඇලුමිනියම් භාජන වල දමා පිසීමත්, පලතුරු සුෂ ඇලුමිනියම් භාජන වල දමා තැබීමත්, කේක්, බිස්කට් වැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇලුමිනියම් තැටිවල දමා පුළුස්සා ගැනීමත් සෞඛ්‍යයට අහිතකර දෑ වේ. මේවා මගින් වැඩි ඇලුමිනියම් ප්‍රමාණයක් ශරීරගත වීමට ඉඩකඩ සැලසේ.

පෙරදී මදසාර කර්මාන්තයේදීද කිරිපිටි නිෂ්පාදනයේදීද, ඇලුමිනියම් ලෝහයෙන් තැනූ යන්ත්‍ර කොටස් හා භාජන භාවිතා කෙරුණි. මෙහිදී ඉතාමත් කණගාටුදායක තත්වය වූයේ ලදරු කිරිපිටි මගින් ඇලුමිනියම් සැහෙන ප්‍රමාණයක් ලදරුවන්ගේ ශරීර තුළට ඇතුළත් වීමය. දැනට රසායන විද්‍යායින් සොයා ගෙන ඇති ආකාරයට, එම කිරිපිටි ආහාරයට ගත් ලදරුවෙක් දිනකට ඇලුමිනියම් මයික්‍රොග්‍රෑම් 173-2285 දක්වා ප්‍රමාණයක් ශරීරය තුළට ගත් අතර, මෙම ප්‍රමාණය මව්කිරි පමණක් බොන ලදරුවකුගේ ශරීරයට දිනකට ඇතුළුවන ඇලුමිනියම් මයික්‍රොග්‍රෑම් 2-10 වැනි සුළු ප්‍රමාණය හා සසඳා බලන කල නොසලකා හැරිය නොහැකි විය. මෙසේ හේතු සාධක පෙන්වා දීම නිසා දැනට කිරිපිටි නිෂ්පාදනයේදී මෙන්ම වෙනත් ආහාර නිෂ්පාදනයන්හිදීද, ඇලුමිනියම් භාවිතය බොහෝ දුරට සීමා කර ඇත.

අම්ල වැසි පවතින රටවල, බොහෝ විට තළ ජලයේ ඇලුමිනියම් අන්තර්ගතව ඇති බවට වාර්තාවී ඇත. මෙහිදී ජලයේ pH අගය නිවැරදිව තබා ගැනීමට එම රටවල් තිබූද වෙතෙසේ.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිනිසෙකුගේ ශරීරයෙහි රුධිර ප්ලාස්මාවෙහි ලීටරයට මයික්‍රො ග්‍රෑම් 10 ක ඇලුමිනියම් ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ගත වේ. අප ගන්නා ආහාර සමග දිනකට අප ශරීරයට ඇතුළුවන ඇලුමිනියම් මිලි ග්‍රෑම් 4-8 ප්‍රමාණයකින් 75%-95% ප්‍රමාණයක් දිය නොවන ලවණ ආකාරයට අපවිත්‍ර දෑ සමග ශරීරයෙන් පිටවී යයි. නමුත් එයට අමතරව වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඇලුමිනියම් ශරීරගත වූ විට එමගින් මිනිස් සිරුරට විය හැකි හානි රාශියකි.

වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇලුමිනියම් සංයෝග ආන්ත්‍ර ඛින්නිය හරහා රුධිර සංසරණ පද්ධතියට අවතීර්ණය වී රුධිරය මගින් මොළය කරා ගමන් කොට මොළයේ තැන්පත් වේ. මෙය මානසික රෝග ඇතිවීමට හේතු වන බව විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දී ඇත.

එසේම ශරීරයේ පටක වටා ඇලුමිනියම් තැන්පත්වීම සිදුවේ. මෙය බහුලව සිදු වන්නේ රුධිරාණු වල, අස්ථිවල හා පෙනහළු වලය. මේ මගින් කල් යාමේදී රුධිරගත රෝග (රක්තහීනතාවය), අස්ථි රෝග (සන්ධි ඉදිමුම), හා පෙනහළු රෝග ද සෑදීමට ඉඩ ඇත.

මුත්‍රා මාර්ගයට එක්වන ඇලුමිනියම් මුත්‍රා පෙරීමේදී වකුගඩු වල රුදේ. මේ මගින් වකුගඩු ක්‍රියා විරහිත වීම කල් යාමේදී සිදු වේ.

ඇලුමිනියම්, ආහාර හා මිශ්‍රව ශරීරගත වීමෙන්, අන්ත්‍රයේ තුවාල හටගැනීමටද ඉඩ ඇත.

මෙකී නොකී සියළුම අනතුරු වලින් වැළකී සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක පැවැත්ම සඳහා ඇලුමිනියම් ලෝහය අපගේ ජීවිත වලින් දුරස් කළ යුතු බව අවධාරණයෙන්ම කිව යුතුව ඇත.

පෙරදී මදසාර කර්මාන්තයේදීද

කිරිපිටි නිෂ්පාදනයේදීද, ඇලුමිනියම්

ලෝහයෙන් තැනූ යන්ත්‍ර කොටස් හා

භාජන භාවිතා කෙරුණි. මෙහිදී

ඉතාමත් කණගාටුදායක තත්වය වූයේ

ලදරු කිරිපිටි මගින් ඇලුමිනියම් සැහෙන

ප්‍රමාණයක් ලදරුවන්ගේ ශරීර තුළට

ඇතුළත් වීමය.

මියෝන් ස්ථර පෘතුවි ග්‍රහයා

ඔස්මන්ඩ් ජයරත්න
ගෞතික විද්‍යාඥයා
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

අප පෘතුවියේ මනුෂ්‍ය වාසය පවතින කලාපවල, ඉතිහාසයේ මෙතෙක් කවරදවත් නොවූ විරූ තරම් ආරවුල් සහගත හා කලබලකාරී තත්වයක් පවතී. ඒ අතරම ස්වභාව ධර්මයද ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්වල හේතුවෙන්, මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පමණක් නොව පෘතුවියේ සියළුම ජීවී වර්ගයන්ගේ විනාශයට තුඩු දෙන අන්දමින්, අයහපත් බලපෑමක් ඇති කොට තිබෙන වගක් පෙනෙන්නට තිබේ. මෙම බලපෑම් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ (1) පෘතුවිය රත්වීමට තුඩු දෙන ආලෝකාගාර බලපෑම (2) පෘතුවිය වටා ඇති මියෝන් පටලය යම් යම් ජීවී වර්ග තුරන් වී යාමටත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයට තවදුරටත් ව්‍යාප්තයක් අත් කිරීමටත් හේතුවන අන්දමින් පරිහානියට පත්වීම හා (3) අපේ කාලගුණ රටාවන් දැඩි ලෙස වෙනස් කරන්නාවූ 1992 මුල් භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවූ එතෙක් නොවූ විරූ අන්දමේ නියඟයේදී අප අත්දුටුවාවූද 'එල්නිනෝ' නැමති කිසියම් නියමිත කාලයකට වරක් බැගින් හට ගැනෙන තත්වයන්ය. මේ තත්වයන්ගෙන් පළමු වැන්නට හා දෙවැන්නට එක්තරා දුරකට හේතු වන්නේ අනවබෝධයයි. අනෙක් හේතුව වන්නේ ලාභ ලැබීමේ තෘෂ්ණාවයි. යටකි බලපෑම් මූලිකව කෘත්‍රීම වන්දිකාවන් මගින් හඳුනා ගැනීම වැදගත්ය.

මිනිසා විසින් ගත වර්ෂ ගණනාවක් තුළ දියුණු කරන ලද විද්‍යාව හා තාක්ෂණය අතිශයේදී සිහිනෙන්වත් නොසිතූ විරූ තරමට මිනිස් ශිෂ්ටාචාරය දියුණුවට පත් කොට ඇති අන්දම අදහා ගත්තටත් බැරී තරමිය. එතෙකුදු වුවත්, මිනිසාට සෙත සලසන එම විද්‍යාව හා තාක්ෂණයම මිනිසාට එරෙහිව පෘතුවි ග්‍රහයා තුළ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ හුදු පැවැත්මට පවා තර්ජනයක් එල්ල කොට තිබේ.

පෘතුවියේ වායුගෝලය කල්ප ගණනාවක පරිණාමයෙන් අද අතිශය සංකීර්ණ තත්වයකට පත්ව තිබේ. පෘතුවිය මතුපිට සිට කි.මී. 70 ක් පමණ ඉහළට විශාල වශයෙන් නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් වායු වලින් සමන්විත ප්‍රොපෝස්තරය තිබේ. එම වායු, පෘතුවිය මත ජීවීන්ගේ පරිණාමය හා පැවැත්ම ආරක්ෂා වන අන්දමින් සමබරව පවතී. ඉහළට යත්ම ප්‍රොපෝස්තරයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මෙයට ඉහළින් ඇත්තේ අප ඉහළට යත්ම උෂ්ණත්වය වැඩිවීමට පටන් ගන්නා ඝනත්වය අඩු කලාපයක් වන ස්ට්‍රැටෝස්පරයයි. කි.මී. 150-300 ට අතර අයනෝ ස්ථරය නමින් හැඳින්වෙන ස්ථරයම ආරෝපිත පටල මාලාවක් ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ සිට බ්‍රහාන්‍ය ගුවන් විදුලි සේවය 'අල්ලා ගැනීමට' අපට හැකි වන්නේ අයනෝ ස්ථරය හා පෘතුවිය අතර රේඩියෝ තරංගවල පරාවර්තනය හා ප්‍රතිපරාවර්තනය නිසාය.

මෙහිදී අපට වැදගත් වන්නේ පෘතුවියෙන් කි.මී. 70-100 ක් ඉහළින් ඇති වායු (මියෝන්) ස්ථරය පටලයයි. මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ මියෝන් ස්ථරය නමිනි. මියෝන් යනු කුමක්ද? එහි සංයුතිය කුමක්ද? මියෝන් ස්ථරය ඉටු කරන්නේ කවර කාර්යයක්ද? දර්ශනිකයන්ගේ අදහස් කෙබඳු වුවත්, ස්වභාව ධර්මය සාමාන්‍යයෙන් සිය ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන්නේ අරමුණක් සහිතවය. උප අණු ක්ෂේත්‍රය දක්වා නොගිය කල, ද්‍රව්‍ය සෑදී ඇත්තේ අණු වලින් බව අපි දනිමු. ස්වභාව ධර්මයේ සෑම මූල ධාතුවකම ඒ එකිනෙකට ආවේණික පරමාණු ව්‍යුහයක් ඇති අතර රසායනික වශයෙන් ඒවා එකිනෙකට වෙනස් සංකේත මගින් විස්තර කරනු ලැබේ. උදාහරණ වශයෙන් ඔක්සිජන් - O, හයිඩ්‍රජන් - H, නයිට්‍රජන් - N, ෆ්ලෝරීන් - F, යනාදී වශයෙනි. මේ පරමාණු සත්‍ය වශයෙන් තනි තනිව හෝ අණු සෑදෙන ආකාරයට සංයෝගවී හෝ පවතී.

උදාහරණ: ඔක්සිජන්-O₂ (ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක්) නයිට්‍රජන් - N₂ හයිඩ්‍රජන් - H₂ ක්ලෝරීන් - Cl යනාදී වශයෙනි. නිදසුන් වශයෙන් අපේ ප්‍රොපෝස්තරයෙහි නයිට්‍රජන් N₂ ලෙසද ඔක්සිජන් O₂ ලෙසද පවතී. බොහෝ අවස්ථා වලදී O₂ ස්වකීය අංශෝපාංගමය පරමාණු වලින් වෙනස්වන ගති ලක්ෂණ සහිත සංකීර්ණ අණු සෑදීම සඳහා පරමාණු වැඩි සංඛ්‍යාවක් එකට සංයෝග වීම ද සිදු වේ. නිදසුන් : කාබන්ඩයොක්සයිඩ් - CO₂, සාමාන්‍ය ලුණු - NaCl.

සූර්යයා - අනෙක් තරු මෙන්ම, එහෙත් තමා වටා ග්‍රහණය වන ග්‍රහලෝක නවයට වෙනස්වීම - ස්වකීයමය වූ විකිරණ රශ්මිය, ආලෝකය හා කුඩාම තරංග ආයාම හා දීර්ඝම තරංග (රේඩියෝ තරංග) දක්වා වූ වෙනත් විවිධ විකිරණයන් නිෂ්පාදනය කරයි. මිනිස් ඇසට දිස් වන්නේ සූර්යයාගෙන් පිටවන ආලෝකයෙන් අංශු මාත්‍රයක් පමණි. මෙම අද්‍යක්ෂමාන විකිරණ අතර තරංග ආයාමය නැ.මී. 200 සිට නැ.මී. 400 දක්වා (නැ.මී. නැනෝ මීටර්: නැ.මී. 1:10⁹ - බිත්දිවෙන් 1/9) වෙනස් වන පාර ජම්බුල කිරණද වේ. ශාක ජීවීන් පෘතුවිය මත ඇතිවූ පසු වායු ගෝලයේ ජීව්‍ය අංගයක් වන ඔක්සිජන් O₂ වල වැදගත් කම අවබෝධ විය.

O₂ හා, සූර්යයාගෙන් නික්මෙන පාරජම්බුල ආලෝකය අතර ප්‍රතික්‍රියා ඇති කිරීමට සුදුසුවන ඔක්සිජන් ඝනත්වය ඇති උසකදී එම ප්‍රතික්‍රියා හට ගැනීමෙන් O₃ (ඔක්සිජන්) මියෝන් (O₃) බවට පත් වේ. මියෝන් ස්ථරය නමින් හැඳින්වෙන ස්ථර පටලය නිර්මාණය වන්නේ මේ ආකාරයටය. එකිනෙකට විරුද්ධ ක්‍රියාවලීන් ස්වභාව ධර්මයා හමුවේ සහ - ජීවනයෙන්

පරිහානිය නිසා අනතුරේ

මිනිසා විසින් ශත වර්ෂ ගණනාවක්
තුල දියුණු කරන ලද විදුලි හා
තාක්ෂණය අතිතයේදී සිහිනෙන්වත්
නොසිතූ විරූ තරමට මිනිස්
ශිෂ්ටාචාරය දියුණුවට පත් කොට ඇති
අත්දැම අදහා ගත්තටත් බැරී
තරමය. එතෙකුදු වුවත්, මිනිසාට
සෞඛ්‍ය සලසන එම විදුලි හා
තාක්ෂණයම මිනිසාට එරෙහිව පෘතුරි
ග්‍රහයා තුල මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ හුදු
පැවැත්මට පවා තර්ජනයක්
එල්ල කොට තිබේ.

සුක්තවීමේ ප්‍රවණතාවක් තිබේ. ඔසෝන් ස්ථරය පවා නිර්මාණය
වී ඇත්තේ සූර්යයාගේ විකිරණයන්ගෙන් නිසා සූර්යයාගේ
ප්‍රමාණයට වැඩි පාර ජම්බුල කිරණ අවශෝෂණය කිරීමේ
හැකියාවක් එයට තිබේ. පාර ජම්බුල කිරණ ප්‍රමාණයට වඩා
වැඩිවීම මනුෂ්‍ය ජීවිතය ඇතුළු ජීවින්ද්‍රියයන්ට අහිතකර
බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඉඩ තිබේ. සූර්යයාගෙන් පිටවන පාර
ජම්බුල විකිරණ හා ඔසෝන් ස්ථරය අතර මනා සමබරතාවක්
පැවතුණි. මේ නිසා පෘතුවියට ලඟාවීමට අවකාශ ලැබුණේ
පාර ජම්බුල කිරණ වලින් අවම ප්‍රමාණයකට පමණි. මෙම
ප්‍රමාණය ඇතැම් අවස්ථා වලදී මනුෂ්‍ය හා අනෙකුත් ජීවින්ද්‍රියයන්
කෙරෙහි සෞඛ්‍යාදයක ස්වභාවයෙන් පැවතුණි. එවැනි මනා
සමබරතාවන් - භෞතික වශයෙන් මෙන්ම රසායනික
වශයෙන්ද-ස්වභාව ධර්මයට පොදු දේවල්ය. ඇත්ත වශයෙන්ම
සූර්යයාගෙන් නික්මෙන ප්‍රමාණයට වැඩි පාර ජම්බුල කිරණ
පෘතුවියට වැඩිම වලක්වන ඵලදායී කුඩයක් ලෙස ඔසෝන්
ස්ථරය කටයුතු කරයි.

සූර්යයාගෙන් පිටවන පාර ජම්බුල කිරණ ඒවායේ තරංග
ආයාම අනුව දළ වශයෙන් වර්ග තුනකට බෙදිය හැකිය.
ඔසෝන් ස්ථරය විසින් අවශෝෂණය කර ගන්නා ප්‍රමාණය ඒ
ඒ කිරණ වර්ගය අනුව වෙනස් වේ.

වර්ගය	තරංග දිග ප්‍රමාණය	ඔසෝන් ස්ථරය විසින් අවශෝෂණය කරගැනීම
UV-C	නැ.මි.200-290	සම්පූර්ණයෙන් අවශෝෂණය කරගනී.
UV-B	නැ.මි.290-320	කොටස් වශයෙන් අවශෝෂණය කරගනී.
UV-A	නැ.මි.320-400	අවශෝෂණය කර නොගනී.

මේ ආකාරයට, දැනට UV-C කිරණ වර්ගය පෘතුවිය මත
පිවිත්ත තර්ජනයක් එල්ල නොකරයි. මේ වූ කලී, වසර කෝටි
කිහිපයක සිට පැවති ස්වාභාවික තත්ත්වයයි.

තාක්ෂණය හා කාර්මීකරණය සිසුයෙන් දියුණු වත්ම
විවිධාකාර, ක්ලෝරින් - මූලික සංයෝග රාශියක් වායුගෝලයට
ක්‍රමයෙන් පිට කෙරෙන පෙණ, ද්‍රාවක, (කෘමි නාශක, වල්
නාශක ආදී) ඉසින ද්‍රව්‍ය ශීතකරණ කිරීම් වායු සමන්විත කිරීමේ
යන්ත්‍ර ප්‍රයෝජනයට ගැනීම් ආරම්භ විය. මේවා වසර
ගණනාවක් තුළදී ඔසෝන් ස්ථරයට විනාශකාරී බලපෑම් ඇති
කරමින් ස්ට්‍රැටෝ ස්ථරයේ මට්ටමට ඉහළ නැග ඇත.
CFC's (ක්ලෝරෝෆ්ලෝරොකාබන්) නමින් දන්නා මෙම
පිට කිරීම් වැඩිවී ඇති අත්දැම මතු දැක්වේ. (UNEP හා UNDP
සමග එක්ව ලෝක මූල සම්පත් ආයතනය විසින් පළ කරන
ලද "වර්ල්ඩ් රිසෝසස්" ප්‍රකාශනය)

ක්ලෝරෝෆ්ලෝරොකාබන් (CFC's) මත ක්‍රියාකරන පාර
ජම්බුල විකිරණයෙන් සිදුවන ඔසෝන් පරිහානි ක්‍රියා පිළිවෙල

- C : කාබන් පරමාණු
- Cl : ක්ලෝරීන් පරමාණු
- F : ෆ්ලෝරීන් පරමාණු.

CF අනු ස්ට්‍රැටෝ ස්ථරයට ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ. ස්ට්‍රැටෝ
ස්ථරයේ දී CFC අණු වලින් ක්ලෝරීන් පරමාණු හේදනය
කිරීමට ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් සූර්යයාගෙන් ලැබෙන පාර
ජම්බුල විකිරණයට තිබේ. නිදහස් ක්ලෝරීන් පරමාණුව

මියෝන් අණුවකට පහර දෙයි. ඔක්සිජන් පරමාණුවක් හේදනය වී ක්ලෝරීන් වලට සම්බන්ධ වී ක්ලෝරීන් මොනොක්සයිඩ් සාදයි. මියෝන් අණුවේ ඉතිරි කොටස සාමාන්‍ය ඔක්සිජන් අණුවක් ලෙස පවතී. කෙසේ වුවත් ක්ලෝරීන් මොනොක්සයිඩ් ස්ථායී නැත. එහි ඇති ඔක්සිජන් වෙනත් ඔක්සිජන් පරමාණුවක් මගින් සොරා ගත හැකි වන අතර එවිට ඉතිරිවන ක්ලෝරීන් පරමාණුව වෙනත් මියෝන් අණුවක් පසුපස යෑමේ හැකියාව ඇත. සෑම ක්ලෝරීන් පරමාණුවකටම මියෝන් අණු 1.00.000 ක් දක්වා විනාශ කළ හැකිය. (UNEP ලිපියක් ප්‍රති නිශ්පාදනයක් ලෙස 1992 මැයි 14 දින 'ද අයිලන්ඩ්' පුවත් පතේ විදු පිටුවේ පලවූ ලිපියෙන් ගන්නා ලදී.)

කෘත්‍රීම වන්දිකා මගින් කරන ලද නිර්ඝන වලින් මියෝන් ස්ථරයේ ප්‍රචතතා පිළිබඳ අපේ දැනීම සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වී තිබේ. ඇන්ටාක්ටිකාවේ වර්ග කි.මී. මිලියන 28 ක ප්‍රදේශයකට දළ වශයෙන් දකුණු ඇමරිකාවේ විශාලත්වයට සමාන ප්‍රදේශයකට ඉහළින් මියෝන් ස්ථරයේ "සිදුරක්" (ඇත්ත වශයෙන්ම සැලකිය යුතු තුනීම්) ඇතිවී තිබෙන බව වසර කීපයකට කලින් කරන ලද අධ්‍යයනයන්ගෙන් අනාවරණය විය. මෑතදී ආරක්ෂිතවට උඩින් මියෝන් ස්ථරයේ ද තවත් සිදුරක් සොයාගෙන තිබේ. මියෝන් ස්ථරයේ පරිහානිය ගින සෘතු ව හා වසන්ත/ගිම්හාන සෘතුව යන දෙකේදීම උත්තර හා දකුණු භ්‍රමණයන්ගේදී ඉහළ හා මධ්‍යම අක්ෂාංශවලදී සිදුවේ.

ට්‍රිලියනයකට කොටස් (ට්‍රිලියනය - 10¹² හෝ මිලියන මිලියනයකි)

වර්ෂය පූර්ව කාර්මික	CCl ₄	CH ₃ CCl ₃	CCl ₃ F (CFC 11)	CCl ₂ F ₂ (DFC 12)	CHClF ₂ (CFC 22)	C ₂ Cl ₃ F ₃ (CFC 113)	මුළු වායුමය ක්ලෝරීන්
	0	0	0	0	0	0	0
1959	315.8	x	x	x	x	x	x
1960	316.8	x	x	x	x	x	x
1961	317.5	x	x	x	x	x	x
1962	318.3	x	x	x	x	x	x
1963	318.8	x	x	x	x	x	x
1964	x	x	x	x	x	x	x
1965	319.9	x	x	x	x	x	x
1966	321.2	x	x	x	x	x	x
1967	322.0	x	x	x	x	x	x
1968	322.8	x	x	x	x	x	x
1969	323.9	x	x	x	x	x	x
1970	325.3	x	x	x	x	x	x
1971	326.2	x	x	x	x	x	x
1972	327.3	x	x	x	x	x	x
1973	329.5	x	x	x	x	x	x
1974	330.1	x	x	x	x	x	x
1975	331.0	104	120	200	x	x	1,202
1976	332.0	106	133	217	x	x	1,290
1977	333.7	115	148	239	x	x	1,416
1978	335.3	123	159	266	x	x	1,544
1979	336.7	116	167	283	46	x	1,621
1980	338.5	121	179	307	52	x	1,755
1981	398.8	122	185	315	59	x	1,797
1982	341.0	121	193	330	64	x	1,863
1983	342.6	126	205	350	71	24	1,983
1984	344.3	130	213	366	76	27	2,072
1985	345.7	130	223	384	85	31	2,163
1986	347.0	127	232	404	98	35	x
1987	348.7	133	247	421	105	41	x
1988	351.3	133	263	439	x	52	x

(x - ලැබී නැත)

උත්තරාර්ධ ගෝලයට ඉහළින් ඇති ඕසෝන ප්‍රමාණය 1969 හා 1986 අතරතුර සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටුණු බව NASA විමර්ශන වලින් පැහැදිලි වෙයි. මේ සමාන වෙනස්කම් දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයේද සිදු වන්නට ඇති නමුත් ලැබී ඇති දත්තයන් කිසියම් විශ්වාස කටයුතු විශ්ලේෂනයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

උත්තරාර්ධ ගෝලය පිළිබඳ NASA සංඛ්‍යාවන් මතු දැක්වෙන පරිදි වේ.

ඕසෝන් පටලයේ පරිහානිය (1969-1986)

අක්ෂාංශ	ශීත සෘතුවේ වෙනස	ගිම්හාන සෘතුවේ වෙනස
53°-64°	6.2%	+0.4%
40°-52°	4.7%	-2.1%
30°-39°	2.3%	-1.9%

WMO (ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානයේ) මහලේකම් ජී.මී.පී. ඔබායි, "පසුගිය අවුරුදු පහෙන් හතරක් තුළ, ඇත්වාක්ටිකාවට ඉහළින් ඇති ඕසෝන සිදුරු කවරදවත් නිරීක්ෂණය නොවූණු තරමට ගැඹුරුවත් විශාලත්වත් තිබෙන බව" පෙන්වා දෙයි.

"නැගෙනහිර කැනඩාවට හා උතුරු නව එංගලන්තයට ඉහළින් ආරක්ෂිත වායුවේ අඩංගු ක්ලෝරීන් ප්‍රමාණය ආරක්ෂිතවේ හෝ ඇත්වාක්ටිකාවේ මීට කලින් කවරදවත් නොදුටු තරමට වැඩි බව ඉතා මෑතකදී කරන ලද සොයා ගැනීම් වලින් පිළිබිඹු වේ".

රටවල් 28 ක විද්‍යායන් 100 ක් පමණ දෙනකු විසින් පිළියෙල කරන ලද WMO හා UNEP විසින් සම්බන්ධීකරණය කෙරුණු විද්‍යාත්මක තක්සේරු වාර්ෂාවකට අනුව ඕසෝන පටලය බලාපොරොත්තු නොවූ තරමේ වේගයකින් විනාශ වෙමින් පවතී.

"උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාවේ හා ආසියාවේ විශාල කොටසක්, සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ යුරෝපය, ඕස්ට්‍රේලියාව හා නවසීලන්තය දැනට පරිහානියට හසුව පවතී. (ඇත්ත වශයෙන්ම දැනට) බලපෑමට හසුව නැති එකම ප්‍රදේශ නම් නිවර්තන ප්‍රදේශයන්ය".

ප්‍රමාණයට වැඩි පාර ජම්බුල විකිරණය හේතු කොටගෙන පෘතුවිය මත වූ ජීවී වර්ගයන් කෙරෙහි ඇතිවන අයහපත් ප්‍රතිඵල කවරේද? ප්‍රධාන කාරකය අප විසින් කලින් පෙන්වා දී ඇති පරිදි UV-B ය. මෙය මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙත කරන තරකම බලපෑම නම් මාරක නොවන වර්ම පිළිකා හා මාරක වර්ම පිළිකා ඇති කිරීමය. අඩුවන ඕසෝන සෑම 1% ක ප්‍රමාණයකට මාරක නොවන වර්ම පිළිකා 3% කින් වැඩිවන බව ගණන් බලා ඇත. සුදු සම සහිත අය හිරු එළියට දීර්ග

කාලයක් විවෘතව සිටීම නිසා මාරක නොවන වර්ම පිළිකා වැඩි වශයෙන් හට ගැනීමට ඉඩ තිබේ. අභ්‍යායකට මෙන් නිවර්තන නිකේතන වල සංචාරය කරන සුදු සම සහිත සංචාරකයෝ නිරතුරුවම සූර්ය රශ්මිය ස්නානය කරන අතරම විශේෂයෙන්ම දුඹුරු පැහැය ලබා ගැනීම සඳහා පාර ජම්බුල විකිරණයට විවෘතව සිටිති.

වර්තමාන තක්සේරු වලට අනුව 1970 ගණන් වල මැද භාගය හා සසඳන කල ක්‍රි.ව. 2000 වර්ෂය වන විට, ගිම්හාන සෘතුවේදී මධ්‍ය අක්ෂාංශක වල 5% සිට 10% දක්වා වූ

එක්සත් ජනපදයේ මාරක වර්ම

පිළිකා ප්‍රමාණය වර්ෂයකට

7800 කට පමණ කිට්ටුවෙන්

අඩුවැඩි වේ. පසුගිය වසර 35 ක

කාලය තුල මෙයින් වන සංඛ්‍යාව

200% කින් වැඩිවී තිබේ.

ඕසෝන පරිහානියක් පෙන්නුම් කෙරේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ පාරිසරික වැඩසටහනේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය මොස්තාපා කේ. නොල්බාටා අනුව, ඕසෝන 10% ක් නැතිවීම දිගටම සිදුවුවහොත් මාරක නොවන (Non-melanoma) වර්ම පිළිකා හට ගැනීමේ 26% ක වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය. අප විසින් අතීතයේදී කරන ලද මෝඩකම් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල වේදනාකාරී වනු ඇති බව මෙයින් පැහැදිලි වේ.

එක්සත් ජනපදයේ මාරක වර්ම පිළිකා ප්‍රමාණය වර්ෂයකට 7800 කට පමණ කිට්ටුවෙන් අඩුවැඩි වේ. පසුගිය වසර 35 ක කාලය තුල මෙයින් වන සංඛ්‍යාව 200% කින් වැඩිවී තිබේ.

විද්‍යායෝ තවත් ප්‍රශ්න වලටද මුහුණපා සිටිති. පාර ජම්බුල විකිරණයට අධික ලෙස විවෘත වීමේ හේතුවෙන්, මිනිස් ඇස්වල පටල බැදීම (කැටරැක්ට්) අධික ලෙස වැඩිවී තිබේ. ජලජ ජීවීන් මත පාර ජම්බුල විකිරණය වැඩිවීමෙන් අත්විය හැකි ප්‍රතිඵල ගැනද ඔවුහු කනස්සල්ලට පත්ව සිටිති. UNEP සුක්ෂම ජීව විද්‍යා ප්‍රධානියා පවසන අන්දමට සමුද්‍ර ජීවීන් හා සමුද්‍ර ශාකමය ජීව සත්ත්වයන් අඩුවී ජීවී වර්ගයන්ගේ සංයුතිය හා නානාප්‍රකාරත්වය වෙනස්වීමට මෙය හේතු විය හැකි අතරම අනෙක් අතට මේ හේතුවෙන් ආහාර දම්වැලේ ප්‍රාථමික සමුද්‍ර ආහාර නිෂ්පාදනය, අඩුවීමට ද එහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් ආහාර

දම්වැල්ලේ ඉහළින් සිටින මත්ස්‍යයන් හා කෂීරපායී සතුන් සඳහා වන ආහාර සැපයුම අඩුවීමටද ඉඩ තිබේ.

ඕසෝන් පටලය පරිහානියට පත්වීම ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් ඉවත් කිරීම මගින් හෝ ඒ සඳහා වෙනත් රසායන ද්‍රව්‍ය ආදේශ කිරීම මගින් නැවැත්වීම හෝ සැලකිය යුතු අන්දමින් අඩු කිරීම සඳහා ලෝක ප්‍රයත්නයක් අවශ්‍යය. "එනම් කර්මාන්ත වලදී ඒවා උත්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් වගකිව යුතු වන රටවල සහයෝගය අවශ්‍යය. 1987 මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය හා මෙම සම්මුතිය පිළිබඳ 1990 ලන්ඩන් සංශෝධනය වූ කලී ඇත්ත වශයෙන්ම නිවැරදි මගක් කරා තැබූ පියවරකි. "ආචාර්ය මොස්තාපා කේ. නොල්බා මෙසේ ලියයි. "මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය පිළිබඳ 1990 ලන්ඩන් සංශෝධනය මගින් පාලනය වන ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් හැලප්තස් හා වෙනත් රසායන ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන් අදියර වශයෙන් සැලසුම් කිරීම මගින් ඕසෝන් පටලය නැවත ඇති කර ගැනීමේ කාර්ය වසර 10 සිට 15 ක අතර කාලයකින් ඉක්මන් වනු ඇත.

මනුෂ්‍ය සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් බලන විට මේ වූ කලී, වර්ෂ පිළිකා රෝගීන් දශ ලක්ෂයක් පමණක් අසපියේ පටලය බැඳීමෙන් ඇතිවන අන්ධභාවය සහිත රෝගීන් 3,50,000 ක් පමණක් අඩු වීමට හේතු වනු ඇත.

එහෙකුදු වුවත් (ස්ටේන්ටැන්ට් අනුව) "මියන් හා මිනිසුන් වෙනුවෙන් උපස්තම ලෙස සකස්වූ සැලසුම්" තිබියදී, ලෝකය ජීවත්වීමට වඩා හොඳ තැනක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් ස්වභාව ධර්මය ඵලදායී ලෙස යොදා ගැනීමට හා පාලනය කිරීමටත් ප්‍රයත්න දරමින්, දේශපාලනය හා ආර්ථික විද්‍යාව විසින් මිනිසාගේ කටයුතු කෙරෙහි එන්ට් එන්ට්ම වැඩිවන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. අපේ ග්‍රහ ලෝකය උතුරේ සිට දකුණට විනාශ කෙරෙමින් පවතින බරපතල ආරවුල් හා


විශාලත්වයෙන් වැඩිවන ආර්ථික පසුබැසීම ද ස්වභාව ධර්මය පාලනය කිරීමට හා මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ අනාගතය ආරක්ෂා කිරීමට විද්‍යායාත්මක ගන්නා ප්‍රයත්නයන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් තිබේ.

පුද්ගලයෙකුට මෙන් සංවර්ධනය වන ලෝකය තුළින් බලාපොරොත්තුවක් තැබිය හැකි රටවල් කිහිපයක් තිබේ. එම රටවල් ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් භාවිතය තහනම් කිරීම සඳහා ඉතා සිහිනීම නොවූවද ව්‍යවස්ථා සම්මත කොටගෙන ඇත. ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් භාවිතය හා ශීතකරණය කිරීමේ විකල්පයන් තහනම් කිරීමේ සීමිත වැඩසටහනක් වනය ආරම්භ කොට තිබේ. ප්‍රමාණවත් මුදල් යෙදවීමක් ඇත්නම් තමාද යම් යම් සංවර්ධිත රටවල් මෙන් අදියර වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරන බව මැක්සිකෝට ප්‍රකාශ කොට තිබේ. සිංගප්පූරුව ලෝකයේ අත් සියළුම රටවලට වඩා ඉහළම අඩුවීමක් පිළිබිඹු කළ රට වශයෙන් 1986 සිට ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් භාවිතය 80% කින් අඩු කර ඇති බව වාර්තා කොට තිබේ. (1992 මැයි 14 දින "ද අයිලන්ඩ්" පුවත් පතේ විදු පිටුවෙහි)

එහෙකුදු වුවත් තත්වය තවමත් භයානකය. 1987 මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය හා 1990 ලන්ඩන් සංශෝධනය හා සකස් කිරීම්, ඕසෝන් පරිහානිය පිළිබඳ පෘතුගල තර්ජනය හමුවේ කොහෙත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව පැහැදිලිය.

"ක්‍රි.ව. 2000 ට කලින් සම්පූර්ණ අදියර සැලසුම් කිරීමක් වූ කලී මන්දගාමී ආකල්පයකි. "කාලය අප සමග නොවන බව" අමතක නොකළ යුතු වෙමු.

සොබා වෙළුම 4. පළවැනි කලාපයෙන් උපුටා ගැනින.





පරිසර දූෂණය

අයි.එම්. කරුණාතිලක
අ.පො.ස. (උසස්පෙළ) විදු.
ඩී.ඩී. වෙලගෙදර මධ්‍ය මහා විදුලය
කුරුණෑගල

මෙය, යොවුන් ලේඛක තරඟය " 93 " න් පළමු ස්ථානය දිනාගන්නා ලද ලිපියයි.

පරිසරය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ මිනිසා ජීවත්වන වටපිටාවේ ඇති සියළුම ජීවී හා අජීවී වස්තූන්ය. එය ස්වාභාවික හා සංස්කෘතික වශයෙන් කොටස් දෙකකි. භූමිය, ජලය, පස, ශබ්, සත්වයින් සහ වායු ගෝලය ස්වාභාවික පරිසරයට අයත් වන අතර සංස්කෘතික පරිසරය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ඔහු විසින් සකසා ඇති වටපිටාවයි. ආගම් කලා නිර්මාන, වාරිකු වාරිකු, ගති පැවතුම්, මංමාවත්, ගොඩනැගිලි හා සමාජ සංවිධාන මෙහි අගයන්ය. අතීතයේ සිට මිනිසා වර්තමානය ගොඩ නැගීම තෙක් තම ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගීමටත්, එහි ප්‍රගතිය සඳහාත් ස්වාභාවික පරිසරය වෙතත් කිරීම අවශ්‍යයෙන්ම සිදුකොට තිබේ.


මේ අනුව මිනිසාගේ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් නිසා පරිසරයට ද්‍රව්‍ය සහ ශක්තිය එකතුවීම නිරන්තරයෙන්ම සිදු වෙයි. මේ නිසා පරිසරය ගෞතික හෝ රසායනික වශයෙන් වෙනස්වීම සිදු වෙයි. මෙවැනි වෙනස්වීම් එම පරිසරයේ ජීවත්වන ජීවීන්ගේ ශුණාත්මයට හානියක් සිදු කරයි නම් එය පරිසර දූෂණයයි. නවීන පරිසර දූෂණයට ප්‍රධානතම හේතුව වී

ඇත්තේ 18 වැනි සියවසේ දී ඇතිවූ කාර්මික විප්ලවයේ අතිසි බලපෑමයි. පරිසර පද්ධතියක් ගත් විට එහි ශබ්, සතුන් හා පරිසරය අතර අන්‍යෝන්‍ය සබැඳියාවක් ගොඩනැගී ඇත. පරිසර පද්ධතියක පැවැත්ම රඳා පවතිනුයේ පාරිසරික සමතුලිතතාවය මතය. අප මෙහිදී අපේව පරිසරයට අයත්වන වාතය, ජලය හා පස පිළිබඳවත්, ඊට අමතරව ආහාර හා පෙනුම, යනාදිය පිළිබඳවත් වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. මිනිසාගේ ක්‍රියාවන් නිසා පරිසරයට එකතුවන ද්‍රව්‍ය ලෙස වායු, ද්‍රවයන්, සංඝණයන් හා වාතයේ බිඳීම් හැටියට හෝ අංශු හැටියට පවතින දේත්, ශක්තිය ලෙස තාපය, ආලෝකය, ශබ්දය, විකිරණශීලී කිරණ යනාදියත් මෙහිදී පෙන්වා දිය හැකිය. මෙකී ශක්ති ප්‍රභවයන් ජීවීන්ට සංවේදී වන්නේ යම් සීමාවකට පමණි. කර්මාන්තශාලාවක බොයිලේරුවෙන් පිටවන ජලය ජලාශවලට යොමුකර ඇති විට එහි ජලජ ශබ්ද ඇල්මි. මසුන් ආදියට ජීවත් වීමට අපහසුතා ඇති වන්නේ එකී හේතූන් නිසාය. මෙහිදී තාපය ප්‍රමුඛව ක්‍රියා කර ඇති බව පෙනී යයි. එමෙන්ම කාර්මිකරණය හේතුකොටගෙන කාර්මික ප්‍රදේශ වලින් හා දුම්රිය, ගුවන් යානා වැනි දෑ මගින් පිටවන අධික ශබ්දය ඉතා පිඩාකාරී වේ. මිනිසාට මෙයින් සංවේදී වන්නේ බෙයිබල් 50 ක් තරම් වූ

ප්‍රමාණයක ශබ්දයකි. මෙයට වඩා ශබ්දය වැඩිවූ විට කන් දුර්වල වී බිහිරිවීමද ස්නායු මාර්ගයේ බලපෑම් ඇති වීමද සිදුවේ. මෙයින් පෙනී යන්නේ ශබ්දයේද ජීවිතට සංවේදී වන සීමාවක් ඇති බවයි.

දුෂිත පරිසරයක වෙසෙන ජීවීන් ගැන සලකා බැලූවිට අපට එහි මූලික වෙනස්කම් රාශියක් පෙනේ. එනම් පරිසර පද්ධතියේ මූලික සිටි ඇතැම් ජීවී විශේෂ වඳවී යාම, මූලික නොසිටි සමහර ජීවීන් විශේෂ පරිසරය ආක්‍රමණය කරමින් විශාල ලෙස ව්‍යාප්තවීම, මූල්‍ය විශේෂ සංඛ්‍යාව අඩුවීම, ආහාරදායක කෙටිවීම, ජාල සරලවීම හා පරිසරයේ ස්ථාවර භාවය අඩුවීම යනාදිය එම කරුණුය. මිනිසා තම ජීවය පවත්වාගෙන යාම සඳහා එයට අදාළ පාරිසරික සමතුලිතතාවයක් පවත්වාගෙන යා යුතුය. නමුත් පරිසරය නිරන්තරයෙන්ම වෙනස්වන සුළු නිසා එකී තුලිතතාව බිඳ වැටීම නිරන්තරයෙන්ම සිදුවේ. එසේ පරිසර තුලනය බිඳීයාම පරිසර දූෂණයට බලපාන ප්‍රධානතම සාධකයයි. මිනිසා විසින් සිදු කරනු ලබන හා හා විධ ක්‍රියාවන් හා ස්වාභාවිකව සිදුවන ක්‍රියාවන්ම මගින් පරිසරයේ තුලිතතාව බිඳී යනු ලැබේ. වනාන්තර හෙලි කිරීම, වාරි මාර්ග, කර්මාන්ත ශාලා, සහ නගර ඉදි කිරීම, වගුරු බිම් ගොඩ කිරීම වැනි මිනිසා සිදු කරනු ලබන ක්‍රියා වලිනුත්, ජල ගැලීම්, සුළි සුළං, නාය යාම්, වැලි කුණාටු, ගිණි කඳු ආදී ස්වාභාවික ක්‍රියා මගින්, ස්වාභාවික වක්‍ර අඩුල්ලි පරිසරය දුෂිතවීම සිදුවේ. මෙවැනි සාධකවල අතීයම් බලපෑම් මගින් වාතය, ජලය හා ගොඩබිම, දූෂණය වීම සිදුවේ.

විදුට හා තාක්ෂණයෙන් ලොව රටවල් දියුණු වත්ම එකී දුෂිතවීම් දැකිය හැකි සුලභ සිද්ධියකි. කර්මාන්තශාලා, රථ වාහන, වැනි දෑ මගින් පිට කරන කාබන් මොනොක්සයිඩ් වැනි වායූන් මගින් සහ සුවඳ විලවුන්, කෘෂිකාශක, එරිසෝල්, වැනි සංයෝග මගින් වාතය දූෂණය වීම අද සුලභව සිදුවේ. එමගින් මියෝන් ස්ථරයට හානි පැමිණ කිරණ කෙලින්ම පොළොවට වැටීම මගින් වර්ෂ රෝග, පිළිකා වැනි හයානක ලෙඩ රෝග ඇතිවීමද මීට අමතරව න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේදී විකිරණශීලී අළු වැටීම, අධි විකිරණ දෑ මගින් වාතය දුෂිතවීම නිසා තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය, පෙනහළු, පියයුරු, අක්මාව, වකුගඩු යනාදියේ පිළිකා ඇතිවීමද, ඇස්වල සුද ඇතිවීම හා කෙස් වැටීම, ඇටමිදුර වලට හානි පැමිණීම, ප්‍රතිශක්තිය නැතිවීම, ප්‍රජනන ශෛලවල ජාන විකෘතිය ඇතිවීම, මොළයට හානි පැමිණීම, ආහාර මාර්ගයේ පටකීය කොටස් විනාශවීම වැනි හයානක ලෙඩ රෝගද වාතය දුෂිතවීම නිසා ඇතිවේ. ඉහත කී වායු නිසා පරිසරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමද හරිතාගාර ආචරණය ඇතිවීමද පෞරාණික නටබුන් විනාශවීමද අප ඉදිරියේ වාතය දූෂණය වීම නිසා ඇතිවන බලපෑමකි. මිනිසාගේ ඇතැම් අනුවණ හා අපරික්ෂාකාරී ක්‍රියා නිසා ජලය දූෂණය වීමද අද සුලභව සිදුවන්නකි. තම පරිසරයට හානියක් වී වුවද අඩු වියදමින් තම කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීමට මිනිසා අද ප්‍රයත්න දරයි. ජලාශ ආශ්‍රිතව කර්මාන්තශාලා ගොඩනැගීමට අද මිනිසා පෙළඹී ඇත්තේ පෙර කී අදහස මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහායි. රෙදි කොහු, සම් පදම් කිරීම හා රසායන ද්‍රව්‍ය නිපදවීමේ කර්මාන්තශාලා, යනාදිය මගින් ජලයට අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය



කර්මාන්ත ඇසුරින් සිදුවන පරිසර දූෂණය

බහුලව එකතු වීම නිසා ජලය දූෂිත වී මිනිසා ඇතුළු ජීවීන්ට එය පෙරලා විපත් ගෙනදීමට පෙළඹේ. "මිනීමාටා" රෝගය මේ සඳහා කදිම නිදසුනකි. රසායනික පොහොර ජලාශවලට යෝද ගෙන යාමෙන් ජවායේ ප්‍රමාණය වැඩිවීමෙන් සුපෝෂණය ඇතිවීමද ජලය දූෂණය වීම නිසා සිදුවන තවත් සිද්ධාන්තයකි. මීට අමතරව තෙල් තැව් යේදීම, සතුන්ගේ මල මුත්‍රා සහ වෙනත් අප ද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු වීම මගින්ද ජලය දූෂිත වීම සිදුවේ.

එපමණක් නොව විකිරණ පැතිරීම මගින්ද ජලය, ගොඩබිම හා වාතය යන අංශ තුන දූෂණය වීම ද අද සිදුවේ. කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී කැලි කසල එකතු වීම, රසායන ද්‍රව්‍ය පසට යෙදීම, පස බුරුල් කිරීම, හානියට පත් නොවන පොලිතින්, ජලාස්වික්, රබර් වැනි ද්‍රව්‍ය පසට හෙලීම වැනි ක්‍රියා මගින් පස දූෂණය වී ජීවීන්ගේ පැවැත්මට අවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමාවී පසේ හිතකර ජීවීන් විනාශ වීම හා පස නිසරුවී එය බෝග වර්ධනයට සහ අස්වැන්නට බලපෑම් ඇතිවීම දූෂිත පස නිසා සිදුවන්නකි.

මේ අනුව බලන කල පරිසරය දූෂණය වීම නිසා සිදුවී ඇති සහ සිදුවීමට ඉඩ ඇති ආදිතව මැඩලීම සඳහා සිසුන් මගින් පරිසර සංරක්ෂණ සංකල්පය ප්‍රචලිත කිරීම පහළ සිට ඉහළ ශ්‍රේණිය දක්වා විවිධ විෂය මාලාවලට පරිසරය දූෂණය හා සංරක්ෂණය පිළිබඳ කරුණු යොමු කිරීම, ජන මාධ්‍ය මගින් මහජනයා දැනුවත් කිරීම, දූෂිත ලෙස පිටවන අතුරු ඵල ප්‍රයෝජනවත්, ඵලවලට පත් කරගැනීමේ මාර්ග ඇති කර ගැනීම, ඉන්ධන දහනයේදී පිටවන වායුන් අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති නොකරන සංයෝගයක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම, "එරිසෝල්" විකල්ප සංයෝග භාවිතය කිරීම, රසායනික පොහොර වෙනුවට ඉවත ලන කැලිකසල භාවිතයෙන් සකසා ගත් කොම්පෝස්ට් පොහොර භාවිතය, සත්ව මලමුත්‍රා එකතු කර ජීව වායු නිශ්පාදනය වැනි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ක්‍රියාවලිය හඳුන්වාදීම, නයිට්‍රජන් තිරිකාරක බැක්ටීරියාවන් පසේ වගාකර යොදන අකාබනික පොහොර අඩු කිරීම, පළිබෝධ නාශක භාවිතය වෙනුවට ජෛව පාලනය යොදා ගැනීම, නියමිත සාන්ද්‍රණ වලට ඉසින ද්‍රව්‍ය යෙදීම, ජෛව හා වනනයට පත් නොවන ද්‍රව්‍ය නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කටයුතු යෙදීම, පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යෙදීම, ජලවහනය දියුණු කිරීම, හැකි හැම විටම ස්වාභාවික වාසස්ලතා ගහණය ආරක්ෂා කිරීම, තත්ත්ව බිම් ආදියෙන් ඇතිවිය හැකි දුර්විපාක වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම, ප්‍රමිතිකරණ අංශ පිහිටුවීම, නිසි සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම වැනි ක්‍රියා මගින් ස්වාභාවික පරිසරය රැකගත හැක.

අප මෙතෙක් සලකා බලනු ලැබුයේ පරිසර දූෂණයට ප්‍රමුඛව බලපාන අංශ ගැනයි. එහෙත් සංස්කෘතික පරිසරය දූෂණය වීම ද අද සුලභව සිදුවන නිසා ඒ දෙසත් මඳක් විමසා බැලීම

එපමණක් නොව විකිරණ
පැතිරීම මගින්ද ජලය, ගොඩබිම
හා වාතය යන අංශ තුන
දූෂණය වීම ද අද සිදුවේ.
කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී
කැලි කසල එකතු වීම, රසායන ද්‍රව්‍ය
පසට යෙදීම, පස බුරුල් කිරීම,
හානියට පත් නොවන පොලිතින්,
ජලාස්වික්, රබර් වැනි ද්‍රව්‍ය
පසට හෙලීම වැනි ක්‍රියා
මගින් පස දූෂණය වී
ජීවීන්ගේ පැවැත්මට අවශ්‍ය
ඉඩකඩ සීමාවී පසේ
හිතකර ජීවීන් විනාශ වීම හා
පස නිසරුවී එය බෝග වර්ධනයට
සහ අස්වැන්නට බලපෑම් ඇතිවීම
දූෂිත පස නිසා සිදුවන්නකි.

වටී. මෙම දූෂණය වීම මගින් සමාජ වාතාවරණය වෙනස් වීම සිදුවේ. සංස්කෘතීන්හි සාර ධර්ම හා සත් වාර්ත වීම් මෙමගින් පරිහානියට ගොදුරුවේ. මේ සඳහා බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස නාගරීකරණය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය පෙන්විය හැකිය. මර්ජුවානා, එල්.එස්.ඩී. පෙති හා මත් කුඩු වැනි මත් ද්‍රව්‍යයන්ට ගොදුරුවී විකෘති වර්ග ඇතිවීම මගින්ද මෙම පරිසරය දූෂිත වේ. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා නීති සම්පාදනය කර ජවා ක්‍රියාත්මක කිරීම, මානව සාරධර්ම සහ සංස්කෘතික හරයන් රැක ගැනීම, සමාජ ආකල්ප පරිවර්තන ඇති කිරීම ආදිය තුළින් සංස්කෘතික පරිසරයද ඉන් පසු ස්වාභාවික පරිසරයද ආරක්ෂා කර මිහිතලය අප වාසයට සුදුසු කෙසේම හමියක් ලෙස පවත්වා ගෙනයාම අපගේ පරම යුතු කමකි.

ලබා ගැනීමයි. ජෛව තාක්ෂණය සඳහා යථෝක්ත අර්ථ දැක්වීම යොදනු ලැබුවේ. 1980 දී ලන්ඩන් නුවර පැවති නවීන ජෛව විද්‍යා පිළිබඳ 'SPINK' කමිටුව විසිනි.

ජෛව තාක්ෂණය නූතන යුගයේදී, ප්‍රායෝගිකව සැලකිය යුතු අන්දමේ දියුණුවක් ලබා ඇති නමුත්, එහි ඉතිහාසය ක්‍රි.පූ. 6000 පමණ අතීතයට දිවේ. පුරාතණ සුමේරියන් වරු හා බැබිලෝනියන්වරු වසින් නිෂ්පාදනය දැන සිටි අතර, ක්‍රි.පූ. 4000 පමණ සිට ඊජිප්තු වැසියෝ පිටි පිපීමට වැදගත් වන මුහුම් හා පාන් නිෂ්පාදනය දැන සිටියහ. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය මඳක් විමසීමේදී අතීතයේ සිට අපේ මුතුන් මිත්තන් රා නිෂ්පාදනය දැන සිටි බවට සාක්ෂි ඇත.

නවීන ජෛව තාක්ෂණය ලෙස හැඳින්වෙනුයේ ජීවානුහරිත තත්වය යටතේ සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවලියකි. ආර්ථික වාසි ලබා ගැනීම සඳහා සිදු කරන, ජෛව තාක්ෂණ ක්‍රියාවන්හිදී යොදාගනු ලබන ජීවියාගේ ජාන රටාව වෙනස් කර, අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු කර ගැනීම පරමාර්ථය වේ. වර්තමානයේ ඉතාමත් දියුණු වෙමින් පවතින ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී, ජීවියෙකුගේ ජාන සැකැස්ම අපට, ආර්ථිකව වැදගත්වන අයුරින් වෙනස් කර, නැවත පිළියෙල කරනු ලැබේ. මේ සඳහා ප්‍රතිසංයෝජන හෝ විකෘති උපයෝගී කරගනු ලැබේ. *Escherichia coli* බැක්ටීරියාවට මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ඇති ඉන්සියුලින් නිපදවන ජානය, සම්ප්‍රේෂණය කිරීමත් සමගම ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ආරම්භයට මුල් පියවර එසවිනි. අද දින කණාමැදිරියක් සේ ආලෝකය විහිදුවන දුම්කොළ ශාක, මස් වැඩිවුවද, අඩු මේද ප්‍රතිශතයකින් සමන්විත සුපිරි උාරන් වැනි ආශ්වර්ෂාත්මක සොයා ගැනීම් කර ඇත. එමෙන්ම, මෙයට වසර කීපයකට පෙර, තොර්විහි ජෝන් ඉන්ස් ආයතනයේ, විද්‍යායින් පිරිසක් විසින් ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම පත්‍ර රහිත වී පැලෑටියක් නිපදවනු ලැබ ඇත. මෙම සොයා ගැනීම නිසා සුලභ අධික ප්‍රදේශ වලද වී වගා කිරීමට හැකිවී ඇති අතර, මෙම ප්‍රභේදයේ කරල්වල මේරීමද ඉක්මණින් සිදු වේ. අස්වැන්න නෙලීමට පහසුවේ. මෙම ප්‍රභේදයේ කඳ හා කරල් මගින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ප්‍රායාසංලේෂණය සිදුවේ.

ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව, භාවිතා කරන මූලධර්ම ලෙස ප්‍රාක් ජලාස්ම වියලනය (Protoplasfusion) හා බහුලව භාවිතාවන පටක රෝපිතය (Tissue Culture) දැක්විය හැකිය. පටක රෝපිතයේදී ආම්ලික සෛලීය ද්‍රාවණයන් තුල පැලෑටි නැවත ඉපදවීම සිදුකල හැක.

ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව මෙන්ම සිත්‍රයෙන් දියුණුවෙමින් පවතින ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස, (ENZYME TECHNOLOGY) ගත හැක. මෙහි අරමුණු පත්‍රයේ විවිධ එන්සයිම වලින් ගතහැකි නොයෙකුත් ප්‍රයෝජන උපරිම ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමයි.

සෛලයක් තුල සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියකින් අපට යම්කිසි ඵලයක් ලබාගත හැක්කේ, එම ඵලය බිඳ හෙලීමට අවශ්‍ය එන්සයිමය එම සෛල තුල නොමැතිවීම නිසාය. උදාහරණයක් ලෙස ඊස්ට් සෛලයකින් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය සැලකුවහොත්, ප්‍රතිඵලය ලෙස ඇල්කොහොල් ලබාගත හැක්කේ ඇල්කොහොල් බිඳ හෙලීමට අවශ්‍ය එන්සයිම ඊස්ට් සෛල තුල නොමැති නම් පමණි.

ජෛව

තාක්ෂණයේ

නව පෙරමුණු

සමන්ති ගිනිකා රබබඩගල

වසර 13 E විදු

මහාමායා බාලිකා විදුලය

මහනුවර

යොවුන් ලේඛක තරඟය " 93 " සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියකි.

විදුවත්, තාක්ෂණයන් දියුණුව නැමති පියගැට පෙලෙහි උච්චතම ස්ථානයේ හිඳ ලෝකයේ සුව පහසුව උදෙසා නව මං තනනා මෙවන් අවධියකදී, හෙටින් උදවන ලෝකයට උරුමකම් කියන්නක් ලෙස අප ඒ පිළිබඳව විමසුම් දැසින් යුතුව සිටීම, යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් බව මොනවට පසක්වී ඇත.

විසි එක්වැනි ශත වර්ෂයේ දෙරටුව අභියස සිටින, අපි එම ශත වර්ෂයේ, අයිති කරුවන් වෙමු. වත්මන් විදු ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි අවධානයකට, ලක්ව ඇති, ජෛව තාක්ෂණය පිළිබඳ සුළු දැනුමක්, හෝ තිබීම, අනාගතය භාර ගැනීමේ භාර දුර කර්තව්‍යයේදී අපට ඉමහත් පිටුවහලක් වනු ඇත.

ජෛව තාක්ෂණය යනු ජීවියෙකු හෝ උප සෛලීය ඉන්ද්‍රයිකාවන් ප්‍රායෝගිකව යොදා, ගනිමින්, යම් නිෂ්පාදනයක් හෝ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට ආධාර කර ගැනීම සහ පරිසර කළමනාකරණය

ජෛව තාක්ෂණය නූතන යුගයේදී.

ප්‍රායෝගිකව සැලකිය යුතු

අත්දැකීම් දියුණුවක් ලබා ඇති නමුත්.

එහි ඉතිහාසය ක්‍රි.පූ. 6000 පමණ

අතීතයට දිවේ. පුරාතණ

සුමේරියන් වරු හා බැබිලෝනියන්වරු

වසින් නිෂ්පාදනය දැන සිටි අතර.

ක්‍රි.පූ. 4000 පමණ සිට ඊජිප්තු වැසියෝ

පිටි පිපීමට වැදගත් වන මුහුම් හා පාන්

නිෂ්පාදනය දැන සිටියහ. ශ්‍රී ලංකා

ඉතිහාසය මඳක් විමසීමේදී

අතීතයේ සිට අපේ මුතුන් මිත්තන් රා

නිෂ්පාදනය දැන සිටි

බවට සාක්ෂි ඇත.

එමෙන්ම වේයාට, සෙලියුලෝස් ජීරණය කළ නොහැක්කේ සෙලියුලෝස් එන්සයිමය වේයාගේ සිරුරේ නොමැතිවීම නිසාය. නමුත් වේයාගේ අන්ත්‍රය තුළ වෙසෙන, *Trochonympha* නම් ක්ෂුද්‍රජීවියාට සෙලියුලෝස් එන්සයිමය නිපදවිය හැකිය. එනිසා වේයා තම ආහාරයේ ඇති සෙලියුලෝස් ජීරණයට වෙනත් ජීවියෙකු තුළ ඇති එන්සයිමයක් ආධාර කර ගනියි.


නවීන එන්සයිම තාක්ෂණයට ද පදනම වී ඇත්තේ මෙවැනි ක්‍රියාවලියකි. මෙහිදී මූලිකම එන්සයිම විවිධ ජීවීන්ගේ හෝ ජීව කොටස් වලින් නිස්සාරණය කරගනු ලැබේ. ඉන්පසු මෙම එන්සයිම ස්ථානගත කරගනු ලැබේ. (Immobilize) අවශ්‍ය ස්ථානයට සම්බන්ධ කිරීම මෙමගින් සිදුකර හැක. එන්සයිම ස්ථානගත කිරීම ආකාර කිපයකට සිදුකළ හැක. එන්සයිම සම්පූර්ණ එන්සයිමයකට ස්ථානගත කළ හැක. නැතහොත් සෛලයේ කොටසකට හෝ ඉන්ද්‍රයිකාවකට සිදු කරනු ලැබේ. එවිට එන්සයිමයෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලිය සිදුකර, ආර්ථිකව අවශ්‍ය අරමුණ ඉටුකර ගත හැක. මේ පිළිබඳව ගතහැකි උදාහරණයක් නම්, High Fructose Syrup නිෂ්පාදනයයි. එනම් මෙම සිරුරවල ප්‍රක්ටෝස් ප්‍රතිශතය ඉතාම වැඩිය. මේවා කෝඩියල් නිෂ්පාදනයේදී ඉතාමත් වැදගත් වේ. මෙම නිෂ්පාදනයේදී සිදු කරනු ලබන්නේ බැක්ටීරියාවල ඇති ග්ලුකෝස්, අයිසෝමරේස් නම් එන්සයිමය භාවිතයෙනි.

ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලදී ප්‍රතික්‍රියාව සිදුකරන තත්වය අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියාවේ සිගුතාවය කෙරෙහි බලපායි. එම නිසා ජෛව රසායනික ඉංජිනේරු කාර්යයන් වලදී මෙම තත්ව ලබාදීමට Bioreactors හෝ fermenters අතීතය වැදගත්වේ. Bioreactors සැලසුම් කර ඇත්තේ ජෛව රසායන නිෂ්පාදන සිදුකරන ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය pH අගය වැනි සාධක පාලනය සඳහා පරිගණක යොදාගත හැකි අත්දැකීමයි. මෙහිදී අවශ්‍ය නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍යයේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන අතර, එමගින් නිෂ්පාදනයේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් ලබාගත හැකිය.




ජෛව රසායනික නිෂ්පාදනයකදී අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය Upstream process නම් වේ. Bioreactors හා Fermenters වසින්, බියර්, නිෂ්පාදනය ප්‍රතිඵල නිෂ්පාදනය සඳහා බහුලව භාවිතා කෙරේ.

මෙම තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය මගින් එන්සයිම, ප්‍රතිජීවක වැනි ජෛවීය අණු ප්‍රෝටීන තාක්ෂණය, සෛල ස්ථානගතකරණය, වැනි ක්‍රියාවලීන් එකට සම්බන්ධ කර ජීවක තනනු ලැබේ. මෙම ජීවකයන් ජෛව සංවේදන ලෙස නම් කරනු ලැබේ. මෙම ජෛව සංවේදන සම්බන්ධ කර යන්ත්‍ර පිළියෙල කළ හැකිය. උදාහරණ ලෙස නිපදවනු ලබන ඇල්කොහොල් ද්‍රාවණයක ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත්කර ගැනීම හෝ යම්කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ඉවත්කර ගත යුතු වී නම් කළ යුත්තේ සාදාගත් ජෛව සංවේදනයක්



දුර්ලභ වර්ගයේ ශාක ප්‍රභේද නිපදවීම



ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව - සිහි දිසුණුවක් පෙන්වයි

තුලින් ද්‍රාවණයක් යැවීමය. එවිට එම ද්‍රාවණයේ ඇති අහිතකර රසායන ද්‍රව්‍ය අපට ඉවත්කර ගත හැකිය.

කවර දෙයක වුවද, හොඳ මෙන්ම තරකද ඇත. ලෝක ස්වභාවය වූ එය අනිවාර්යයෙන්ම ජෛව තාක්ෂණය කෙරෙහිද බලපාන බව තීරණය. ජෛව තාක්ෂණය යොදා ගැනීම නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා යොදනු ලබන මුදල් සම්භාරයක් ඉතිරිකරගත හැකි නිසා එමගින් බලශක්ති පරිභෝජනයද අඩුවේ. ජෛව තාක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා ජීවීන් සිය අවශ්‍යතා ස්වාභාවිකව සපුරා ගන්නා අතර, පරිසරයේ ලාභදායී සුලභ ද්‍රව්‍යයන් අඩුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කර අවශ්‍ය නිෂ්පාදනය සිදු කෙරේ. එමෙන්ම නවීන යන්ත්‍ර නිපදවිය නොහැකි ක්‍රියාවලීන් සඳහා ජෛව සංවේදන වැනි දේ භාවිතාකර සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැක. ඖෂධ නිෂ්පාදනය මෙන්ම රෝග වලට පිළියම් ලෙසද ජෛව තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත හැකිය. එසේම ඖෂධ නිසා ඇතිවන අතුරු ආබාධ සුව කිරීමටද, ජෛව තාක්ෂණය ආධාරවේ.

නව ජාන ඇසුරින් අස්වැන්න වැඩි ශාක ප්‍රභේද නියමය වැනි පාරිසරික උපද්‍රව වලට ඔරොත්තු දෙන හා කෘෂි පළිබෝධ හා හානි වලට ප්‍රතිරෝධී ශාක නිපදවා ගත හැකිය. නවීන ලෝකයේ පෙට්ටරෝලියම් ද්‍රව්‍යයන්ගේ අධික මිල ගණන් හා ජීවයේ හිඟකම් නිසා, තයිට්‍රජනීය පොහොර පිළිබඳ, ගැටළුව අද දින කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණදී ඇති බලවත් ප්‍රශ්නයකි. මෙයට විසඳුමක් ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. රනිල මූල ගැටිති තුළ ජීවත්වන වායුමය තයිට්‍රජන් ප්‍රයෝජ්‍ය කිරීමේ හැකියාව ඇති *Rhizobium* ගේ ජාන මේ සඳහා උපයෝගී කරගත හැක. වායුමය තයිට්‍රජන් ප්‍රයෝජ්‍ය කිරීමේ හැකියාව පාලනය කරන Nifsystem නම් ජාන 17 කින් පමණ සමන්විත, ජාන පද්ධතිය වෙනත් ශාකයන්ට බද්ධ කළ හැකිය.

එසේම ජෛව තාක්ෂණය මගින් මිනිසාට අහිතකර තර්ජනය, අද එල්ලවී ඇත. ක්ෂුද්‍රජීවී අවි වැනි විනාශකාරී නිෂ්පාදනයන් නිසා මිනිස් ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ විය හැක. *Clostridium botulism* බැක්ටීරියාව එවැනි විනාශකාරී ක්ෂුද්‍රජීවී අවියකි. එසේම *Bangarus aerculus* (කරවලා) නම් සර්පයා විසින් නිපදවන Bangaratoxin ජාන වෙනත් සතුන්ට බද්ධ කළහොත් ඇතිවන හයානක ජීවීන් සැබවින්ම මිනිසාට තර්ජනයක් වනු ඇත.

ජෛව තාක්ෂණය ඉතා ක්‍රමවත්ව හා සුපරීක්ෂාකාරීව හැසිරවිය යුතු ක්‍රියාවලියකි. ඒ සඳහා රටවල් වලට හිතු මතේ ක්‍රියා කළ නොහැකි ලෙස පිළිගත් ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය වේ. එසේම දුප්පත් රටවල ඇති ජාන සම්පත් දියුණු රටවල් මගින් පැහැර ගැනීම අද සුලභ කරුණක් විය. මෙය මහා පරිමාණයෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. මෙය නැවැත්වීමටද, පියවර ගත යුතුය.


කෙසේ හෝ ජෛව තාක්ෂණයේ දියුණුව මිනිසාට ඉතා හිතකර බව සැබෑය. ඒ වුවද එවන් දියුණුව අවධානව යොදා ගැනීමට යාමෙන් නුදුරු දිනක රිළවාට දැලි පිහිය අසුටුවාට සමාන තත්ත්වක් අප කරාද ලඟාවීමට බොහෝ සේ ඉඩ ඇත. එහෙයින් කළ යුත්තේ දියුණුව සැබෑ මානව සුභ සිද්ධියට යොදවා ලමින් ලෝකය ගොඩනැංවීමයි. ජෛව තාක්ෂණය පමණක් නොව වෙනත් කවර විද්‍යාවක් වුවද, දියුණුව කරා ලඟාවිය යුත්තේ මානව හිතවාදී ආකල්පයකින් මිස ලෝකය වනසාලන වේගනාවකින් නොවන්නේමය.

ಹೆಣ್ಣುಮಗ

හිතකර වේද?

අහිතකර වේද?

යොවුන් ලේඛක තරඟය " 93 " සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියකි.



වරතෝඩිල් නාමයෙන් බලාගාරය

විසි එක්වන සියවස විද්‍යවේ හා තාක්ෂණයේ හිතියෙන්ම කරා ලඟා වී ඇති බව තොරහයකි. මෙවන් යුගයක නෂ්ටික බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට දියුණු තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගැනීම අද බහුල වශයෙන් සිදු වන්නකි. මෙවන් තාක්ෂණයක් එවන් උසස් කාර්මික චිත්‍යන් අප රටවල තිබේද?

අද ලොව දක්නට ලැබෙන නෂ්ඨක බලාගාර සියල්ලම තිමටනු ලැබ ඇත්තේ නෂ්ඨක විඛණ්ඩය නැමති ක්‍රියාවලිය අනුවයි. එක් දහස් තවසිය හතළිස් පහේදී හිරෝෂිමා-නාගසාකි දෙතුවරට හෙළු පරමාණු බෝම්බ දෙකද මෙම මූලධර්මය අනුවම සැකසුණු ජ්වාය. එහෙත් දැන් පවතින නෂ්ඨක මියයිල තිමවා ඇත්තේ නෂ්ඨක වියලනය නැමති ක්‍රියාවලිය උපයෝගී කර ගැනීමෙනි. එය නෂ්ඨක විඛණ්ඩනය ක්‍රියාවලියට වඩා වැඩි බලශක්තියක් ලබා දෙයි. හදිසි අනතුරු සිදුවීමේ ඉඩකඩ ද සාපේක්ෂව අඩුය. කෙසේ වුවද අද දවස වන තුරු නෂ්ඨක විලයන ක්‍රියාවලිය නෂ්ඨක බලාගාර සඳහා යොදා ගන්නට හැකිවී නැත. මේ නිසා තවම ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක වන්නේ සාපේක්ෂ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු අවදනම් වැඩි ක්‍රමයක් වට පැහැදිලිය. විඛණ්ඩන ක්‍රියාවලියේදී බෝම්බයක් තුල හදිසි හා තදබල පිපිරීමක් ඇතිවේ. එහෙත් බලාගාරයක් තුළදී නම් මෙසේ මුද හැරෙන ශක්තිය පාලනය කිරීමට ක්‍රම ඇත. එහෙත් විඛණ්ඩන ක්‍රියාවලිය මත රඳ පවතින බලාගාර වල විශාල අනතුරු ඇතිවීමේ ඉඩකඩ ඉතා වැඩි බව යලිත් මතක් කර දිය යුතු වේ. මෙම ක්‍රියාවලියේ අතුරු නිශ්පාදන බොහෝ දුරට විකිරණශීලී ජ්වාය. එවන් බලාගාරයකින් හදිසි කාන්දුවීමක් සිදු වුවහොත් මෙවැනි විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය බලාගාරයෙන් පිටතට, පිට වායු ගෝලයට වේගයෙන් ඇතුළුවීම සිදුවේ. මෙවැනි අනපේක්ෂිත සිදුවීම් කිහිපයක්ම විපත් රැසක් ගෙන දෙමින් හමාර වී තිබේ.

වර්තමාන සිදුවූ මහා විනාශය පිළිබඳ මඳක් විමසා බැලුවහොත් එදා වර්තමාන බලාගාරය පිහිටීමෙන් විකිරණශීලී රසායන ද්‍රව්‍ය රැසක් වායු ගෝලයට නිදහස් විය. එයින් වඩාත්ම පීඩා වින්දේ වර්තමාන වැසියෝය. නිවැරදිව කිවහොත් වර්තමාන වටා කිලෝ මීටර් තිහක් ඈතුලන සිටි සියළු දෙනාම වහාම ඉවත් කරන්නට සිදු විය. එහෙත් සියල්ල එතෙක් අවසාන වූයේ නැත. මුළු යුරෝපය පුරාම විකිරණශීලීතාව ඉහළ ගියේය. විවිධ ප්‍රශ්න පැන නැගිණි. එපමනක් නොවේ වර්තමාන බලාගාරය පිහිටීමේදී නිදහස් වූ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය සමහරක්

ජපානයේ දී සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී හමු විය. විනාශයේ තරම එයින් නොපෙනේද? සෝවියට් දේශයේ සිදුවූ මේ විනාශය මෙතරම් ඇත රටවල බලපෑවේ කෙසේද? මෙයට ප්‍රධානම හේතුව සුළඟයි. වර්තෝබ්ලිහිදී පරිසරයට මුසුවූ විකිරණ ද්‍රව්‍ය තෝර්වේ. එංගලන්තය වැනි රටවලට පමණක් නොව, වඩා ඇත රටවලට පවා සුළං මගින් පැමිණ ඇත.

ලංකාවට යම්තම් සැතපුම් විස්සක් ඇතිත් පිහිටි තම්ලිතාඩුවේ මෙවන් අතතුරක් සිදුවුවහොත් තම්ලිතාඩුවේ බලාගාරයකින් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය නිදහස් වුවහොත් එය ශ්‍රී ලාංකික අපට දැඩි ලෙස බලපාන බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. එදිනට ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුහුණ පාන්නේ බිහිසුණු ඉරණමකටය. එංගලන්තයේ චින්ස්කෝල් බලාගාරයට අත් වූයේ මෙවැනි ඉරණමකි. ඇමරිකාවේ පෙන්සිල්වේනියානු පෙදෙසේ "ත්‍රි මයිල් අයිලන්ඩ්හි" පිහිටි බලාගාරයද විකිරණ කාන්දු වීමකට මුහුණ පෑවේ ජීවිතරාශකට විපත් ගෙන දෙමිනි. මේ සියල්ලට වඩා හොඳින් අප මතකයේ රැඳුණු අතතුරක් නම් වර්තෝබ්ලි බේදවාටකයයි. න්‍යෂ්ටික විද්‍යායින් පවසන අන්දමට මෙවැනි හදිසි කාන්දුවීමක් ඇති වුවහොත් බලාගාරයේ සිට අඩු තරමේ සැතපුම් අනුවක පමණ අරයක් ඇති පෙදෙසකින් ජනතාව වහා පිට කළ යුතුය. එහෙත් එමගින් කළ හැක්කේ අතතුරු අඩු කිරීම පමණකි. වර්තෝබ්ලි අතතුර හේතුකොටගෙන රුසියාවේ පමණක් නොව උතුරු යුරෝපයේද ගොවි නිපසුම් වලටත්, ගවයන් ආදී සතුන්ටත්, විකිරණශීලීතාවය හේතුකොටගෙන අතතුරු සිදුවූ බව, නොරහසකි. සැහෙන කලක් යන තුරු යුරෝපයේ පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේද ඉහත කී පෙදෙස් වලින් ආනයනය කරනු ලැබූ ආහාර වර්ග (කිරිපිටි, ජෑම් වර්ග ආදිය) පරිභෝජනාගාර වලට යොමු කිරීමට සිදුවූ බව රහසක් නොවේ. මෙවන් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන න්‍යෂ්ටික විකිරණ කාන්දුවීමක සෘජු ඵලය අඩු තරමේ සැතපුම් සියයකටත් බලපාන අතර සුළං හමන අන්දමට ජපන් ඇත ප්‍රදේශවලට පැතිරී යන්නට ඉඩ තිබේ. අනෙක මෙම න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක වන විට විවිධ අපද්‍රව්‍ය නිපදවේ. මෙම අප ද්‍රව්‍ය වල විකිරණශීලීතාවය ගැබ්වී ඇත. එබැවින් මෙම අප ද්‍රව්‍ය නැත නැත දැමිය නොහැක. අදත් මෙම යුරෝපීය රටවලට මහත් ප්‍රශ්නයක් වී ඇත්තේ මෙම අපද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කරනුයේ කොන්ක්‍රීට් බැරල් තුළය. ඉන් පසු මෙම බැරල් මුහුදු පත්ලට ගිල්වනු ලැබේ. එහෙත් එයින් ප්‍රශ්නය කෙළවර වේ යයි සිතිය හැක්කේ කවරකුටද? කිසියම් දිනක මේ බැරල් වලින් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය නිදහස් විය නොහැකිද? මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතේ තම්ලිතාඩු බලාගාරයෙන් පිටවන මෙවන් අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කරනුයේ කෙසේද? අප අවට ඉන්දියන් සාගරයේද? ඒ බව අප දැන සිටිය යුතු වේ. මන්ද? මෙම අප ද්‍රව්‍ය අතතුරුදයක වන බැවිනි. එපමණක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලින් සිදුවන විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය නිදහස් වීමේ අතතුරු කිසිවකුටත් නොදන්වා යටපත් කිරීමට බොහොමයක් රටවල් උත්සාහ කරති. අපට දැන ගැනීමට ලැබෙන්නේ වර්තෝබ්ලි විනාශය වැනි යටපත් කළ නොහැකි අතතුරු පමණකි.

සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපීය රටවල් මෙවන් අතතුරු පිළිබඳව නීතරම අවදියෙන් සිටිති. අවට පරිසරයේ විකිරණශීලීතාවයේ ඇති වන ඉතා සුළු වෙනසක් පවා සටහන් කරගත හැකි දියුණු උපකරණ ඔවුන් සතුව ඇත. එබැවින් අසල්වැසි රටක විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය නිදහස් වීමක් සිදු වුවහොත් එය වහාම දැනගැනීමට

අද න්‍යෂ්ටික අප ද්‍රව්‍ය
ගබඩා කිරීම යුරෝපීය රටවලට
පවා මහත් ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ.
මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගැනීමට ඔවුහු අපුරු
උපායක් යොදවා ගනිති.
ඔවුහු මෙම අපද්‍රව්‍ය හොර
රහස්ම තුන්වන ලෝකයේ
රටවලට පිටමං කරති. තුන්වන ලෝකයේ
රටවල සමහර වැසියන්ගේ අනුදැනුම
ඇතිව මේ අපද්‍රව්‍ය එම රටවල
ගබඩා කරති. මෙම ක්‍රියාවට
උදව් කරනනන්ට ඩොලර්
ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ගෙවීමටද මෙම
දියුණු රටවල් සුදුසුමය.
මර්ෂල් අයිලන්ඩ් දිවයින මෙයට හොඳම
උදහරණයකි. දැනටමත් විවිධ
රටවල අප ද්‍රව්‍ය එහි
ගබඩා කොට ඇත.

යුරෝපීය රටවලට පුළුවන. එහෙත් එවන් දියුණු උපකරණ අප සතුව නැත. නිරන්තරයෙන් විකිරණශීලීතාවයෙන් සිදුවන වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමටද අපි උත්සාහ නොකරමු. එබැවින් ඉන්දියාවේ මෙවන් අතතුරක් සිදු වුවහොත් අපට එය දැන ගැනීමට ක්‍රමයක් නැත. මුළු ශ්‍රී ලංකාවම අතතුරට ලක්ව ඇති මොහොතක පවා අප ඒ බව නොදැන සිටීමට ඉඩ ඇත. අප නොදැනුවත්වම අපේ ඉරණම විසඳීමට ඉඩ ඇත. එය අතීතය බියකරු තත්ත්වයක් නොවේද? අද න්‍යෂ්ටික අප ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම යුරෝපීය රටවලට පවා මහත් ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ. මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගැනීමට ඔවුහු අපුරු උපායක් යොදවා ගනිති. ඔවුහු මෙම අපද්‍රව්‍ය හොර රහස්ම තුන්වන ලෝකයේ රටවලට පිටමං කරති. තුන්වන ලෝකයේ රටවල සමහර වැසියන්ගේ අනුදැනුම ඇතිව මේ අපද්‍රව්‍ය එම රටවල ගබඩා කරති. මෙම ක්‍රියාවට උදව් කරනනන්ට ඩොලර් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ගෙවීමටද මෙම දියුණු රටවල් සුදුසුමය. මර්ෂල් අයිලන්ඩ් දිවයින මෙයට හොඳම උදහරණයකි. දැනටමත් විවිධ රටවල අප ද්‍රව්‍ය එහි ගබඩා කොට ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් පිහිටුවීමට එරෙහිව අපේ විද්‍යායින්ගේ හඬ නැගෙන්නේ මෙවන් පසුබිමක් යටතේය.

සංවර්ධිත රටවල න්‍යෂ්ටික බලය යොදා ගැනුණු පලියට අපද එය වෙත යායුතු යයි පිහිම මුද්‍රාවකි. අධි තාක්ෂණයෙන් පෙරමුණ ගත් ස්වභාවයද, මේ සියවස අවසන් වීමට පෙර න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඕස්ට්‍රේලියාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලට අමුද්‍රව්‍ය ලෙස අවශ්‍ය යුරේනියම් ස්වාභාවිකවම බහුල ලෙස ඇතත් න්‍යෂ්ටික බලාගාර කිසිවක් එහි නැත. අයිලන්ඩ් වාසීන්ට වසරකට ලැබෙන මුදල

බොල්ට් දශ ලක්ෂ සියයක් පමණ වේ. ඒ තම මව් බිමේ අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීමට උදව් කිරීම වෙනුවෙනි. ඉදින් අනාගතයේ දිනක මෙවන් කෙටි ක්‍රම මගින් මුදල් ඉපයීමට ශ්‍රී ලාංකිකයින් උනන්දු නොවේ යයි කිව හැක්කේ කාටද? තම්ල්නාඩුවෙන් මෙම අපද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකි බැවින් කාර්ය වඩාත් පහසුය. අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කළ යුත්තේ සැතපුම් විස්සක් පමණ ඈතකටය. එවන් දිනක අපි කුමක් කරමුද?

විද්‍යාව ලොව සතසයිද වතසයිද

ගයාත්‍රී අනුශා කුමාරී
12 වසර "පේ"
මුසුරපාද මධ්‍ය මහා විදුලය
තාරම්මල

යොවුන් ලේඛක තරඟය " 93 " සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියකි.

අභය උසට නැගුණු ගොඩනැගිලි, බැලූබැලූ අත දිස්වෙන නා නා මාදිලියේ කම්හල්, විදුලි වේගයෙන් දිවයන වාහන වලින් ගැටසි ගත් කොන්ක්‍රීට් ලොවක් තුළ වාසය කරන වත්මන් මිනිසා හට විද්‍යාව යනු නුහුරු වචනයක් නොවේ. අසිරිමත් බුද්ධි මහිමයක් සහිතව මෙලොව උපන් මිනිසා තුළ උපතින්ම හිමිවූ ගති ලක්ෂණයක් වූ කුතුහලය හේතුකොටගෙන ඔවුහු නොයෙකුත් දේ ගැන සොයා බැලීමට ඉතා ඈත අතීතයේ පටන්ම පෙළඹුණු බව පෙනේ. ඉතා ඈත අතීතයේ නොදියුණු ලෙස ජීවත් වූ මිනිසා ඉර, හඳ වර්ෂා ආදිය දෙවියන් මෙන් වන්දනා කළෝය. ලෝකය පැතලි යයි සිතුවෝය. නමුත් කාලය ගෙවී යත්ම ඔවුන්ගේ බුද්ධිය වර්ධනය වී කුසලතාවයන් දියුණු වන විට ඔවුන් තම අත්තික වස්තූන්ගෙන් ගෙන් මිදී ලෝකයේ සිදුවන නොයෙකුත් සිදුවීම් හා දක්නට ලැබෙන වස්තූවල සත්‍ය ස්වරූපය හඳුනා ගැනීමට උත්සාහගත් බව පෙනේ. මේ සඳහා ඔවුන් විවිධාකාර පර්යේෂණ කොට ජීව්‍යයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ලොවෙහි පවතින යම් යම් සිදුවීම් හා වස්තු පිළිබඳ වඩාත් යථාර්ථවාදී වූ නිගමන ලබා ගත්හ. මෙසේ විවිධ දේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කොට ජීව්‍යයේ ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් විවිධ නිගමන ලබා ගැනීම විද්‍යාව වශයෙන් අර්ථ දැක්විය හැකිය. මෙසේ විද්‍යාත්මකව සොයා ගත් විවිධ සිද්ධාන්ත හා මූල ධර්ම පදනම් කරගෙන යම් යම් අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම තාක්ෂණයයි.

අතීතයේ සිටම මිනිසා තම පැවැත්ම සඳහා විවිධාකාරයෙන් විද්‍යාව හා තාක්ෂණය යොදා ගෙන ඇති බව පෙනේ. විද්‍යාව මිනිසාගේ බුද්ධි වර්ධනය සමග ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වූවකි. අතීතයේ ඉතා නොදියුණු ලෙස ජීවත් වූ මිනිසා තම බුද්ධිය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන විට තම අවශ්‍යතා වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා පහසුවෙන් ඉටු කර ගැනීමට ඉතා සරළ විද්‍යාත්මක උපක්‍රම යොදා ගත්හ. ආදි මිනිසා ගල් දෙකක් ඇතිලිමෙන් ගින්දර ලබා ගැනීම මෙයට කදිම උදාහරණයකි. මෙසේ තම බුද්ධි බලයෙන් සොයාගත් විවිධාකාර විද්‍යාත්මක මූල ධර්ම ප්‍රායෝගිකව යොදා ගනිමින් මිනිසා ආ දිගු ගමනේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අද අප ජීවත්වන කාර්මික ලෝකය හැඳින්වීමට පුළුවන.

මිනිසාගේ සුපිරි මතයේ පිහිටෙන් බිහිවූ නොයෙකුත් යන්ත්‍රෝපකරණ ආදිය නිසා වත්මන් මිනිසාගේ ජීවිතවල ඇතිවී තිබෙන පෙරලිය අති මහත්ය. විද්‍යාව හා තාක්ෂණයේ දියුණුව හේතුකොටගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමේ විශාල දියුණුවක් ඇතිව තිබේ. විද්‍යාවේ දියුණුවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වත්මන් මිනිසාගේ ආහාර පරිභෝජනයේ පවා ඉතා විශාල දියුණුවක් ඇතිව තිබෙන බව පෙනේ. අතීතයේදී අර්ථයම් වෙලාවේ සිට රැු වන තුරුත් මුළුතැන් ගෙවී දුම් අතර සිරවී වද වීදි ගාහිණියට අද විද්‍යාවේ දියුණුවේ බල මහිමයෙන් ලැබී

ඇති පහසුව හා විවේකය අති මහත්ය. වත්මන් මුළුතැන් ගෙයක දක්නට ලැබෙන විදුලි උපකරණ පුදුම ඵලවන සුළුය. අතීතයේදී මිනිසා, ගමන් බිමන් සතුන් පිට හෝ පා ගමණින් ගිය අතර වර්තමානයේදී ඇසිල්ලකින් ලොව වටා සංචාරය කොට පැමිණීමට හැකි වන පරිදි විවිධ වාහන වර්ග නිපදවා තිබේ. අහසින්, පොළවෙන් හෝ මුහුදෙන් ගමන් කිරීම සඳහා ඉතා දියුණු තාක්ෂණ ක්‍රම උපයෝගී කර ගනිමින් නිපදවා ඇති අධිවේගී සහ උසස් පහසුකම් සහිත වාහන වර්ග රාශියක් දක්නට ඇත. විදුලි දියුණුව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කෙරෙහිද නොමදව බලපා ඇති බව වත්මන් ලෝකයේ දක්නට ලැබෙන විවිධ ගොඩ නැගිලි දෙස බැලීමෙන් පෙනී යයි. පැය තුනක් පමණ කෙටි කාලයකදී අංග සම්පූර්ණ නිවසක් තනා නිම කිරීම ජපන් ගෘහනිර්මාණ ශිල්පීන්ට හැකිව තිබෙන්නේ එම අංශයෙන් ඔවුන් ලබා ඇති දියුණුව නිසාය. වත්මන් මිනිසාගේ තවත් අති විශිෂ්ඨ නිර්මාණයක් ලෙස පරිගණකය හඳුන්වාදීමට පුළුවන. සෑම විෂය ක්ෂේත්‍රයක් කෙරෙහිම පැතිරුණු පරිතත බුද්ධියක් මේ යන්ත්‍රය සතු බැවින් මිනිසාට අවශ්‍ය විවිධ තොරතුරු මෙම යන්ත්‍රය මගින් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවී තිබේ. එමෙන්ම මිනිසාගේ තවත් සුපිරි නිර්මාණයක් වන රොබෝ යන්ත්‍රයද වර්තමානයේ මිනිසාගේ විවිධ කටයුතු වලට ප්‍රබල සහයෝගයක් ලබා දෙන්නක් බවට පත්ව තිබේ. ජපානය වැනි දියුණු රටවල හෝටල් වල සේවකයන් ලෙසද රොබෝ වරු යොදා ගෙන තිබේ. මිනිසාට වැළඳෙන විවිධ රෝග වලින් ගැලවීමටත් වර්තමානයේ විදුලි හා තාක්ෂණයේ පිහිට ආධාරය ඉතා ප්‍රබල අත්දැකීම් ලබාගෙන තිබේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වසූරිය වැනි හයානක රෝග ලෝකයෙන්ම තුරන් කිරීමටත්, ලාදුරු වැනි රෝග වලට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධ වර්ග සොයා ගැනීමටත් හැකිවී තිබේ.

තවත් විදුලි දියුණුව සංනිවේදනය කෙරෙහිද ඉතා ප්‍රබල ලෙස බලපා තිබේ. වර්තමානයේ ජන සංනිවේදනය කෙතරම් දියුණුද යත් අප වෙසෙන විශාල ලෝකය ඉතා කුඩා ගම්මානයක් තරමට කුඩාවී ඇතැයි කියවේ. මෙයට හේතුව රූපවාහිනී යන්ත්‍ර, දුරකතන ආදී දියුණු ජන සංනිවේදන මාධ්‍යය මගින් ලොව සෑම තැනකම සිදුවන දේ එක් ඇසිල්ලකින් ජ්‍යෙෂ්ඨතම දැන ගැනීමට හා දැක බලා ගැනීමට හැකිවීමයි. මීට අමතරව විදුලි දියුණුව නිසා කාර්මික හා කෘෂි කාර්මික අංශයේදී විශාල දියුණුවක් ඇතිවී තිබේ. වර්තමානයේ හතු පිපෙන්නාක් මෙන් ඉදිවන කර්මාන්තශාලා වල කෙරෙන නිෂ්පාදනයන් පුදුම ඵලවන සුළුය. මෙසේ දියුණු නිෂ්පාදනයන් කිරීමට හැකිවී තිබෙන්නේ එම කම්හල් තුල යොදා ගන්නා දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රම සහ යන්ත්‍ර සූත්‍රවල බලපෑම් නිසාය. අතීතයේ මිනිස් ශ්‍රමයෙන් කළ සෑම නිෂ්පාදනයක්ම පාහේ වර්තමානයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් කෙරෙන බැවින් නිෂ්පාදනය කාර්යක්ෂමවී ඇති අතරම ප්‍රමිතියෙන් උසස් නිෂ්පාදන බිහි කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. නව බිජු වර්ග සොයා ගැනීම පොහොර යෙදීම කෘෂි තාක්ෂණය යෙදීම හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගැනීම වැනි තාක්ෂණික ක්‍රම

යොදා ගැනීම නිසා කෘෂිකාර්මික අංශයේදී විශාල දියුණුවක් ඇතිවී තිබේ. අස්වැන්න බෙහෙවින් වැඩිවී තිබේ. අතීතයේ දෙවියකු ලෙසින් සලකා වන්දනා මාන කළ සඳ පවා විදුලි දියුණුවේ පිහිටෙන් ජය ගැනීමට හැකිවී තිබීම අප ලැබූ වාසනාවකි. නොතවත්වා දියුණුවන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් අනාගතයේදී මිනිසාට වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයක් ජය ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

මෙසේ විදුලි නිසා ලෝකයකට ලැබී ඇති සැත්කම අති මහත්ය. එහෙත් සෑම යහපත් දෙයකම අයහපත් පැත්තක් ද දක්නට ඇත. විදුලි හා තාක්ෂණ දියුණුවේ ද මෙසේ අයහපත් ලක්ෂණ රාශියක්ම දක්නට ලැබේ. විදුලි දියුණුව තුළින් ලෝකයා ලබා ගන්නා සැත්කම ගැන සිතා එයින් වන වැනසීම අමතක කළ නොහැක. සැප පහසුකම් රාශියක් මධ්‍යයේ මිනිසාගේ ලෝකික අංශය පෝෂණය වන විට ඔහුගේ අධ්‍යාත්මය අත්තයටම පිරිහීම විදුලි දියුණුව නිසා ඇතිවූ එක් අයහපතකි. විදුලි දියුණුවත් සමග යුද්ධායුධ නිශ්පාදනයේ දී ප්‍රවනතාවයක් දක්නට ලැබෙන්නේ මිනිසා අධ්‍යාත්මික වශයෙන් පිරිහීම නිසාය. නාස්ථික අවි ආයුධ, බෝම්බ ආදී බිහිසුණු යුද්ධායුධ නිෂ්පාදනය දිනෙන් දිනම වැඩිවන අතර මේවා යොදා ගෙන කරනු ලබන යුද්ධ කටයුතු නිසා සිදුවී ඇති පරිහානිය අපමණය. මෙසේ විදුලි යොදා ගෙන අනෙකෙකුගේ ජීවිතය වැනසීමෙන් මිනිසා කරනුයේ තමාටම වල කපා ගැනීමකි. එමෙන්ම විදුලි දියුණුව නිසා ඇතිවී තිබෙන පරිසර දූෂණය අද ලෝකයා මුහුණ පා ඇති ප්‍රධාන ගැටළුවක් බවට පත්වී තිබේ. කර්මාන්තශාලා ආදියෙන් පිටවන කාබන්ඩයොක්සයිඩ්, සල්පර්ඩයොක්සයිඩ් වැනි වායු වර්ග නිසා වායුගෝලය අහිමියන් අපිරිසිදුවී ඇති අතර අම්ල වැසි ඇතිවීම, මිසෝන් ස්ථරය සිදුරුවීම වැනි පරිසර ගැටළු රාශියක් ඇතිවී තිබේ. මෙමගින් මිනිසා, පිළිකා, වර්ම රෝග වැනි විවිධ හයානක රෝග වලට ගොදුරු වීමේ ප්‍රවනතාවයද වැඩිවී තිබේ. වර්තමානයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ වැඩි කොටසක් කරනු ලබන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ආධාරයෙනි. එම නිසා මිනිස් ශ්‍රමයට ඇති ඉල්ලුම බෙහෙවින් අඩුවී තිබේ. එම නිසා ඇතිවී තිබෙන රැකියා ප්‍රශ්ණය අද ලෝකයේ රටවල් බහුතරයක්ම මුහුණපා ඇති ප්‍රධාන ගැටළුවක් වී තිබේ. ශ්‍රී සමෘද්ධියක් සහිත අනාගතයකට මිනිස් වර්ගයා ලඟා වෙමින් සිටියත් ඉහත සඳහන් කළ ගැටළු දෙස බලන කල එම සැප සම්පත් විඳීමට මනුෂ්‍ය වර්ගයා ඉතිරි වේ දැයි කීමට අපහසුය.

මෙසේ බලන කල විදුලි ලොව සහසයිද වනසයිද යන්න රඳ පවතින්නේ එය මිනිසා විසින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ආකාරය මතය. විදුලිවත් ඇතිවන අයහපත හැකි තරම් දුරට අඩු කොට එයින් ලැබෙන යහපත වර්ධනය කර ගැනීම තුළින් සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් ඇති කර ගැනීම බුද්ධිමත් මිනිසාගේ පරම වගකීම වේ.